

פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר

פרופאלין סירופ וטרינרי - PROPALIN SYRUP VETERINARY

תמיסה צלולה למתן דרך הפה ע"י הגשה עם האוכל לשימוש בכלבות

חייב מרשם רופא

לשימוש וטרינרי בלבד

הרכב:

כל 1 מ"ל מכיל **Phenylpropanolamine (as Hydrochloride) 40.28 mg** כמרכיב פעיל וכן תמיסת סורביטול

פרופאלין סירופ קיים באריזות 30 מ"ל בבקבוק עם פיית מטפטף או ב 100 מ"ל בבקבוק עם מזרק מדידה.

קבוצה תרפויטית: תרופה סימפאטומימטית הפועלת על מערכת העצבים המרכזית: אגוניסט לרצפטור האלפא אדרנרגי.

פעילות רפואית: טיפול באי שליטה במתן שתן בכלבות נקבות הקשורה בכשל בסוגר השופכה (Urethral sphincter)

הוראות השימוש: לפי הוראות הרופא וטרינרי .

פרופאלין סירופ יש לתת ישירות על המזון, הינו טעים והכלבה תאכל את המזון באופן טבעי. אפשר לערבב את מנת הפרופאלין בכמות קטנה של אוכל ולאחר מכן להמשיך את יתרת המזון כרגיל.

מינון:

המינון הרגיל הינו 1 מ"ג לקילו משקל גוף 3 פעמים ביום, למתן עם המזון לדוגמא: 0.5 מ"ל לכלבה במשקל 25 ק"ג 3 פעמים ביום.

שיעור הספיגה של התרופה יעלה בכלבות בצום.

לחישוב קל של מתן החומר: 1 טיפה של פרופאלין סירופ לכל 2 ק"ג משקל כלבה, בשימוש עם מטפטף.

אם שכחת לתת את המנה בזמן הדרוש, אין לתת מנה כפולה. יש לתת את המנה הבאה בזמן הרגיל ולהיוועץ ברופא

בכלבים בריאים, לא נצפו תופעות לוואי בשל מינון יתר אפילו אם ניתנה מנה הגדולה פי 5 מהמומלץ. אולם, מינון יתר של פנילפרופאנולאמין (המרכיב הפעיל בתכשיר) עלול לגרום לתסמינים של גירוי יתר של מערכת העצבים הסימפטטית. הטיפול לכך הינו סימפטומטי. מעכבים אלפא אדרנרגיים יכולים לשמש במקרה של מינון יתר חמור. אולם, אין המלצה ספציפית לגבי תרופות או מינונים.

תופעות לוואי:

במסגרת ניסויים קליניים התגלו בחלק מהכלבים תופעות הלוואי הבאות: צואה נוזלית, ירידה בתיאבון, אי סדירות בקצב לב והתמוטטות. הטיפול נמשך בהתאם לחומרת התופעות.

תרופות סימפאטומימטיות עלולות לגרום לטווח רחב של תופעות, רובן תוצאות של גירוי יתר של מערכת העצבים הסימפטטית (לדוגמא: השפעות על קצב הלב ולחץ הדם). סחרחורות ואי שקט דווחו לעיתים. שינוי מקום. אגרסיביות וחוסר מנוחה נצפו בכמה כלבים בעקבות הטיפול. המרכיב סורביטול הוא בעל תכונות משלשלות, אך פעילות כזו אינה צפויה להתרחש במינון המומלץ של התכשיר. אם נצפו תופעות אלו ואחרות יש להיוועץ עם הרופא הוטרינר המטפל.

בבני אדם שנטלו בשוגג את התרופה, דווחו כאבי ראש, יתר לחץ דם וסחרחורת.

התוויות נגד:

לא לשימוש בכלבות בהריון או מניקות. יעילות התכשיר הודגמה רק בכלבות שעברו כריתת שחלות ורחם התכשיר אינו מתאים למקרים של השתנה לא ראויה הנובעת מסיבות התנהגותיות. אין לתת את התכשיר לכלבות המטופלות בתכשירים מסוג מעכבי MAO לא סלקטיביים.

אין להשתמש בבעלי חיים המטופלים בתרופות ללב או בתכשירים אחרים ממשפחת התרופות הסימפאטומימטיות
אין להשתמש בבעלי חיים הסובלים מיתר לחץ דם, אי ספיקת כליות או מחלה קרדיו-וסקולרית אחרת.
אין להשתמש במקרים של רגישות ידועה לחומר הפעיל או למרכיבים אחרים של התכשיר

אזהרות:

אכן יש לנהוג זהירות במצבי אי ספיקת כבד או פליה-חמורים, סוכרת, היפראדרנוקורטיזיסם (פעילות יתר של בלוטת יותרת הכליה), גלאוקומה, היפרתירואידיזם (עודף פעילות בלוטת התריס) ומחלות מטבוליות אחרות. מתחת לגיל שנה יש להביא בחשבון שאי השליטה עלולה לנבוע מסיבות אנטומיות.

יש לנהוג זהירות במתן בו-זמני עם נוגדי דיכאון טרי ציקליים או תכשירים מסויימים ממשפחת-MAO INHIBITORS type B ותכשירים אנטיכולינרגים.

אזהרות למטפל:

בליעת מינון יתר בשוגג ע"י בני אדם הינה רעילה. תופעות לוואי אפשריות הינן: סחרחורת, כאב ראש, בחילה, הפרעות בשינה או אי שקט ועלית לחץ דם. מנת יתר גבוהה עלולה להיות קטלנית ובמיוחד מסוכנת לילדים. במקרה שנבלע בטעות יש לפנות לסיוע רפואי, ולהראות לרופא את עלון התכשיר. במגע בטעות עם העור יש לשטוף את המקום עם מים וסבון. יש לשטוף ידיים לאחר השימוש בתכשיר. במגע בשוגג עם העיניים יש לשטוף עם מים נקיים במשך 15 דקות ולהיוועץ ברופא.

אחסון:

שמור את התכשיר במקום סגור ומוצל, בטמפרטורה של מתחת ל 25 מעלות צלסיוס.
לא לאחסן במקרר. לאחר פתיחה ראשונה- ניתן להשתמש תוך 60 ימים
יש להרחיק מהישג ידם של ילדים



היצרן: VETOQUINOL 70204 LURE CEDEX FRANCE

בעל הרישום: אליעזר לינביץ בע"מ ת.ד. 2920 אבן יהודה 4050778

מספר רישום התרופה: 083-21-92354