

קלסינוס טבליות 60 מ"ג

אריזת 10 טבליות

חומר פועל וכמות:

כל טבלייה מכילה:

60 מ"ג פאסואופידין הידראצ'לוריד (Pseudoephedrine hydrochloride 60 mg)

לשנתה החומר היגייני טיפלום, ואג' ראה טערף 6.

נקרא בעין תא העין עד סופ בתרום תשמש בתרופה.

הרופה, אם ש כל שלאות נספנות, פונה לא הרופא או לא רופק.

הרופה יינה שיועדה לילדי מתחת 12 שנים (מחזור גולני זה של לטנטה לרופא), על-

בלטע אורה בצוואר כבנה, ווועץ ברוחק אם הרק קוק ליטעט נספ', עליך לבלתי אל הרופא.

במס סעמי התויהה (סימפטומט) מוחשיים או אינם מטופרים לאחר 7 ימים.

1. **למה מיעשת הרופאה?**

הרופה מיעשת לטיפול סימפטומטי בגין באך במקראה של מחלת חרפיה והקללה בגין

בכגוניותה השמעה בדלקת האזון.

侃וגה וטאיסון:

לאפ' איזוףם.

2. לפוי השימוש בתרופה:

☒ אין לשימוש בתרופה אם:

• את מניקה.

• את ריש (אלרגי) לחומר הפעיל (פאסואופידין הידראצ'לוריד) או לאחד ממרכיבי התרופה

הארהמי.

• את מאופל בו זמינות בתרופות מקבוצת מעכבי מונאומין אוקסידייז או MAOI (לטיפול

בריכאון), או תוך 14 ימים מופסקות ה טיפול בהן.

אזורות מיוחדות הנגעות לשימוש בתרופה:

• עיר לחישוץ בפיואם אם עמוד לעברו בתיו, לאור תגובה אפרשית עם חומרו

הדרמן.

• אם אתה רישי למזהן כלשהו או לתרופה כלשה, עליך להודיע על-כך לרופא לפני נסילת

הרופה.

☒ לפוי השימוש בקלאסינוס ספר לרופא:

• אם אתה סובן או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד: העניים (בען גלאוקומיה), הלב ו/או כל-

הدم (גונן: חלץ דם גוף), בלוטת העורמונית, מודרת.

• לפוי תרונות תרופה זו ולשלישים נאורה ום לילומים לזרות גושים לכיסירין גומי גודש.

☒ אם אתה לבקה, או אם לך רקחות לאחרונה, הרופאות אחרות כולל תרופות לא מושם

ונוטרי תזונה, ספר על-כך לרופא או לרוקט. כמווזה יש לידע את הרופא או הרופק אם

אתה לבקה:

• תרורות גב דכאין

• תרורות להרדרת לחץ הדם

• תרורות שתמתות

• מכבי MAO

• תכשירים והכילים גליקוזידים של דיגיטיס

• ליבורפה

• נירוטים

• הורמוני בלוטת התריס

☒ הרוני ונגקה:

אם את ברוחן שי להוועץ ברכוף או ברוקן לפוי השימוש בתרופות.

אין להזמין בתרופה אם את מניקה.

3. כיצד תשמש בתרופה?

עליך לדודק אם הרופא או הרופק אם אכן בטוח.

הימנו המוביל דרך כל האות:

מכגורום עמל ליל 12 שעות: כלכלי 6 שניות.

אי-טילו וויר – כ- 4 סכליות מינימן 24 שעות.

אין עליך על הגונה הומולצת.

הרכזיש עליל עלילויות גלומות גלויו טריינה. על מנת להימנע מכך יש ליטול את הגונה האחרונה

של אותו יום בסופו שעת לפני טריינה.

ומטר לחצות ואלתוכה את סכליות מיד לפני בילעון. אין לאחסן טבליות ח齊ות או

בಚושים.

אם לאל שפирו במצבר תוך 7 ימים יש בלנות לופא.

אם נובל נונת יתר או לא בטנו לגען מלן מינן אין

ליטול מהנה כפולה.

שי לבלעו את סכליות טריינה לפני הרופא.

* או ליטול הרופאות בדוקת תרופה והגונה **בל פעם** שהן נוטל הרופאה. הרוכב משקפיים

אם הרק קוק להט.

אם ש לר' שאלות מסוימות בונגע לשימוש בתרופה, הוועץ ברופא או ברוקן.

4. תופעות לוואי:

כמו בכל תרופה, השימוש בקלאסינוס עליל לגונות לחושנות לאויב בחולק מהמשמשים. אל

תיכר למקארא רישומת תופעות לוואי. ייכון ולא הסכלה מארך מוקן.

יש להפסיק את השימוש בתרופה ולפנות ידי לופא אם:

* אהנה גובל טבונת, חורש חמירה, ועוד שינה, בישות שממה, בחלות או הקאות (דייר).

אם מוקם מופענות תלויי חמירה, ואפשר אתה סולב מוחפעת לאויא של חורה בעלון,

ליר לחתיין עם הרופא.

5. איך אתה תרופה?

מע רגעה מילאה תרופה זו ויל הרופאה אהרת יש לשמור במקום סגור יהש ידים ו/orם

של לסתם ו/או תינוקות ועל ידי קר תמן הרעלת הקאה לא הוראה להקאה לאויא מוקן!

נורא!

* או להפסיק את השימוש בתרופה אחריך תאריך הפוגנה (date) המופיע על גבי האריה. תאריך

הפגונה תרוייתם ליום האחרון של איזה חורש.

* או לאחסן בטפפורואה הולא **25°C**.

6. מידע נוספים:

טס עעל הומרו טפיע, התרופה מכילה גם:

Calcium hydrogen phosphate, powdered cellulose, croscarmellose sodium, colloidal silicon dioxide, magnesium stearate, erythrosine Al.

לכ סטבלייה מכילה פולחן כ- 3 מ"ג תרין:

כיצד נארית תרופה והתקן אരיה:

טבליות עגולות תרופה בדילות קע' חייניה.

טכליות מוגניות באנגיון אליומינס אברוחות של 10 טבליות.

בכל הרישום והרצין וכונתב:

ספ-אוון בע"מ, הר' אגדודה, 25, בת-ים.

מסכר רישום התרופה בפנסקס התרופות הממלכתי במושד הבריאות:

00 33484 21 148

לען זה בדוק ואור על ידי משרד הבריאות ביולי 2013.

לשם הפשטה ולקלות הקראייה, לען זה נסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת

לבני שמי היפנים.

20/10/08/010