نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) - ١٩٨٦

يُسوق الدواء حسب وصفة طبيب فقط

كالسينوس أقراص ٦٠ ملغ

المادة الفعالة وكميتها:
كل قرص يحتوي:
٦٠ ملغ بسودوإيفيدرين هيدروكلورايد (Pseudoephedrine hydrochloride 60 mg)
لقائمة المواد غير الفعالة، الرجاء أنظر الفقرة ٦.

إقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطيه للآخرين. فهو قد يؤذيهم حتى ولو بدا لك أن مرضهم مشابه لمرضك.

١) لأي غرض مخصص الدواء؟

- هذا الدواء مخصص لمعالجة أعراض إحتقان الأنف في حالات الرشح الشديد وللتخفيف من إحتقان قنوات السمع في حالة إلتهاب الأذنين.

الفصيلة العلاجية:
مقلد ألفا.

٢) قبل إستعمال الدواء:

☒ لا يجوز إستعمال الدواء إذا:
- كنت في فترة الرضاعة.
- كنت حساساً (أليرجي) للمادة الفعالة (بسودوإيفيدرين هيدروكلورايد) أو لأحد من مركبات الدواء الأخرى.
- إذا كنت تتعالج بالتزامن بأدوية من فصيلة مثبطات مونوأمين أوكسيداز (لمعالجة الإكتئاب)، أو خلال ١٤ يوماً منذ التوقف عن العلاج بها.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء:
- عليك إستشارة الطبيب إذا كنت مقدماً على إجراء عملية جراحية، نظراً لإمكانية حصول تفاعل بين هذا الدواء والمواد المخدرة.
- يجب إبلاغ الطبيب عن أي حساسية لديك لطعام أو عقاقير قبل استعمالك للدواء.

! قبل العلاج بـ كالسينوس إحك للطبيب:
- عندما تكونين في فترة الحمل.
- إذا كنت تعاني أو عانيت في الماضي من خلل في وظيفة: العينين (مثل جلوكوما)، القلب و/أو الأوعية الدموية (مثل: ضغط الدم العالي)، الغدة الدرقية، غدة البروستات، السكري.
- قبل إعطاء هذا الدواء للمسنين نظراً لأنهم قد يكونوا حساسين للمستحضرات المانعة للإحتقان.

! إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك. يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بالأخص إذا كنت تتناول:
- مضادات الإكتئاب
- خافضات ضغط الدم
- الأدوية المدرة للبول
- مثبطات مونوأمين أوكسيداز
- الأدوية الحاوية على جليكوزيدات الديجيتال
- ليفودوبا
- نيترات
- هورمونات الغدة الدرقية

! الحمل والإرضاع:
إذا كنت حاملاً يجب إستشارة الطبيب أو الصيدلي قبل إستعمال الأدوية.
لا يجوز إستعمال الدواء إذا كنت في فترة الرضاعة.

٣) كيفية إستعمال الدواء؟

- يجب الإستعمال حسب تعليمات الطبيب دائماً. عليك الإستيضاح من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً.

الجرعة الدوائية وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط. الجرعة الدوائية الإعتيادية عادة هي:
الكبار ما فوق عمر ١٢ سنة: قرص واحد كل ٦ ساعات.
لا يجوز تناول أكثر من ٤ أقراص خلال ٢٤ ساعة.

لا تتجاوز الجرعة الموصى بها.
قد يسبب المستحضر أحياناً الأرق. من أجل تجنب ذلك يجب تناول الجرعة الدوائية الأخيرة لنفس اليوم عدة ساعات قبل النوم.
يجب بلع الأقراص مع القليل من الماء.
بالإمكان شطر أو سحق الأقراص حالاً قبل إبتلاعها. لا يجوز تخزين أقراص مشطورة أو مسحوقة.
يجب مراجعة الطبيب إذا لم يطرأ تحسن على حالتك الصحية خلال ٧ أيام.

اذا افرطت في تناول الجرعة الدوائية أو اذا بلع الطفل خطأ من هذا الدواء، عليك التوجه إلى الطبيب حالاً أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى، وأحضر علبة الدواء معك.

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المطلوب، فيجب تناول الجرعة حال تذكرك، لكن لا يجوز تناول جرعة مضاعفة في أي حال من الأحوال.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

- لا تتناول الأدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقادير الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

٤) الأعراض الجانبية:

كما بكل دواء، إن إستعمال كالسينوس قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض المستعملين. لا تندهش من قائمة الاعراض الجانبية. من الجائز الا تعاني أياً منها.

يجب التوقف عن إستعمال الدواء والتوجه حالاً إلى الطبيب إذا:
- كنت تعاني من عصبية، قلة الراحة، أرق، مشاكل في التنفس، غثيان أو تقيؤات (نادراً).

إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

٥) كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع وعن مجال رؤيتهم، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية الى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- لا يجوز التخزين في درجة حرارة تزيد عن ٢٥ درجة مئوية.

٦) معلومات إضافية:

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً:
Calcium hydrogen phosphate, powdered cellulose, croscarmellose sodium, colloidal silicon dioxide, magnesium stearate, erythrosine Al.

كل قرص يحتوي أقل من ٣ ملغ صوديوم.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:
أقراص مستديرة زهرية اللون ذات خط للشطر.
تتوفر الأقراص ضمن لويحات من الألومنيوم في علب ذات ٢٠ و- ٣٠ قرصاً.

صاحب الإمتياز والمنتج وعنوانه:
سام - أون م.ض.، شارع هاعافودا ٢٥، بات - يام.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: ٠٠- ٣٣٤٨٤ - ٢١ - ١٤٨

أقرت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحتواها فُحص ورُخص في حزيران ٢٠١٣

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.