

**עלון לצריך לפי תקנות הרווקחים  
(תכשירים) התשמ"א-  
1986**  
התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

**לורמייקס 200 מ"ג  
טבליות מצופות**

הרכב:  
חומר פעיל:

ריפאמיקסן (צורה פולימורפית α) 200 מ"ג

לרשימת חומרים בלתי פעילים – ראה סעיף "מידע נוספת".

קראו בעיון את העلون עד סוף בטרכם **תשמש בתרופה**. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספת, פנה אל הרופא או אל הרווקת.  
תרופה זו נרשמה לטיפול במחלותך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלותם דומה.

לורמייקס מיועדת לשימוש מבוגרים ומתבגרים מעל גיל 12 שנים.

לורמייקס היא אנטיביוטיקה רחבה טווח משפחת הריפאמיצין. החומר הפעיל (**α**) נמצא בחידקים ובכך משפיע על תהליכי מטבוליזם בחידקים.  
**Rifaximin (polymorphic form α)** הוא ריבוזומרי-polymerase RNA אשר נמצא בחידקים ובכך משפיע על תהליכי מטבוליזם בחידקים.  
לורמייקס פועלת בעיקר במערכת העיכול.

**למה מיועדת התרופה?**

לורמייקס משמשת לטיפול בזיהומים במערכת העיכול הנגרמים מחידקים הריגשים לתרופה:

- שלשול בקרב מטיילים (TD - traveller's diarrhea)
- פגעה בתפקוד המוח כתוצאה ממחלה כרונית של הכבד המביאה לכך שהכבד כבר לא מסוגל לסלק חומרים רעלים מהדם ולכך הם מגעים למוח (Hepatic encephalopathy)
- מחלת דיברטיקולריה (סעיפים) של המעי, ללא סיבוכים (Non-complicated diverticular diseases)

**לפני השימוש בתרופה**

**אין להשתמש בתכשיר אם:**  
אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל (**α**) Rifaximin (polymorphic form α), נגזרות אחרות משפחת הריפאמיצין או לכל אחד מהמרכיבים הננספים אשר מכילה התרופה (אנא ראה 'מידע נוספת').

**ازירות מיוחדות הנוגעות השימוש בתרופה**

- אם אין שיפור בסימפטומים תוך 24-48 שעות, יש לגשת לרופא והוא ישקול האם להחליף את הטיפול בתרופה אחרת.
- אין להשתמש בלורמייקס לטיפול בשלשלות המלוויים בחום או צואה דמית.
- במקרים הבאים צבע השתן יכול להיות אדמדם:
  - אם אתה מטופל במינונים גבוהים של התרופה לפרק זמן ארוך
  - אם אתה סובל מגעה ברקמת המעיבמקרים אלו כמויות קטנות של התרופה (פחות מ- 0.4%) יכולות להיספג לזרם הדם וליצת מהഗוף דרך השתן. צבע החומר הפעיל של התרופה הוא אדום - כתום כמו כל האנטיביוטיקות משפחת הריפאמיצין וזה עלול לגרום לצביעת השתן.

אם אתה לוקח או לוקח לאחרונה תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי מזון, ספר על כך לרופא או לרווקת.  
במיוחד יש לידע את הרופא או הרווקת אם אתה לוקח:

- גלולות למניעת הרין - עלולה להיות ירידה ביעילותם, ולכן מומלץ להשתמש באמצעות מניעה נוספת נספחים אשר לא מבוססים על הורמוניים הנלקחים דרך הפה.
- פחם - יש לקחת את הלורמייקס לפחות שעתיים אחרי נטילת תרופות המכילות פחם.

**נטילת לורמייקס ומזון**  
ניתן לקחת את הלורמייקס עם או בלי מזון.

**הרין והנקה**  
אין להשתמש בתרופה במהלך הרין והנקה, היות ואין מספיק מידע על בטיחות השימוש בלורמייקס בזמן הרין והנקה.

**נהיגה והפעלת מכונות**  
לא צפיה השפעה על נהיגה או פעולה מכונת. במקרים נדירים, ניתן תופעות לוואי אשר עלולות להשפיע על יכולת הנהוג או להפעיל מכונת.

### **כיצד תשתמש בתרופה?**

תמיד יש להשתמש לפי הוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח במידה ואינך בטוח. המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. המינון המקביל בדרך כלל הוא:

- מבוגרים ומתבגרים מעל גיל 12 שנים:
  - שלשול בקרוב מיטילים: 1-2 טבליות מצופות 3-2 פעמיים ביום (סה"כ 1200-400 מ"ג ליום)
  - מחלת דיברטיקולריה (סעיפים) של המעי ללא סיבוכים, פגעה בתפקוד המוח כתוצאה ממחלת כרונית של הכלב: 2 טבליות מצופות 3-2 פעמיים ביום (סה"כ 1200-800 מ"ג ליום) לכל מחזור טיפול.
- אין ללווע את הטבליות היוצאות ויש להן ציפוי.
- יש לבלווע עם כמות מספיקה של נוזלים (כגון כוס מים).
- במידה ונוטלים 2 טבליות ביום, יש לקחת אחת בבוקר ואחת בערב. במידה ונוטלים 3 טבליות ביום, יש לקחת בבוקר, בצהרים ובערב.
- משך הטיפול:
  - שלשול בקרוב מיטילים: עד 3 ימים, אלא אם הרופא הנחה אחרת.
  - מחלת דיברטיקולריה (סעיפים) של המעי ללא סיבוכים, פגעה בתפקוד המוח כתוצאה ממחלת כרונית של הכלב:
    - עד 10-7 ימים עברו מחזור טיפול אחד.
    - עבור טיפול אקטואטי, מחזור טיפול אחד מספיק.
    - עבור טיפול כרוני, מחזור טיפול אחד בחודש.

**אם נטילת בטיעות מינון גבוהה יותר או בטיעות בעל יلد מן התרופה,** פנה מיד לרופא או לחדר מין של בית החולים והבא את אריזת התרופה אליו. במקרים של מינון יתר מומלץ כי תבצע שיטיפת קיבה וינתן טיפול תומך מתאים.

**אם שכחת ליטול את התרופה בזמן הדרש,** קח מיד את המנה שנשכחה ועל טיפולמנה כפולה בפעם הבאה.  
יש להקפיד ולקחת את התרופה בזמןנים המתאימים על מנת לשמר על יעילות ובטיחות הטיפול.  
יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ לך ע"י הרופא.

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה או לשנות את המינון ללא התייעצות עם הרופא או הרוקח.

**אם אתה מספיק את נטילת התרופה,** אתה עלול לפגוע ביעילות הטיפול.

**אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה,** הייעץ ברופא או רוקח.

### **תופעות לוואי**

כמו לכל תרופה, השימוש בלורמייקס 200 מ"ג עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלואוי. יתכן ולא תסבול מכך אחת מהן.

**מופיעות לעתים מאד קרובות (תופעות שימושיות ביותר משתמש אחד מעשרה):**

- הצבירות גזים בבטן.

**מופיעות לעתים קרובות (תופעות שימושיות ב-10-1 משתמשים מתוך 100):**

- כאבי ראש, סחרחורות, בחילות, דחף לעשות צרכים, אדמומיות העור, פריחת עור מעקצת (על פי רוב זהה סימן לרגישות יתר)

**מופיעות לעיתים רחוקות (טופעות שימושים מתוך 1,000):**

- כאבי בטן, עייפות, דחיפות במתן שתן, ירידה בתאalon, הפרעות בסות וירידה במשקל.

**מופיעות לעיתים נדירות (טופעות שימושים מתוך 10,000):**

- עליה בערכים בבדיקות דם אשר מצביעים על תפקוד הכבד, עליה ברמה של חלבון בשם אספרטט-אמינו-טרנספרז.

**מופיעות לעתים נדירות מאד (טופעות שימושים אחד מתוך 10,000):**

- שלשול זיהומי, זיהומיים בדריכי הנשימה העליונות, עליה במספר תאי הדם הלבנים, ירידה בתאי דם מסווג ניטרופילים, סיוטים, מגרנה, נזודי שינה, כאבי אוזניים, צלצולים באוזניים, שלשול, יושב בגרון ובשפתיים, בקע במפשעה, בעיות חנכיים, הפרשת מריה בשתן, כאב במתן שתן, תכיפות במתן שתן, חלבוניים בשתן, כוויותames.

אם הופעה תופעת לוואי, אם אתה מטופעת הלואי מחייבת או כאשר אתה סובל מטופעת לוואי שלא הזכרה בעلون זה, עלין להתיעץ עם הרופא.

### **איך לאחסן את התרופה?**

- מנע הרעללה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידים של ילדים /או תינוקות ועל ידי כך תמנעו הרעללה. אל תגרום להתקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווות והמנה בכל פעע שהינך גוטל תרופה. הרכיב משקפיים אם הינך זקוק להם.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה החיצונית. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- אין לאחסן בטמפרטורה העולה על 30°C.

### **מידע נוסף**

- **נוסף על החומר הפעיל (α-Rifaximin (polymorphic form α):**

Sodium Starch Glycolate, Glycerol Distearate, Anhydrous Colloidal Silica, Talc, Microcrystalline Cellulose, Hypromellose, Titanium Dioxide, Disodium Eddate, Propylene Glycol, Red Iron Oxide E172.

- **יצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:** טבליות קעורות מצופות בזכבב ורוד. משוקות באריזות של 12 ו- 24 טבליות.

בעל הרישום וכתובתו: מגפאארם בע"מ, ת.ד. 519, הוד השרון 4510501

שם היצרן וכתובתו: אלפא ווסרמן A.S.p.c., פסקארה, איטליה

עלון זה נבדק ואושר על ידי משרד הבריאות בדצמבר 2014.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 149 55 33667

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נכתב בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

