

אין ליטול ריטמייקל ויש לפנות לרופא אם אתה לוקחת:

- תרופות לטיפול בהפרעות קצב לב:
 - חסמי בטא כגון פרופראטול, אוקספראנול או אצבוטולול.
 - וראפאAMIL (משמש גם לטיפול בתעוקת חזה וביתר לחץ דם).
 - דיגוקסין (משמש גם לטיפול בעיות לב).
 - תרופות אשר נטילתן יחד עם **ריטמייקל** עלולה להעלות את הסיכון להפרעות קצב לב:
 - נוגדי דיאזון כגון אמיטריפטילין, אימיפראמין או מאפרוטילין.
 - תרופות לאין אונות כגון סילדנפיל, טאדאלafil או ארדנפאלי.
 - אנטיביוטיקות כגון אריתромיצין, קלירוטומיצין, איזטרומיצין או ספארפלוקסאצין.
 - אנטיסיסטמינים (טיפול באלהגיות) כגון אסתמיזול או טרפנדין.
 - ציסאפריד (טיפול בצרבתת).
 - פנטאמידין (טיפול בדלקת ריאות).
 - פימוזיד ותיורידازין (טיפול בסכיזופרניה).

יש לידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקחת את התרופות הבאות, כיון שהן עלולות להשפיע על הפעולה של ריטמייקל:

- אמפאטרצין B (טיפול בזיהומים פטריטיים).
- טטראקווסאכיד (טיפול בעיות הורמוניות מסוימות).
- ריפאמיצין (טיפול בזיהומים).
- אטרופין (נמצא בטיפות עיניים ובתרופות לצימון).
- תרופות אנטיכולינרגיות (כולל תרופות מסוימות לטיפול בתסמונת מעי רגץ, אסתמה או בריחת שתן).
- תרופות לטיפול בעיות רגשות או נפשיות, או לטיפול בחילוות והקאות (כגון קלורופראמיזין או פרוכלופראזין).
- תרופות משנתונות, כגון פורוסמידי.
- קורטייקוסטרואידים כגון הידרוקורטיזון, בטאמטהוזן או פרדניזולן.
- משלשלים כגון בייסאקוודיל או סנה.
- תרופות לאפילפסיה כגון פנobarביטאל, פרימידון או פניטואן.

יש לידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקחת את התרופות הבאות, כיון שריטמייקל עלול להשפיע על פעולתן:

- תרופות אנטי וירליות לטיפול ב- HIV כגון ריטונאוויר, אינידנאוויר או סאקוונאוויר.
- תיאופילין - לטיפול ביצפוצפים ובקשי נשימה.
- ציקלוספורין (למניעה של דחיתת שתל).
- וורפארין (לדילול דם).

הירין והנקה: יש להיוועץ ברופא לפני נטילת התרופאה אם הנrk בהריון, מתכנתה הרוון או חושבת שהן בהריון. אם הנrk מניקה או מתכנתה להניק, יש להיוועץ ברופא, כיון שכמוויות קטנות של תרופה זו עוברות לחלב אם.

נזהה ושים שימוש במכונות:anganisms מסויימים תרופה זו עלולה לגרום לפגיעה בריכוז ובמהירות התגובה, לראייה מטוששת ולסחרחות. במידה והnk חש תופעות אלה, אין לנוהג ברכב או להפעיל מכונות מסוכנות.

במידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופאה: תרופה זו מכילה לקטוז העולם לגרום לאלהgia אצל אנשי הרגשים ללקטוז.

**עלון לצורךן לפי תקנות הרוקחים
(תק Shirim) התשמ"ז – 1986**

התרופה משווקת על פי מרשם רפואי בלבד.

ריטמייקל 100 כמוסות ריטמייקל 150 כמוסות

רכיב:

כל כמוסה של **ריטמייקל 100** מכילה:
דיסופיראמיד (כמלח פוסfat) 100 מ"ג Disopyramide (as phosphate) 100 mg

כל כמוסה של **ריטמייקל 150** מכילה:
דיסופיראמיד (כמלח פוסfat) 150 מ"ג Disopyramide (as phosphate) 150 mg

רשימת החומרים הבלתי פעילים, אני ראה סעיף

6: "מידע נוסף".

קרה בעיון את העalon עד סוףו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתה. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

פעריות רפואיות: לטיפול בהפרעות קצב הלב.

2. לפני השימוש בתרופה

א אין לשימוש בתרופה אם:

- אתה רגש (אלרגי) לדיסופיראמיד או לכל אחד מהמרכיבים הננספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6: "מידע נוסף"). תסמיין האלהgia כוללים פריחה, בעיות בליה או נשימה, התנפחות של השפתים, הפנים, הגרון או הלשון.
- הנrk סובל ממחלות לב נוספות, בנוסף להפרעות קצב לב.
- הנrk נוטל תרופות נוספות לטיפול בהפרעות קצב לב.
- הנrk נוטל תרופות נוספות העולמות לגרום לדופק לא תקין.
- הנrk סובל מבעיות בכבד או בכליות.

azimuthot הנוגעות לשימוש בתרופה:

■ לפני הטיפול ברייטמייקל, ספר לרופא אם:

- הנrk סובל מרמות נמוכות של סוכר בدم. זה עלול לגרום אם הנrk סובל מסוכרת, מתת משקל, מתה מתונה, או אם הנrk קשה.
 - הנrk סובל מגלאוקומה (לחץ תוך עיני גבוהה אשר עלול לגרום לכאבי עיניים עם טשטוש ראייה).
 - הנrk סובל מבלוטת ערמנונית (פרוסטטה) מוגדלת.
 - הנrk סובל ממיאסטניה גראביס (מחלה הגורמת לחולשת שרירים).
 - הנrk קשה וסובל מבעיות זיכרון או קשב, או לפעמים מתקשה לחשב בבהירות.
- אם אתה לוקחת, או אם לך חלה לאחרונה, תרחות אחריות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על nk לרופא או לרוקח.**

שלשול; טשטוש ראייה או ראייה כפולה; יובש באף, בעינים או בגרון; אצירת שתן, עליה בדחיפות ותדיירת של מtan שtan; סחרחותר; עייפות כללית, חולשת שרירים (כולל החמרה במיאסטניה גרביס, בחולמים במחלה זו); כאב ראש; תחושת חולץ; כאבים; אין אוניות בגברים; לחץ דם נמוך עם או ללא אי ספיקת לב, החמרה באין ספיקת לב; הפרעות בהולכה בלב; ב仄קוט/עליה במשקל; קוצר נשימה; עילפון; כאב בחזה; פריחה בעור; גרד; עצבנות; רמה נמוכה של אשגן בדם (היפוקלמייה); עליה ברמה של שומנים או כולסטרול בדם.

תופעות לוואי שאינן שכיחות/נדירות: דיכאון; בעיות שינה; אי מtan שtan; חוסר תחושה או תחושת נימול בגפיים, עליה באימי הכבד; דום לב; עליה באוריאה או בקריאטיבין בדם; אנמיה (ירידה בכמות כדוריות דם אדומות או במוגולובין בדם); רמת סוכר בתאי דם אדומות (היפוגליקמייה) שסימנניה הימן הזעה, נמוכה בדם (היפוגליקמייה) שסימנניה הימן הזעה, חייזרין, כאב ראש, תחושת עילפון או סחרחותר; צחבת (צחבת העור או העיניים); חום; קשי נשימה; ירידת בכמות טסיות הדם (טרומבוציטופניה); ירידת בכמות תאי הדם הלבנים (אגרגנולוציטוזיס), העוללה לגורם לנטייה לזרזומים; הגדלת שדים בגברים; תסמנינים של זבת (לופוס); תסמנינים פסיקוטים.

תופעות לוואי שכיחותן אינה ידועה: שינויים במצב הרוח, שינויים במצב הנפשי; הפרעות זיכרון; הפרעות קשב.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אתה סובל מטופעת לוואי שלא מחמירה, או כאשר אתה סובל מטופעת לוואי שלא הזכרה בעולון, עליך להתייעץ עם הרופא.

5. איך לאחסן את התרופה?

מנع הרעלת! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקומות סגור מחוץ להישג ידים של ילדים /או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלת. אל תגרום להתקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה מתייחסים ליום האחרון של אותו חודש.

יש לאחסן מתחת ל- 25°C ובמקום מוגן מארה.

6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם: Lactose, Maize starch, Povidone, Magnesium stearate, Gelatine capsule.

כיצד נראה התרופה ומה תוכן האריזה:

ריטמייקל משוק באריזות של 30 כמוסות הארוזות במציגות (בליסטרים). **ריטמייקל 500** הימן כמוסות בצעב ורוד-לבן, **ריטמייקל 150** הימן כמוסות בצעב אדום-לבן. שם בעל הרישום: אוניפארם בע"מ, ת.ד. 21429 ת"א 6121306.

שם היצרן וכתובתו: תרימה בע"מ, קיבוץ מעברות. עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך: נובמבר 2014.

מספר הרישום של התרופה בפנקס התרופות הממלכתי של משרד הבריאות:

ריטמייקל 500: 00 22824 94 040
ריטמייקל 150: 00 22825 13 041

לשם הפשטות ולהקלת הקראיה, עלון זה נסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לשני המינים.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

תמיד יש להשתמש לפי הוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם איןך בטוח. המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

המינון המקביל בדרך כלל עבור רוב המטופלים הוא 600 מ"ג ריטמייקל ליום הנינתן במנות מחולקות (150 מ"ג כל 6 שעות). למטופלים עם משקל גוף מתחתת ל- 50 ק"ג המינון המקביל הינו 400 מ"ג ליום (100 מ"ג כל 6 שעות).

אין לעבור על המנה המומלצת.

אם הנך חש שהשפעת התרופה חזקה מדי או חלשה מדי, אל תנסה את המינון על דעת עצמן, אלא פנה אל הרופא המתפל.

קשישים: הרופא עשוי לרשום מינון נמוך יותר למטופלים קשישים עם בעיות כבד או קליה.

בדיקות דם: בזמן השימוש בתרופה, יתכן והרופא יחולט על בדיקות דם תקופתיות על מנת לבדוק את רמות הסוכר בדם.

יש לבלווע את התרופה עם מים.

אם נטלת בטעות מינון גבוהה יותר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך. תסמנים של מינון יתר כוללים סחרחותר, עייפות, דופק לא סדר, דיפיקוט לב, יובש בפה, קושי במתן שתן, בחילות או הקאות, כאב בטן, עוויתות (פרקסיסים).

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן קצוב יש ליטול מנה מיד כשמכרת, אך אם הזמן ללקיחת המנה הבאה קרוב, יש לדלג על המנה שנשכחה וליטול את המנה הבאה בזמן הרגע. בשום אופן אין ליטול שתי מנות ביחד!

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא. גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא או הרוקח.

אין ליטול תרופות בחושרי! בדוק התווית והמנה בכל פעע שהנק נוטל תרופה. הרכב משקפים אם הנך זקוק להם. אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, הייעוץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש **בריטמייקל** עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמטופלים. אל תיבהל למקרה רשותת תופעות לוואי. יתכן ולא תסבול מכך אחת מהן.

יש לפנות מיד לרופא אם אתה חש בתופעות הלואאי הבאות (יתכן ותזדקק לעזרה רפואי):

- תגובה אלרגית, שסימנניה כוללים פריחה בעור, בעיות בליה או נשימה, התנפחות של השפטיים, הפנים, הגרון או הלשון.

יש לפנות לרופא בהקדם האפשרי אם אתה חש בתופעות הלואאי הבאות:

- תחושת עילפון או סחרחותר.
- דיפיקוט לב או דופק לא סדר, מהיר או איטי (תסמנים שלא חשת בעבר או שהחמי).

תופעות לוואי נוספת:

תופעות לוואי שכיחות מבודד: יובש בפה, קושי במתן שתן (במיוחד בגברים עם בעיות בבלוטת הערמוונית), עצירות.

תופעות לוואי שכיחות: בחילות והקאות; הפרעות עיכול; כאב בטן; נפיחנות (גזים); איבוד תיאבון;