

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة

(مستحضرات) ١٩٨٦

بسوق الدواء بدون وصفة طبيب

سوبرامول ٥٠٠ فتائل

المادة الفعالة:

باراسيتامول ٥٠٠ mg.

تحذير كفالة على:

باراسيتامول ٥٠٠ أخذ الطبيب إذا:

لإقامة الدواء غير العمال، الرجال اثغر الفقرة .٦

كلت تعاني أو تأنيت في الماضي من:

القولون، تجدر هذه النشرة على معلومات موجودة عن

الدواء، إذا توفرت لديك أسلطة إضافية، راجع الطبيب

أو الصيدلي.

الدواء مخصوص للبالغين والأطفال فوق عمر ستة.

على استعمال بشكل صحيح، استشر الصيدلي إذا

كنت حاملاً لحملات إضافية.

يجب التوجه إلى الطبيب إذا استمرت السخونة لأكثر

من ٣ أيام أو إذا لم تزول الأعراض خلال ٦ أيام على

الرغم من استعمال الدواء.

١ قبل إستعمال الدواء - سوبرامول ٥٠٠ أخذ الطبيب إذا:

كلت تعاني أو تأنيت في الماضي من:

القولون، تجدر هذه النشرة على معلومات موجودة عن

الدواء، إذا توفرت لديك أسلطة إضافية، راجع الطبيب

أو الصيدلي.

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية

أخرى بما في ذلك الورقية بدون وصفة طبية وأسفلات

الطبيب أو الصيدلي بالآخر، إذا كنت تتناول:

أدوية ضد نفحة الدم خاصة وارفارين.

أدوية ضد التشنجات/الصرع (كاربامازيبين).

باربازورات.

ريفياميسين.

أيزينديز، ديدوكوفورين (المرضي الأيدن).

مستحضرات مضادة للالتهاب لا سيروتونينية.

ميوكارباميد أو دوميفورين (علاج المثبات،

القفزة، ومضاد ضمافن إضافية).

كلور أمفينيكول (مضاد حيوى).

وريبيسيدي (ملاج القشر).

كورستينين (انخفاض قدرة الدهون في الدم).

استعمال هذا الدواء لتسكين الآلام وتخفيض

حرارة الفرقه، يرجى تجنبه بشكل جيد، فإن الملاج القوي

ضروري، بسبب خطورة تطور ضرر شديد للقلب.

قد تكون أعراض جانبية مثبات، وتفاقم، عرق،

فقدان الشهية للطعام، آلام في البطن، تعرق، عرق،

رائحة مال أو حساسية في أعمل البطن وقد لا تختفي

شدة الضرف لدى الكبار.

إذا نسبت استعمال الدواء:

إذا نسبت استعمال هذا الدواء في الوقت المطلوب.

استعمال المقدار التالي لدوره حال تذكرك، لكن إذا قد

حان موعد المقدار التالي لا يجوز استعمال مقدار

مما يختلف، واستعمل باراسيتامول واستهلاك الكحول

يسحب زيادة الخطورة لحدوث ضرر في الكبد.

الحمل والإرضاع:

إذا كنت حاملاً أو مرضعة يجب إستشارة الطبيب أو

الصيدلي قبل استعمال الدواء.

٢ الاستعمال لدى الأطفال:

هذا الدواء مخصوص للبالغين والأطفال فوق عمر

٢٤ سنة.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء:

إذا طورت في الماضي أعراض جانبية جلدية،

نوبة تناول مستحضرات حيوى باراسيتامول، عندما

لا يجوز تناول مستحضرات حيوى باراسيتامول.

كي لا تسبب أعراض جانبية شديدة.

إذا وجدت لديك أي حساسية لطعم أو دواء على

ابلاع الطبيب بذلك.

تحذير المستحضر على باراسيتامول الذي قد يسبب

ضرر الكبد في الحالات التالية: عندما يعطى بجرعة

أعلى مما يوصى بها، عندما يعطى لفترة طويلة، عندما

يتم تناول مشروبات روحية خلال فترة العلاج، عندما

يتم تناول أدوية إضافية التي تؤثر على الكبد، عندما

تتألم من سوء تغذية شديد.

يجب تجنب تناول جرعة عالية (في الحدود الموصى

به) من الدواء خلال الصوم.

انتفاخ الوجه، الشفتين، اللسان، المخدرة / أو

الأعراض ما ي يؤدي إلى صعوبات في التنفس

او في البلع.

باراسيتامول يمكن أن يسبب في حالات نادرة،

ظهور أعراض جلدية شديدة يمكن أن تكون

أعراضها أحمراء، طفح، حوميات، إصابة

جلدية واحدة.

أعراض جانبية جلدية شديدة يمكن أن تظهر حتى

ولو تناول في الماضي مستحضرات تحوي المركب

الفعال باراسيتامول دون أي مكمل.

إذا ظهرت أعراض جانبية جلدية، يجب التوقف عن

العلاج وراجعت الطبيب حالاً.

يظهر ثمان، تقويم، إمساك، إسعاف، عدم، ضرر كبد،

ضرر كبد، ضرر كبد (نادر).

إذا تناولت المركب في جهاز الدم مثل إنزيم

كمات، ظهرت أعراض جانبية بسهولة زادت.

إذا تناولت المركب في جهاز الدم مثل إنزيم

كمات، ظهرت أعراض جانبية بسهولة زادت.

إذا ظهرت أعراض جانبية في جهاز الدم مثل إنزيم

كمات، ظهرت أعراض جانبية بسهولة زادت.

إذا ظهرت أعراض جانبية في جهاز الدم مثل إنزيم

كمات، ظهرت أعراض جانبية بسهولة زادت.

إذا ظهرت أعراض جانبية في جهاز الدم مثل إنزيم

كمات، ظهرت أعراض جانبية بسهولة زادت.

إذا ظهرت أعراض جانبية في جهاز الدم مثل إنزيم

كمات، ظهرت أعراض جانبية بسهولة زادت.

إذا ظهرت أعراض جانبية في جهاز الدم مثل إنزيم

كمات، ظهرت أعراض جانبية بسهولة زادت.

إذا ظهرت أعراض جانبية في جهاز الدم مثل إنزيم

كمات، ظهرت أعراض جانبية بسهولة زادت.

إذا ظهرت أعراض جانبية في جهاز الدم مثل إنزيم

كمات، ظهرت أعراض جانبية بسهولة زادت.

إذا ظهرت أعراض جانبية في جهاز الدم مثل إنزيم

كمات، ظهرت أعراض جانبية بسهولة زادت.

إذا ظهرت أعراض جانبية في جهاز الدم مثل إنزيم

كمات، ظهرت أعراض جانبية بسهولة زادت.

إذا ظهرت أعراض جانبية في جهاز الدم مثل إنزيم

كمات، ظهرت أعراض جانبية بسهولة زادت.

إذا ظهرت أعراض جانبية في جهاز الدم مثل إنزيم

كمات، ظهرت أعراض جانبية بسهولة زادت.

إذا ظهرت أعراض جانبية في جهاز الدم مثل إنزيم

كمات، ظهرت أعراض جانبية بسهولة زادت.

إذا ظهرت أعراض جانبية في جهاز الدم مثل إنزيم

كمات، ظهرت أعراض جانبية بسهولة زادت.

إذا ظهرت أعراض جانبية في جهاز الدم مثل إنزيم

كمات، ظهرت أعراض جانبية بسهولة زادت.

إذا ظهرت أعراض جانبية في جهاز الدم مثل إنزيم

كمات، ظهرت أعراض جانبية بسهولة زادت.

إذا ظهرت أعراض جانبية في جهاز الدم مثل إنزيم

كمات، ظهرت أعراض جانبية بسهولة زادت.

إذا ظهرت أعراض جانبية في جهاز الدم مثل إنزيم

كمات، ظهرت أعراض جانبية بسهولة زادت.

إذا ظهرت أعراض جانبية في جهاز الدم مثل إنزيم

كمات، ظهرت أعراض جانبية بسهولة زادت.

إذا ظهرت أعراض جانبية في جهاز الدم مثل إنزيم

كمات، ظهرت أعراض جانبية بسهولة زادت.

إذا ظهرت أعراض جانبية في جهاز الدم مثل إنزيم

كمات، ظهرت أعراض جانبية بسهولة زادت.

إذا ظهرت أعراض جانبية في جهاز الدم مثل إنزيم

كمات، ظهرت أعراض جانبية بسهولة زادت.

إذا ظهرت أعراض جانبية في جهاز الدم مثل إنزيم

كمات، ظهرت أعراض جانبية بسهولة زادت.

إذا ظهرت أعراض جانبية في جهاز الدم مثل إنزيم

كمات، ظهرت أعراض جانبية بسهولة زادت.

إذا ظهرت أعراض جانبية في جهاز الدم مثل إنزيم

كمات، ظهرت أعراض جانبية بسهولة زادت.

إذا ظهرت أعراض جانبية في جهاز الدم مثل إنزيم

كمات، ظهرت أعراض جانبية بسهولة زادت.

إذا ظهرت أعراض جانبية في جهاز الدم مثل إنزيم

كمات، ظهرت أعراض جانبية بسهولة زادت.

إذا ظهرت أعراض جانبية في جهاز الدم مثل إنزيم

كمات، ظهرت أعراض جانبية بسهولة زادت.

إذا ظهرت أعراض جانبية في جهاز الدم مثل إنزيم

كمات، ظهرت أعراض جانبية بسهولة زادت.

إذا ظهرت أعراض جانبية في جهاز الدم مثل إنزيم

كمات، ظهرت أعراض جانبية بسهولة زادت.

إذا ظهرت أعراض جانبية في جهاز الدم مثل إنزيم

كمات، ظهرت أعراض جانبية بسهولة زادت.

إذا ظهرت أعراض جانبية في جهاز الدم مثل إنزيم

كمات، ظهرت أعراض جانبية بسهولة زادت.

إذا ظهرت أعراض جانبية في جهاز الدم مثل إنزيم

كمات، ظهرت أعراض جانبية بسهولة زادت.

إذا ظهرت أعراض جانبية في جهاز الدم مثل إنزيم

كمات، ظهرت أعراض جانبية بسهولة زادت.

إذا ظهرت أعراض جانبية في جهاز الدم مثل إنزيم

كمات، ظهرت أعراض جانبية بسهولة زادت.

إذا ظهرت أعراض جانبية في جهاز الدم مثل إنزيم

كمات، ظهرت أعراض جانبية بسهولة زادت.

إذا ظهرت أعراض جانبية في جهاز الدم مثل إنزيم

كمات، ظهرت أعراض جانبية بسهولة زادت.

إذا ظهرت أعراض جانبية في جهاز الدم مثل إنزيم

كمات، ظهرت أعراض جانبية بسهولة زادت.

إذا ظهرت أعراض جانبية في جهاز الدم مثل إنزيم

كمات، ظهرت أعراض جانبية بسهولة زادت.

إذا ظهرت أعراض جانبية في جهاز الدم مثل إنزيم

كمات، ظهرت أعراض جانبية بسهولة زادت.

إذا ظهرت أعراض جانبية في جهاز الدم مثل إنزيم

كمات، ظهرت أعراض جانبية بسهولة زادت.

إذا ظهرت أعراض جانبية في جهاز الدم مثل إنزيم

كمات، ظهرت أعراض جانبية بسهولة زادت.

إذا ظهرت أعراض جانبية في جهاز الدم مثل إنزيم

كمات، ظهرت أعراض جانبية بسهولة زادت.

إذا ظهرت أعراض جانبية في جهاز الدم مثل إنزيم

كمات، ظهرت أعراض جانبية بسهولة زادت.

إذا ظهرت أعراض جانبية في جهاز الدم مثل إنزيم

كمات، ظهرت أعراض جانبية بسهولة زادت.

إذا ظهرت أعراض جانبية في جهاز الدم مثل إنزيم

كمات، ظهرت أعراض جانبية بسهولة زادت.

إذا ظهرت أعراض جانبية في جهاز الدم مثل إنزيم

كمات، ظهرت أعراض جانبية بسهولة زادت.

إذا ظهرت أعراض جانبية في جهاز الدم مثل إنزيم

كمات، ظهرت أعراض جانبية بسهولة زادت.

إذا ظهرت أعراض جانبية في جهاز الدم مثل إنزيم

كمات، ظهرت أعراض جانبية بسهولة زادت.

إذا ظهرت أعراض جانبية في جهاز الدم مثل إنزيم

كمات، ظهرت أعراض جانبية بسهولة زادت.

إذا ظهرت أعراض جانبية في جهاز الدم مثل إنزيم

كمات، ظهرت أعراض جانبية بسهولة زادت.

إذا ظهرت أعراض جانبية في جهاز الدم مثل إنزيم

كمات، ظهرت أعراض جانبية بسهولة زادت.

إذا ظهرت أعراض جانبية في جهاز الدم مثل إنزيم

كمات، ظهرت أعراض جانبية بسهولة زادت.

إذا ظهرت أعراض جانبية في جهاز الدم مثل إنزيم

كمات، ظهرت أعراض جانبية بسهولة زادت.

إذا ظهرت أعراض جانبية في جهاز الدم مثل إنزيم

كمات، ظهرت أعراض جانبية بسهولة زادت.

إذا ظهرت أعراض جانبية في جهاز الدم مثل إنزيم

كمات، ظهرت أعراض جانبية بسهولة زادت.

إذا ظهرت أعراض جانبية في جهاز الدم مثل إنزيم

كمات، ظهرت أعراض جانبية بسهولة زادت.

إذا ظهرت أعراض جانبية في جهاز الدم مثل إنزيم

كمات، ظهرت أعراض جانبية بسهولة زادت.

إذا ظهرت أعراض جانبية في جهاز الدم مثل إنزيم

كمات، ظهرت أعراض جانبية بسهولة زادت.

إذا ظهرت أعراض جانبية في جهاز الدم مثل إنزيم

كمات، ظهرت أعراض جانبية بسهولة زادت.

إذا ظهرت أعراض جانبية في جهاز الدم مثل إنزيم

كمات، ظهرت أعراض جانبية بسهولة زادت.

إذا ظهرت أعراض جانبية في جهاز الدم مثل إنزيم

كمات، ظهرت أعراض جانبية بسهولة زادت.

إذا ظهرت أعراض جانبية في جهاز الدم مثل إنزيم

كمات، ظهرت أعراض جانبية بسهولة زادت.

إذا ظهرت أعراض جانبية في جهاز الدم مثل إنزيم

كمات، ظهرت أعراض جانبية بسهولة زادت.

إذا ظهرت أعراض جانبية في جهاز الدم مثل إنزيم

كمات، ظهرت أعراض جانبية بسهولة زادت.

إذا ظهرت أعراض جانبية في جهاز الدم مثل إنزيم

كمات، ظهرت أعراض جانبية بسهولة زادت.

إذا ظهرت أعراض جانبية في جهاز الدم مثل إنزيم

كمات، ظهرت أعراض جانبية بسهولة زادت.

إذا ظهرت أعراض جانبية في جهاز الدم مثل إنزيم

كمات، ظهرت أعراض جانبية بسهولة زادت.

إذا