

سالفكال أقراص

- الدواء، توج الأطبيب أو لغة الطوارئ في المستشفى وأحضر عبوة الدواء معك.
- إذا سبب تناول الدواء إذا من أقل من ٦ ساعات من الوقت الاعتيادي الذي تناول فيه الدواء، تناول الدواء مع الطعام حال تذكرك. قم بتناول الجرعة التالية بوقت متأخر قدره ٤-٥ ساعات على الأقل.
- إذا من أكثر من ٦ ساعات، تناول جرعة واحدة فقط. لا يجوز تناول جرعة مضاعفة من أجل التعويض عن الجرعة المنسنة.
- يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.
- لا تناول أدوية في الغيمة؛ يجب تشخيص طابع الدواء والتاكيد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء، ضع التظاريف الطبية إذا لزم الأمر ذلك.
- إذا تقررت لديك استثناءً إضافية حول إستعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

٤) الآعراض الجانبية

كما كل دواء، أن استعمال هذا الدواء قد يسبب آراءً جانبية عند بعض المستعملين.

يجب التوقف عن الإستعمال والتوجه للطبيب في أسرع وقت ممكن إذا كنت تشعر

بنصفيات وحاجة لاستشارة، إزالة اكتئاب نفسى، عصبية، الم شديد في العينين، الم

في الصدر، تهيج في البطن، إحمرار، إنفاس و الم في العينين، الم شديد في البطن.

آعراض جانبية شائعة:

- أعراض مشابهة للإنفلونزا
- تعرق
- صداع
- شبع أكثر في الحاجة للتبول
- آعراض جانبية شائعة:
- ارتفاع
- تشعيرية
- رعش
- رود فعل تحسسية مثل المفعح والحكمة
- دوار
- إسهال، إمساك
- مشكل في الفم، الم في البطن، غثيان، تقيؤ
- زيادة في اللعاب
- تورم، إنفاس في ضغط الدم
- خفقان قلب
- تكرر في العينين، إصابة الرؤية، إحمرار، إنفاس و الم في العينين
- آعراض جانبية غير شائعة:
- الإلتحاق على التبول بوتيرة أكبر
- غازات
- آعراض جانبية إضافية لوحظت عند إستعمال المادة الفعالة بيلوكاربين:
- صعوبات في التنفس
- الم شديد في البطن أو في المعدة
- تغيرات في نظم القلب
- انخفاض في ضغط الدم، إغماء
- ارتفاع
- تغيرات في حالة النفسية مثل مشاكل في الذاكرة، تغيرات في المزاج وإرتياك
- إذا ظهر عرض جانبي، إذا فاقت حد الآعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك استشارة الطبيب.

٥) كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسمم، يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيداً عن متناول

أيدي الأطفال / أو الرضع وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون

تحذيمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز استعمال الدواء بعد انتهاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على

ظهر العلبة/القنية/ الكرتون/الملاصقة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من

نفس الشهر.

شرط التخزين: خزن بدرجة حرارة أقل من ٢٥ درجة مئوية.

بعد الفتح يمكن الاستعمال لمدة شهر.

٦) معلومات إضافية

يحتوى الدواء بالإضافة المادة المعلقة أيضاً، Microcrystalline Cellulose، Colloidal Silicon Dioxide، Stearic Acid.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة أقراص بيبة داخل قبضة بلاستيكية.

العلبة: إبتنية - تحوى العلبة كبس من مادة ماصة للرطوبة للحفاظ

على الأقراص.

صاحب الإمتياز وعنوانه: سام - أون م.ض.، ماغاودا، ٢٥ بات - أيام.

اقررت وزارة الصحة صحة هذه النشرة ومحنتها، قسم ورخص في تاريخ: أيام ٢٠١٤

١٥٩٣٢٣٣٢٨ رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكرة.

على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصوص لكلا الجنسين.

١) أي غرض مخصوص الدواء؟

• المادة الفعالة: Pilocarpine HCl 5 mg - بيلوكاربين هيدروكلوريد ٥ مل.

معلومات موجزة عن الدواء، إذا توفر لديك أسلطة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وصف هذا الدواء من أجلك، لا تعطيه للأخرين، فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك

أن ملائم الطبية مشابهة لحالتك.

الدواء غير مخصوص للأطفال دون ١٨ سنة من العمر.

٢) قبل إستعمال الدواء

٣) لا يجوز استعمال الدواء إذا:

• كنت في فترة الحمل أو في فترة الرضاعة

• وجدت لديك حساسية لأحد مركيبات الدواء

• كنت دون ١٨ سنة من العمر

• كنت تعاني من الربو غير المتعال أو إنسداد مزمن في الجهاز التنفسى، التهاب

العينين أو الملوكوما

• كنت تعاني من مرض غير معالجه في القلب أو في الكلى

• كنت تعاني من مرض مزمن الذي يتم معالجته بأدوية ذات فعالية مماثلة لفعالية

هذا الدواء

٤) تدابير خاصة تتعلق بإستعمال الدواء:

١) قبل العلاج بـ سالفكال، أخذ للطبيب إذا:

• كنت تعاني أو عانت في الماضي من خلل في وظيفة الرئتين (مثل الربو ، إنفلات

القصبات المزمن و/or مرض رئوي إنسادي مزمن)

• كنت تعاني أو عانت في الماضي من مرض في القلب (مثل قصور في القلب،

إضطرابات في النظر)

• كنت تعاني أو عانت في الماضي من مشاكل في الجهاز التنفسى، إلتهاب

كيس المرارة (مثل التهاب)

• كنت تعاني أو عانت في الماضي من مشاكل في المعدة (مثل القرحة)

• كنت تعاني أو عانت في الماضي من مشاكل في وظيفة الكبد

• كنت تعاني أو عانت في الماضي من مشاكل في الجهاز العصبي أو إضطرابات نفسية

• كنت تعاني أو عانت في الماضي من مشاكل في وظيفة الكلى (مثل القصور الكلوي

أو حصى في الكلى)

• كنت تعاني أو عانت في الماضي من مشاكل في العينين (مثل جلوكوما ضيق الزاوية)

٢) إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة

طبية وأدوية ذاتية، أخذ للطبيب أو الصيدلي خاصية إذا كنت تتناول:

يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي خاصية إذا كنت تتناول:

• أدوية مضادة لفازن الكوليدين أو ذات فعالية مضادة لفازن الكوليدين (مثل المستحضرات

المضادة للتشنج في البطن)

• أدوية لعلاج الإسهال

• Atropine - أدوية لعلاج المشاكل في العينين

٣) إستعمال الدواء والطعام يجب تناول الدواء أثناء فترة العمل والإمساء.

• حمل والإمساء إذا كنت تخطط أنت وزوجتك للحمل، يجب التحدث مع الطبيب قبل

استعمال الدواء.

• خصوصية الرجل إذا كنت تخطط أنت وزوجتك للحمل، يجب الإمساء

٤) السياقة واستعمال الماكينات سالفكال قد يؤدي إلى دوار و يؤثر على رؤيتك، خاصة

قد تعايش مشاكل في الرؤية الليلية، إذا حدث لك هذا، فلا يجوز السياقة أو تشغيل الماكينات

الخطيرة.

• قد يسبب هذا الدواء فرط العرق ولذلك يجب الإكثار من الشرب من أجل من

دوافع تختلف!

٥) كيفية إستعمال الدواء؟

• يجب الإستعمال حسب تعليمات الطبيب دائماً، عليك الاستفهام من الطبيب أو

الصيدلي إذا لم تكن واثقاً

• الجرعة الدوائية وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

• لا تتجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.

• يجب بلع الدواء من الماء، يجب تناول الدواء أثناء وجبات الطعام أو بعدها مباشرة.

• إذا تناولت بالخطأ جرعة دوائية أكبر، إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا بلع طفل بالخطأ من