

והבא אריזות התרופה איתה. • אם שכחת לטלול את התרופה: אם עברו פחות מ- 6 שעות מהזמן הרגל בוגר או נטל את התרופה, קח עם אוכל מיד כשןכחת.

את המנה הבאה קח באחוריו של לפחות 3-4 שניות. אם עברו יותר מ- 6 שעות, קח מנה אחת. אין לקחת מנה כפולה על מנת לפחות על המנה שנשכחה.

• יש להמניע בטיפול פפי שהומלץ על ידי הרופא. • אין לטלול תרופות בחושך בודק התוויות והמנה **בכל פעם** שהנק נטל תרופה. הרוב משקעים אם הג' זקוק להם. אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, הייעוץ ברופא או ברוקטן.

4. תופעות לוואי: כמו בכל תרופה, השימוש בתרופה זו עשוי לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תبالغ למקרא רשימת התופעות הללו. יתכן ולא תסבול מכך אף אתה.

• **יש להפסיק את השימוש ולפנות בהקדם האפשרי לתרופה אם הנך מרגיש חולשה וצורך לשכב, בלבול, דיכאון, עצבנות, כאב חזק בעורקים, כאב בחזה, גריי בעור, עיניים אדומות, נפוחות או כאבות, כאב בסיס חזק.**

תופעות לוואי שכיחות מודגשות:

- תופעות דמיות שפעת
- העה
- כאבי ראש
- שכיחות מוגברת לצורך במתן שתן

תופעות לוואי שכיחות:

- עיפות
- צמירותות
- מלטה

• גאגנות לאנרגיות כגון פריחה ונירוח

• סחרנות, עצרות

• בעיות עיכול, כאב בטן, בחילה, הקאה

• ריר או יתר

• הסmekה, עיליה בלחץ הדם

• דיפיקלות לב

• עיניים דלולות, פגעה בראייה, עיניים אדומות, נפוחות וכואבות

תופעות לוואי לא שכיחות:

• דחף תכווף יותר במתן שתן

• גידום

תופעות לוואי נספחות שנצפו בשימוש עם החומר הפעיל פילוקרפין:

• קשי נשימה

• כאב בסיס או קיבוה חמוץ

• שייניסטים בקצב הלב

• יתרה בלחץ הדם, התעלפות

• רעד

• שינויים במצב נפשי כדוגמת ציכרונו, שינוי מצב רוח ובלבול

• אם הופיעה תופעת לוואי, אם אתה מטופלת הולמי מחמיר, או כאשר אתה סובל מטופפת לוואי שלא הזכרה לעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

5. איך לאחסן את התרופה?

• מנตรעלתו או כל תרופה אחרת יש לשמר במיקום סגור מחוץ להישג ידים של ילדים ויאו תינוקות ועל ידי קר המגע הרעלתו. אל תגרום לך לאלה מפרשת מהרפה.

• אין להשתחם בתרופה אחר תאריך התופה (exp. date) המופיע על גבי האנייה/בקבוק/קרטון/תוויות. תאריך התופה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.

• תני אחסון: אחסן בטמפרטורה הנמוכה מ- 25°C.

• לאאר הפתיחה ניתן להשתמש במשך חדש ימים.

6. מידע נוספים

• נסף לעצמך הפעיל התרופה מכילה גם: Microcrystalline Cellulose, Colloidal Silicon Dioxide, Stearic Acid.

• כדי גוראות התרופה ונה תוקן אරואה: טליות לבנות האורות בצענות פלסטיין, 30 טבליות באריה. שם לב - הארואה מכילה שkeit חומר סופוח לחות להגנה על הטבליות.

• בעל הרישום ונתובתו: סמ"און בע"מ, העבודה 25 בת-ים.

• עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך: מאי 2014. • מס' רישום התרופה בפקולס התרופות הממלכתי בישראל: 8381519333938.

• לשם הפ湿ות ולהקלת הקיריאת, עלון זה נסוח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

סלבקל סבליות

- חומר פעיל: HCl 5 mg – פילוקרפין הידrocירוליד 5 מ"ג
- קרא נגין את העלון עד סוף ברום תשמש בתהופה. עלון זה מכיל מזע תמצתי על התרופה. אם יש לך שאלות נספנות, פנה אל הרופא או אל הרוקן.
- תרופה זו נרשמה עברך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק למם אפסלו אם רואה לך כי מצבם הרפוא זונה.
- התרופה אינה סיועת לילדים מתחת לגיל 18 שנים.

1. למה מייעצת התרופה?

- לטיפול בסבלי כאב מוגבר ממכבי התרופה השגרתי על ידי טיפול דידורפי של סרין ראש וצוואר.
- לטיפול בהחלפת סיוגן אשוגבנה בביופתיה.
- קבוצה תרפוטית: פראיםפטומיטים.

2. לפני שימוש בתרופה

☒ אין להשתמש בתרופה אם:
• הנך ברוון או מניקה
• ידועה רישוש לאחד ממכבי התרופה
• הנך מתחת לגיל 18 שנים
• הנך סובל מסתמה לא מטופלת הנשימה, דלקת עיים או לא אלאקומה
• הנך סובל ממחלה לב או לב לא מטופלת
• הנך סובל ממחלת כרונית המטפלת בתהופה על מנת פעילות דומה להתרופה זו

אהירות מיחדות הנגעות לשימוש בתרופה

3. לפני הטיפול בסלבקל, ספר לזרוף אם:

- אתה סובל או סבלת בעבר מבעיות בכיס המרה (כגון אבום בכיס הרורה)
- אתה סובל או סבלת בעבר מבעיות בכיס המריה (כגון כיב)
- אתה סובל או סבלת בעבר מבעיות בכבד (כגון ספיקת לב, הפרעות כספיות)
- אתה סובל או סבלת בעבר מבעיות בכיס המריה (כגון אבום בכיס הרורה)
- ליליות או באנים בלילה)
- אתה סובל או סבלת בעבר מבעיות עיניים (כגון גלאוקומה צרת חזיות)

☒ אם אתה לזרק, או אם לאקזתת לאחרונה, ספר עלך לזרוף:

במיוחד של לזרע את הרופא או הרוקן אם אתה לזרק:

- תרופות לא מרשם וטספי תזונה, ספר עלך לזרוף לב (כגון חוסמי ביטא)
- תרופות אטי כליירגיות או בעלות אטיכוןרגיות (כגון תכשירים נגד עיתות בבלוט)

• תרופה לטיפול בשלשולים

• Atropine - תרופות לטיפול בעבויות בעיניים

☒ שימוש בתרופה ומונן ש"י ליטול את התרופה בזמן או מיד אחרי:

• פרויות הגבש אם אתה בוגר ממכבים הרוון והנקה, ליטול השילוש בתרופה.

• נהייה ושימוש במכינות סלבקל עלולים לגרום לסתורות ולהיפגע

על הראייה שער, במיעודו או על חותות בראיית לילית. אם זה קורה לך, אין לנוגג או להפעי מכונות מסוכנות.

• תרופה או עוליה לזרום לרוגם להרעת יתר וכן יש להרבות בשתייה בכדי למנוע התיבשות!

3. כיצד תשמש בתרופה?

- תמיד יש להשתמש לפי הוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקן אם עירך בטוח.

• המין ואופן הטיפול יקבע על ידי הרופא בלבד.

- אין לנברוא על המנה המומלצת

• יש לבלוע את התרופה עם מים. יש ליטול את התרופה בזמן או מיד אחרי ארוחות.

☒ אם נטלה בטיעות מינון גבואה יותר:

אם נטלה מנטה יתר או אם בטיעות בלע ידלן תרופה פנה מיד לרופא או לחדר מוץ של בית חולים