

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة
مستحضرات - ١٩٨٦
يسوّق الدواء بدون وصفة طبيب

الالمانيرفين أقراص

المادة الفعالة وكيفيتها:

- كل قرص يحتوي على ما يقارب ٥٠ ملجم من الصوديوم
- كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة: أقراص مطلية ببنية.
- ١٠، ٣٠ قرصاً ضمن عبوة لوبيحة؛ ٢٠ قرصاً ضمن علبة قبينة.
- المنتاج وصاحب الإمكانيات: سام-أون.م.ض، شارع هاعفودا ٢٥، بات - يام
- رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: ٤٦ ٣٠ ٢٢٩١٧

٦) معلومات إضافية:

يحتوي الدواء بالإضافة للمواد الفعالة أيضاً: Microcrystalline Cellulose, Sodium Starch Glycolate, Magnesium Stearate, Colloidal Silicon Dioxide, Pigment Blend, Vanillin, Talc, Eudragit, Titanium Dioxide, Carbowax 6000.

كل قرص يحتوي على ما يقارب ٥٠ ملجم من الصوديوم

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة: أقراص مطلية ببنية.

١٠، ٣٠ قرصاً ضمن عبوة لوبيحة؛ ٢٠ قرصاً ضمن علبة قبينة.

المنتاج وصاحب الإمكانيات: سام-أون.م.ض، شارع هاعفودا ٢٥، بات - يام

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

٤٦ ٣٠ ٢٢٩١٧

أقرت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحتهاها شخص ورخص في تاريخ:

٢٠١٤٠١٤ حزيران من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكرة على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

لا يجوز إستعمال هذا الدواء لفترات متقاربة أو لفترة مطولة بدون إستشارة الطبيب.

- يجب بلع الدواء مع الماء.

- بالإمكان سحق الأقراص مباشرة قبل بلعها.

- لا يجوز تخزين أقراص مسحورة.

إذا تناولت بالخطأ جرعة دوائية أكبر أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى، وأحضر عليه الدواء معك. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

- لا يجوز تناول الأدوية في العتمة. يجب تشخيص طابع الدواء والتذكر من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء.

- ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

- إذا توفرت لديك أسلطة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

٤) الأعراض الجانبية:

كم بكل دواء، إن إستعمال كالمانيرفين أقراص قد يسبب أعراضًا جانبية عند بعض المستعملين مثل: غثيان، صداع، فلق وتنفس الكبد لدى المستعملين لفترات مطولة.

في حال شعورك بعرض جانبية لم يذكر في هذه النشرة، أو إذا طرأ تغيراً على شعورك العام، عليك إستشارة الطبيب حالاً.

٥) كيفية تخزين الدواء؟

- يجب التسخيم يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي

- ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادى إصابتهم بالتسخيم.

- لا يجوز إستعمال الدواء بعد انتهاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

- يجب حفظ عبوة الدواء مغلقة بإحكام بدقة حرارة لا تزيد عن ٢٥ درجة مئوية.

- لا يجوز رمي الأدوية في المجاري أو في القمامات. إسال الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية غير المستعملة. هذه الوسائل تساعد في الحفاظ على البيئة.

٦) إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحدى للطبيب أو الصيدلي عن ذلك. يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بالأخصوص إذا كنت تتناول:

- أدوية مساعدة على النوم.

- أدوية مهدئات.

- أدوية للصرع.

- ليقودوا (العلاج من مرض باركنسون).

- مسكنات الآلام من فصيلة المخدرات.

- أدوية إضافية مهدئات.

- كحول.

- لوبيراميد.

- لورازيبام.

- أدوية تؤدي إلى تسمم الكبد.

٧) إستعمال الدواء وإستهلاك الكحول:

لا يجوز شرب النبيذ / أو المشروبات الروحية أثناء فترة العلاج بهذا الدواء.

٨) الحمل والإرضاع:

يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل إستعمال الدواء وذلك إذا كنت في فترة الحمل أو في فترة الرضاعة.

٩) السياقة وإستعمال الماكولات:

إن إستعمال هذا الدواء قد يضعف من القدرة على ذلك يجب توخي الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبة. تشنيل ماكولات خطرة وفي أي نشاط يتطلب القيادة.

١٠) لأي غرض مخصوص الدواء؟

- مهدئ في حالات التوتر والعصبية المفرطة.

- مساعد على النوم.

الفصيلة العلاجية: من المواد المهدئة، المساعدة على النوم.

١١) قبل إستعمال الدواء:

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (البريجي) للمواد الفعالة (پاسيفلورا، فاليريان، فيتامين B₁ أو

- فيتامين B₆) أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء.

لا يجوز تجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.