

**نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) ١٩٨٦**

يسوق الدواء بدون وصفة طبية

## جليسرين، فئاتل للأطفال، ١,٣٣ غرام

المادة الفعالة وكميتها:

كل فتيلة تحتوي:

١,٣٣ غرام جليسرين (g Glycerin 1.33)

## جليسرين، فئاتل، ٢,٣٥ غرام

المادة الفعالة وكميتها:

كل فتيلة تحتوي:

٢,٣٥ غرام جليسرين (g Glycerin 2.35)

لثلاثة مواد غير الفعالة، الرجاء انظر الفقرة ٦.

**إقرأ النشرة وتبعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء.**

تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء، إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

جليسرين، فئاتل- الدواء غير مخصص عادة للأطفال ورضع دون عمر ٦ سنوات.

جليسرين، فئاتل للأطفال - لا يجوز الإستعمال لدى أطفال دون عمر سنتين بدون تعليمات من الطبيب.

عليك إستعمال الدواء بصورة صحيحة. إستشر الصيدلي إذا كنت بحاجة لمعلومات إضافية.

عليك مراجعة الطبيب إذا تفاقمّت علامات المرض (الأعراض) أو إذا لم تتحسن بعد ٧ أيام.

**(١) لأي غرض مخصص الدواء؟**

• هذا الدواء مخصص للتخفيف من الإسهال.

**الصيدلة العلاجية:** مسهّل.

**(٢) قبل إستعمال الدواء:**

❗ **لا يجوز إستعمال الدواء:**

- إذا كنت حساساً (اليرجي) للمادة الفعالة (جليسرين) أو لأحد مركبات الدواء الأخرى.
- لا يجوز إستعمال مستحضر مسهل إذا لم يحدث نشاط معوي لفترة يوم واحد أو يومين
- في حالة قصور القلب.
- في حالة حدوث زفّ شرجي مجهول السبب وفي حالة إسهال الأمعاء أو نقص مزمن في وظيفة الأمعاء.
- في حالات الغثيان، التقيؤات، آلام البطن.
- في حالات ظهور علامات للإنتهاب الزائدة الدودية.

**تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء:**

• تحذير: إن الإستهال المتواصل قد يؤدي إلى التعلق بالمسيلات كهذا الدواء.

• لا يجوز إستعمال هذا الدواء في فترات متقاربة أو لفترة متواصلة بدون إستشارة الطبيب.

• هذا المستحضر مخصص فقط لمعالجة الإسهال المستمر لعدة أيام، إن عدم التفرط ليوم أو يومين لا يبرر إستعماله كذلك، لا يجوز إستعماله لأغراض أخرى مثل "تنقية الجسم" وما شابه.

• يجب إبلاغ الطبيب عن أي حساسية لديك لأي طعام أو عقاقير، قبل تناول الدواء.

❗ **قبل العلاج - جليسرين إحد للطييب إذا:**

- كنت حامل أو في فترة الرضاعة.
- كنت تعاني أو تعاني في الماضي من خلل في وظيفة القلب و/أو الأوعية الدموية، جهاز الهضم.
- لاحظت تغير مفاجئ في وثيرة النشاط المعوي والمستمر لأكثر من أسبوعين.

❗ **إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحد للطبيب أو الصيدلي عن ذلك.** يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بالأخص إذا كنت تتناول:

أدوية مسهلة أخرى.

❗ **الحمل والإرضاع:**

إذا كنت حامل أو في فترة الرضاعة، يجب إستشارة الطبيب أو الصيدلي قبل إستعمال الأدوية.

**(٣) كيفية إستعمال الدواء؟**

• عليك الإستيحاء من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً.

**المقدار الدوائي الاعتيادي عادة هو:**

**جليسرين فئاتل:** فتيلة واحدة في اليوم حسب الحاجة.

هذا الدواء غير مخصص عادةً للأطفال ورضع دون عمر ٦ سنوات.

**جليسرين فئاتل للأطفال:** فتيلة واحدة في اليوم للأطفال حسب الحاجة.

لا يجوز الإستعمال لدى أطفال دون عمر سنتين بدون تعليمات من الطبيب.

**لا تتجاوز الجرعة الموصى بها.**

• لا يجوز البلع.

• للإستعمال الخارجي فقط.

**تعليمات الإستعمال:**

كيفية إدخال الفتيلة:

(١) أولاً، إسطف يدك جيداً.

(٢) إنزع غلاف الفتيلة وربطها بظلمن من الماء.

(٣) إستلق على جانبك، إدفع الفتيلة عميقاً ما أمكن داخل الشرج، وبواسطة الإصبع إذا كانت الفتيلة ليينة بحيث لا يمكن إدخالها، يرددها في البراد لفترة ٣٠ دقيقة أو وضعها تحت تيار من ماء بارد قبل إخراجها من غلافها.

(٤) إسطف يدك بعد إدخال الفتيلة.

يجب الحرص على شرب السوائل خلال اليوم الأمر الذي يساعد على تليين البراز. يبدأ عمل المستحضر عادة خلال ٦٥-٦٠ دقيقة.

**إذا إستعملت بالخطأ مقدار دوائي أكبر**

إذا أفرطت في استعمال المقادير الدوائية أو إذا بلع الطفل خطأ من هذا الدواء، عليك التوجه إلى الطبيب أو للمستشفى حالاً

مصطحباً عبوة الدواء.

• لا تتناول أدوية في العتمة، يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقادير الدوائية **في كل مرة** تتناول فيها

دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

**(٤) الأعراض الجانبية:**

كما بكل دواء، إن إستعمال جليسرين قد يسبب أعراضاً جانبية مثل طمح جلدي مترافق بتفجع، غثيان، دوام، عند بعض المستعملين. لا تندهش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها.

**يجب التوقف عن إستعمال الدواء ومراجعة الطبيب حالاً إذا:**

• كنت تعاني من تفجع موضعي، من طمح موضعي أو من الإنتهاب.

• ظهر زفّ شرجي أو لم يحدث نشاط معوي بعد إستعمال المستحضر.

إذا تفاقمّت إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

**(٥) كيفية تحزين الدواء؟**

• يجب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب!

• لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العبوة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

• بدرجة حرارة حتى ٢٥ درجة مئوية (درجة حرارة الغرفة).

**(٦) معلومات إضافية:**

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً:

كل فتيلة جليسرين تحتوي ١٩,٨ ملغ صوديوم، كل فتيلة جليسرين للأطفال تحتوي ١١,٢ ملغ صوديوم.

Stearic acid, sodium carbonate, water

■ كل فتيلة جليسرين تحتوي ١٩,٨ ملغ صوديوم، كل فتيلة جليسرين للأطفال تحتوي ١١,٢ ملغ صوديوم.

■ **كيف يبدو الدواء وما محتوى العلية:**

■ **جليسرين فئاتل للأطفال:** فتيلة بيضوية شفافة

■ تتوفر الفئاتل بلويحات ألومنيوم ضمن ذات ٥ أو ٥٠٠ فتيلة.

■ **جليسرين فئاتل:** فتيلة بيضوية شفافة.

■ تتوفر الفئاتل بلويحات ألومنيوم ضمن علب ذات ٢٠,٤٠,١٠٠ أو ٥٠٠ فتيلة.

■ **المنتج وصاحب الإمتياز وعنوانه:**

■ سام.أرن.م. ض.ى. شارع ماعافولدا ٢٥، بات.يام.

■ **رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:**

■ **جليسرين فئاتل للأطفال:** ٢٠٠ ٢٥٨٤٣ ٨١ ٠٢٣

■ **جليسرين فئاتل:** ٦٠٠ ٢٨٢٥٥ ٢١ ٠٢١

■ أقرت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحتواها مُحص وُرخص في تاريخ: تموز ٢٠١٣.

■ من أجل سهولة وتبوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكّر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

101080026503