

עלוו לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986

התרופה משווקת ללא מרשם רופא

גליצרין, פתילות לילדים, 1.33 גרם

החומר הפעיל ובנותו:

כל פתילה מכילה:

1.33 גרם גליצרין (g 1.33 Glycerin)

גליצרין, פתילות, 2.35 גרם

החומר הפעיל ובנותו:

כל פתילה מכילה:

2.35 גרם גליצרין (g 2.35 Glycerin)

לרשימת החומרים הבלתי פעילים, אנגז ראה סוף פ.6

קרא בעיון את העלוו עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.
עלוו זה מכיל מידע תמציתי על התרופה, אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

גליצרין, פתילות - התרופה אינה מיועדת בדרך כלל לילדים ותינוקות מתחת לגיל 6 שנים. גליצרין, פתילות לילדים - און להשתמש בילדים מתחת לגיל שנתיים בלא הוראה של רופא.
עליך להשתמש בתרופה בצורה הנכונה, היוועץ ברוקח אם הנך זקוק למידע נוסף.
עליך לפנות לרופא באם סימני המחלה (הסמנים) מתמירים או אינם משתפרים לאחר 7 ימים.

1. למה מיועדת התרופה?

• התרופה מיועדת לרקולת עצירות.

קבוצה תרופית:

משלשל.

2. לפני שימוש בתרופה:

⚠️ אין להשתמש בתרופה:

- אם אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל (גליצרין) או לאחד ממרכיבי התרופה האחרים.
- אין להשתמש בתכשיר משלשל אם לא הפיעה פעילות מעיים במשך יום אחד או יומיים.
- במקרה של אי ספיקת לב.
- במקרה של דימום רקטלי בלתי מוסבר ובמקרה של חסימת מעיים או חוסר תפקוד כרוני של המעיים.
- במקרים של בחילות, הקאות, כאבי בטן.
- במקרים של סימנים של דלקת התוספתן.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

• זהירות! שימש ממושך עלול לגרום תללות בתכשירים משלשלים כגון זה.
• אין להשתמש בתרופה זו לילדים קרובות או תקופה ממושכת בלי להיוועץ ברופא.
• תכשיר זה מיועד רק לעצירת הנמשכת מספר ימים. חוסר פעילות המעיים ליום אחד או יומיים אינו מצדיק את השימוש בו. כמו כן, אין להשתמש בו למטרות אחרות כגון "ניקוי הגוף" וכדומה.
• אם אתה רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על-כך לרופא לפני נטילת התרופה.

⚠️ לפני הטיפול בגליצרין ספר לרופא אם:

- את בהריון או מיקה.
- אתה סובל או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד: הלב ו/או כלי הדם, מערכת העיכול.
- הבחנת בשינוי פתאומי בתדירות פעילות המעיים אשר מתמשך מעל לשבועיים.

⚠️ אם אתה לוקה, או אם לוקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.
במיוחד יש לידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח: תרופות משלשלות אחרות.

⚠️ הריון והנקה:

אם את בהריון או מיקה יש היוועץ ברופא או ברוקח לפני השימוש בתרופות.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

• עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.

המינון המקובל בדרך כלל הוא:

גליצרין פתילות: פתילה אחת ביום לפי הצורך.

תרופה זו איפה מיועדת בדרך כלל לילדים ותינוקות מתחת לגיל 6 שנים.

גליצרין פתילות לילדים: פתילה אחת ליום לילדים לפי הצורך.

אין להשתמש בילדים מתחת לגיל שנתיים בלא הוראה של רופא.

אין לעבור על המנה המומלצת.

- אין לבלוע.
- לשימוש חיצוני בלבד.

הוראות שימוש:

כיצד להחזיר את הפתילה:

1.ראשית, שטוף היטב את ידך.
2.סטר את העטיפה של הפתילה והרטב במעט מים.
3.שכב על הצד, דחוף את הפתילה עמוק ככל שתוכל אל תוך הרקטום, בעזרת האצבע, אם הפתילה רכה מדי לאפשר את החזרתה, קרר אותה במקרר למשך 30 דקות או הורם עליה מים קרים לפני הוצאתה מהטופה.

4.שטוף את ידך לאחר החזרת הפתילה.

יש להקפיד על שתיית נוזלים במשך היום שתעזור בריכוך הצואה.

התכשיר פועל בדרך כלל תוך 15-60 דקות.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר

אם נטלת מנת יותר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית-חולים, והבא אריזת התרופה איתך.

• אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה **בכל פעם** שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי:

כמו בכל תרופה, השימוש בגליצרין עלול לגרום לתופעות לוואי כגון פריחה בעור עם גירויים, בחילה, סחרחורת, בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

יש להפסיק את השימוש בתרופה ולפנות מיד לרופא אם:

- אתה סובל מגירוי מקומי, מפריחה מקומית או מדלקת.
- מופיע דימום רקטלי או העדר פעולת מעיים אחרי שימוש בתכשיר.
- אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעות לוואי שלא הוזכרה בעלוו, עליך להתייעץ עם הרופא.

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלתו תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא!
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date). המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- בטמפרטורה של עד 25°C (טמפרטורת החדר).

6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל, התרופה מכילה גם:

כל פתילת גליצרין מכילה 19.8 מ"ג נתון, כל פתילת גליצרין ילדים מכילה 11.2 מ"ג נתון, Stearic acid, sodium carbonate, water

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

גליצרין פתילות לילדים: פתילה אובלית שקופה.

הפתילות מגיעות במגושים אלומיניום באריזות של 5 או 500 פתילות.

גליצרין פתילות: פתילה אובלית שקופה.

הפתילות מגיעות במגושיות אלומיניום באריזות של 20, 40, 100 או 500 פתילות.

היצרן ובעל הרישום וכתובתו:

סס-און בע"מ, רח' העבודה 25, בת-ים.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

גליצרין פתילות לילדים: 033 81 25843 00

גליצרין פתילות: 031 38 25506 00

עלוו זה נבדק ואושר על ידי משרד הבריאות בתאריך: יולי 2013.

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

תמונתחומר101

