

**עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים
(תשי"ט ה'תשנ"ו) – 1986**

התרופה משוקקת ללא מרשם רפואי

חומרה פולית 5 מ"ג

טבליות

החוור הפעיל וכמותו:

כל בקבילה כיליה:

5 מ"ג חומרה פולית (5 mg Folic Acid 5 mg) סופו בטרם
ררשימת החומרה הבלתי פעיל, ואנו

ראם סעף.

קרא בעין את העלון עד סופו בטרם

תשמש בתרופה. לעון זה מכל

יעוט המציג עלייה תרופה, אם שיר

רמיידין, קרבופין, פורבריטיל) –

יש צורק לבודק רמתןם בדם ובמידת

ולוך: שיר לבלו את התרופה בזרועה הכנונה.

יעיר לבלו את התרופה בזרועה הכנונה.

הויעץ ברוקח אם הנק זיקק למידע

סף.

1. מה מועדת התרופה?

התרופה מיועדת לחסר בחומצה

פולית.

קבוצה תרפיטית:

חומרה פולית ונגירותה.

2. לפני השימוש בתרופה:

չ אין להשתמש בתרופה אם:

• אתה רגש (אלרגי) לחומר הפעיל

(חומרה פולית) או לאחד ממרכיבי

התרופה אחרים.

3. כיצד תשמש בתרופה?

אין להשתמש בתרופה זו לעיגיות

קרובות או תקופת ממשכת בילוי

הויעץ רופא.

• מונן זה אינו מותאים לנטילה יומיות

בגל הפוריות.

3. לפני הטיפול בחומרה פולית 5 מ"ג:

טבליות ספו לזרוף אם:

• אתה נובל או סבלת בעבר מאנמיה

סוגרים טוים.

• אתה רגש למון כלשהו או לתרופה

לשנה, לעיר להודיע על-כך לרופא

לפני נטילת התרופה.

5. איך לאחסן את התרופה?

- מגע רעללו! תרופה זו וכילו תרופה אחרת יש לשמר במקומות סגור מחוץ להישג ידים וואיתם של ילדים / ואן תינוקות ועל ידי תמן המעליה, תגרום להתקאה לא הוארה מפושתת מרופא.
- אין לשאתתmesh בתרופה אחריה תאריך התרופה (exp. date) המשוער על ידי האיאת, תאריך התרופה מתיחס ליום החזון של אותו חדש.
- אחסון בסביבה רכהה דבון או לאשהה.
- אין להשאיר תרופה לבוב או לאשהה שאל את הרופך כדי לשמשה תרופה שאיכון בשימוש. אמצעים אלו ייזדו לשמר על הסביבה.

6. מידע נוספים:

טבליות על חומרה הפעיל, התרופה מכילה גם:

Microcrystalline Cellulose, Sodium Starch Glycolate, Magnesium Stearate, Colloidal Silicon Dioxide, Lactose, Amylum, Talc.

כל טבליה מכילה – כ- 31 מ"ג לקסן.

כיצד וראית התרופה והה תוכן הארית:

טבליות צהבהבות קטנות באריות מוגשת אריזות התרופה מכלות 30 טבליות.

ירון, בעל הרישום וכותבתו:
ס-פ-און בע"מ, רח' העבודה 25, בת-ים.

**מספר רישום התרופה בפנקס
התרופות הממלכתי' במשרד
 הבריאות: 58-92-27313**

עלון זה בדק ואישר על ידי משרד
הבריאות בתאריך: מאי 2014.

שם הפעטהות ולהקלת הקיראה, עלון זה
נשוח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה
מיועדת לבני שני המינים.

שים לב: יש לחכות פרק זמן של
שתיים לחפות בין נסלת תרופה זו
לבין נסלתות ווורוי חומרה המכילים
אלומינום.

אם נסלת מנת יתר או אם בעיות
בלע לדן מן התרופה, פנה מיד לרופא
או לרופר מין של בית-חולים, והבא

אם שחתת ליטול תרופה זו בזמן
הדרוגה יש ליטול את המנה מיד
לשנctorה. אין ליטול שתי מנות ייחד.
גם אם יש שיפור במצב בריאותך, אין
להפסיק טיפול התרופה ללא הרשות
עמם הרופא או הרוקח.

או אין ליטול הרופא בחושן בדק התוiot
וינהגה בכל פעע שהנק נסכל תרופה.
הרוכך שקשפים אם הנק דזקק להם.
אם יש לך שלשות סופות בגונג שליטוש
בתרופה, הוועץ בזרוף וא בזרקה.

4. תופעות לוואי:

כמו בכל תרופה, השימוש בחומרה
פולית 5 מ"ג טבליות עלול לגרום
לתופעות לאו-בלוק מלהשתמש. אל
תיבהל להתקאה רשיתת תפעות הללו.
יתכן ולא תסבל מכך אהת מון.

יש להפסיק את הטיפול ולפנות מיד
לרופא אם חווית האות:

הורחות ותופעות המרכיבים:
• אתה סובל מ眩ום
• קוצר נשימה וולץ בחזה
• הארכת עור
• בחליה וחוסר נזות
• פריחה בעור
• גרד או עקצוץ בעור
• אין בזבון.

5. תופעות לוואי נספהות:

• חומר TABON
• גיאום
• תחחות נזות בעטן
• מנוט דולדות יכולות גורם להצבת
השתן

אם אתה מטופל בדרכ' כל הווא:
• סבליה אהת לון.
אין לעבורי על הנונה המומלצת.
אין לטענו שי לבלו את התרופה עם
מי. ניתן לכתש את הנק בימי השינוי.

רנק בהרין או מניקה, או מתכונן
להרות או להינק בזרבוב.
• הנך סובל מגידולים סופטיים.

רהורן ורוכה: אם הנך בהרין או מניקה יש להוועץ
ברופא לפוי שימוש בהרופה.

אם אתה לוקח, או אם לך
לאחרונה, תרופות אחרות כולל
רהורות לאו-רהורות וטומפי תזונה;
ספר על כן לזרוף או להוקח. במקרה
יש לידע את הרופא או הרוקח אם אתה

לוחרק.

• גולות למעט הרין

• רימיטיאמין

• ררפווטנד עוזוויות (פנטואין,

פרמידין, קרבופין, פורבריטיל) –

יש צורק לבודק רמתןם בדם ובמידת

הצורך לננות מין

• אסטירוגנום

• טטאורקלט

• אנטיביוטוקס ממסוג מסויים –

טראמיפין, טרימופרין,

ולופאנכאידים (סולאלטאמידין)

• פלאורואורציל – לטטוף ברטון

• חכירים לחומרה המכילים אלומינום

או מנגנונים

• ויסטמינר וטומפי תזונה

6. תרופה פולית 5 מ"ג

7. אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש

בתרופה:

• אין להשתמש בתרופה זו לעיגיות

קרובות או תקופת ממשכת בילוי

הויעץ רופא.

• מונן זה אינו מותאים לנטילה יומיות

בגל הפוריות.

8. אזהרות מיוחדות בתרופה:

• אתה רגש (אלרגי) לחומר הפעיל

(חומרה פולית) או לאחד מרכיבי

התרופה אחרים.