

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة

مستحضرات - ١٩٨٦

سوق الدواء بدون وصفة طبية

حمض الفولي ٥ ملخ

أقراص

المادة الفعالة وكيفيتها:

كل قرص يحتوي على:

٥ ملخ حمض الفولي (Folic Acid 5 mg)

لائحة الماء غير الفعال، الرجاء انتظار الفترة

عن الدواء.

اقرالنشرة يتعذر حتى نهايةها قبل إستعمالك

للدواء، يتعذر هذه النشرة على معلومات موجزة

عن الدواء.

إذا توفرت لديك أسلطة إضافية، راجع الطبيب

أو الصيدلي.

عليك بلع الدواء بالصورة الصحيحة، إستشر

الصيدلي إذا كنت تحتاج لمعلومات إضافية.

(١) لأي غرض مخصوص الدواء؟

الدواء مخصوص لعلاج نقص حمض الفولي.

الفضيلة العلاجية: حمض الفولي ومشتقاته.

(٢) قبل إستعمال الدواء:

لابلا يجوز استعمال الدواء إذا:

• كرت مسasa (البرجمي) للمادة الفعالة

(حمض الفولي) أو لأحد مركبات الدواء

الآخر.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

• لا يجوز استعمال هذا الدواء في أحيان مقاربة

أو لفترة طويلة بدون استشارة الطبيب.

• هنا المقدار الدوائي غير ملائم للتناول اليومي

في من المخصوص.

• قبل العلاج بحمض الفولي ٥ ملخ أقراص

احذ للطبيب إذا:

• كرت تعاني أو عانيت في الماضي من فقر

دم من أنواع مختلفة.

• كرت حساس لأي طعام أو لاي دواء، عليك

إبلاغ الطبيب عن ذلك قبل تناول الدواء.

• كرت في فترة الحمل أو في فترة الرضاعة،

أو تخطيظين للحمل أو الرضاعة قريباً.

• كرت تعاني من أورام سرطانية.

الحمل والإرضاع

إذا كنت في فترة الحمل أو مرحلة، يجب استشارة

الطبيب قبل إستعمال الدواء.

إذا تناولت جرعة دوائية مفرطة أو إذا بلغ

طفل بالطبع من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب

أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية

عن ذلك، يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي خاصة

إذا كنت تناول:

• أقراص لمنع الحمل

• أدوية مضادة للإلتلاجات (فينيتوفين،

بيريميدون، كاربامازيبين، فينوباربیتال -

هذا ضرورة الفحص نسبة هذه الأدوية في

الدم وتحقيق الجرعة الدوائية إذا دعت الحاجة.

• استروجينات

• ميتوتيكيمات

• مصادر حيوية من نوع معين - تريامينات،

تريموتيريز،

• سولفاميدات (سولفاسالازين)

• فلواوروراسييل - لعلاج السرطان

• مستحضرات الملحيف على جهاز

الضم - مصادر المجموعات التي تحيي

المينيوم أو مينزيريوم

• مستحضرات تحتوي موئيء (مثل فينامينات أو

إضافات غذائية):

• معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي المستحضر على لكتوز وقد يسبب الشرر

للاشخاص الحساسين للكتوز.

(٣) كيفية إستعمال الدواء؟

• عليك الإستحسان من الطبيب أو الصيدلي

إذا لم تكن واثقاً.

الجرعة الدوائية الإعتدالية عادة هي:

قرص واحد في اليوم.

لا تتجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.

لا يجوز المضغ، يجب بلع الدواء مع الماء. يمكن

سحق الأقراص قبل الإستعمال.

على الأقل بين تناول هذا الدواء وبين تناول

مساءات الحموضة التي تحدى الومينيوم.

إذا تناولت جرعة دوائية مفرطة أو إذا بلغ

طفل بالطبع من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب

أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى، وأحضر

عليه الدواء معك.

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المطلوب

فيجب تناول الجرعة حال تذكرك، لا يجوز تناول

جرعتين معاً.

يجب دميتامين

أدوية مضادة للإلتلاجات (فينيتوفين،

بيريميدون، كاربامازيبين، فينوباربیتال -

هذا ضرورة الفحص نسبة هذه الأدوية في

الدم وتحقيق الجرعة الدوائية إذا دعت الحاجة.

• استروجينات

• ميتوتيكيمات

• مصادر حيوية من نوع معين - تريامينات،

تريموتيريز،

• سولفاميدات (سولفاسالازين)

• فلواوروراسييل - لعلاج السرطان

• مستحضرات الملحيف على جهاز

الضم - مصادر المجموعات التي تحيي

المينيوم أو مينزيريوم

• مستحضرات تحتوي موئيء (مثل فينامينات أو

إضافات غذائية):

• معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي المستحضر على لكتوز وقد يسبب الشرر

للاشخاص الحساسين للكتوز.

(٤) الآعراض الجانبية:

كما بكل دواء، إن إستعمال حمض الفولي ٥ ملخ

أعراض قد تسبب أعراض جانبية عند بعض

المستعملين، لا تذهب من قائمة الأعراض

الجانبية من الجائز إلا تعيinya أي منها.

يجب التوقف عن العلاج ومراجعة الطبيب حالاً

إذا ظهرت واحدة أو أكثر من الأعراض التالية:

• كرت تعاني من سخونة

• ضيق في التنفس وضيق في الصدر

• حمى،

• اشتياق

• مغص،

• حكة أو ح猩 في الجلد

• اعراض جانبية إضافية

• قلة الشهية للطعام

• خارات

• شعور بالانتفاخ في البطن

• جرعات عالية يمكن أن تسبب إصفرار البول

إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما

تعاني من عرض جانبى لم يذكر في هذه النشرة،

فإن الدواء منخصص لكلا الجنسين.

٥ كيفية تخزين الدواء؟

• تجنب التسمم، يجب حفظ هذا الدواء وكل

الأطفال و/أو الرضع وعن مجال زبائنهم، وذلك

لتفادى إصابتهم والتسمم لاستهلاك لا تقتصر

على الأطفال، بل يمكن أن تحدث في المرضى الكبار

أو المرضى المصابين بأمراض معينة.

• لا يجوز إستعمال الدواء بعد اقضائه تاريخ

الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر

العلبة، يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير

من نفس الشهر.

• يجب تخزين درجة حرارة حتى ٢٥ درجة

مئوية.

• لا يجوز رمي أدوية في المجاري أو القمامات.

• إسأل الصيدلي عن كيفية إتلاف أدوية ليست

في الاستعمال، هذه الوسائل تساعده على حماية

البيئة.

٦ معلومات إضافية:

يحتوى الدواء بالإضافة لل المادة الفعالة

أيضاً:

Microcrystalline Cellulose, Sodium

Starch Glycolate, Magnesium

Stearate, Colloidal Silicon Dioxide,

Lactose, Amylum, Talc.

يحتوى كل قرص نحو ٢١٠ مل. لكتوز.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

أقراص مائلة إلى الأصفر صافية ضمن علبة

لوبيه.

تمتوى على الدواء على ٣٠ قرصاً.

المنتج، صاحب الإمتياز وعنوانه:

سام أون، م. ض، شارع هاغافودا، ٢٥،

بات. يام.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي

في وزارة الصحة: ٩٨-٩٢-٢٢١٢

اقررت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة

ومنتداها فحص ورخص في تاريخ:

٢٠١٤ أيار

من أجل سهولة وتهوير القراءة، تم صياغة

هذه النشرة بصيغة المذكرة على الرغم من ذلك،

فإن الدواء منخصص لكلا الجنسين.