

نشرة طبية للمستهلك بموجب انظمة الصيدلة (مستحضرات) ١٩٨٦

هذا الدواء ملزم بوصفة طبيب

اقرأ/ي النشرة بإمعان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء

أقرت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحتواها فحص ورخص

كلوتريزونTM

كريم

التركيب:

Clotrimazole 1.00%
Betamethasone dipropionate 0.05%

المواد غير الفعالة:

White petrolatum, propylene glycol, cetostearyl alcohol, mineral oil, cetareth-30, benzyl alcohol, sodium phosphate monobasic, phosphoric acid, purified water

تأثيرات الدواء الطبية:

كعلاج موضعي للتلوثات الفطرية في الجلد مثل: داء المبيضات، سعفة القدم، سعفة الفخذ، السعفة الجسدية.

متى لا يجوز لك استعمال المستحضر؟

لا يجوز لك استعمال هذا الدواء اذا وجدت لديك حساسية لأحد مركباته أو لكورتيكوستيروئيدات أخرى أو لإيميدازول آخر.
لا يجوز استعمال هذا الدواء لدى أطفال دون ١٧ سنة من العمر.

لا يجوز لك استعمال هذا الدواء قبل مراجعة الطبيب مقدماً:

عندما تكونين في فترة الحمل أو في فترة الرضاعة.

تحذيرات:

لا يجوز لك استعمال هذا الدواء في فترات متقاربة أو لفترة طويلة بدون استشارة الطبيب. يجب ابلاغ الطبيب عن أي حساسية لديك لطعام أو عقاقير قبل استعمالك للدواء.

لا يجوز استعمال هذا الدواء على مساحات واسعة من الجلد أو على جروح مفتوحة. تجنب/ي تماس الدواء بالعينين، وإن حدث ذلك خطأ يجب غسلهما بالماء حالاً. لا يجوز استعمال هذا المستحضر لغرض مخالف لما وصف له.

التفاعلات بين الأدوية:

إذا كنت تتعاطى/ن دواءً إضافياً، بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، أو إذا أنهيت العلاج الآن بدواء آخر، فيجب إعلام الطبيب المعالج، وذلك لتفادي الأخطار أو عدم النجاعة الناتجة عن التفاعلات بين العقاقير.

الأعراض الجانبية:

إضافة إلى التأثيرات الطبية المرغوبة للدواء، فقد تظهر أثناء فترة استعماله بعض الأعراض الجانبية كالأحمرار، جفاف وتقشر الجلد، الشعور بسخونة موضعية ووخزات. تختفي هذه الأعراض عادة خلال فترة قصيرة بعد أن يعتاد الجسم على الدواء، ولكن إذا استمرت هذه الأعراض و/أو إذا كانت مزعجة، يجب مراجعة الطبيب.

الأعراض الجانبية التي تقتضي اهتماماً خاصاً:

طفح أو التهاب موضعي (لم تكن هذه الأعراض قبل الإستعمال)، ظهور حويصلات على الجلد (نادراً): توقف/ي عن العلاج وراجع/ي الطبيب.

أما إذا ظهرت لديك أعراض جانبية لم تذكر في هذه النشرة، أو إذا طرأ أي تغيير على شعورك العام، عليك عندئذ مراجعة الطبيب حالاً.

المقادير الدوائية الاعتيادية في حالة عدم وجود تعليمات أخرى من الطبيب: للكبار - ادهن/ي طبقة رقيقة على منطقة الجلد المصاب وما حولها بلطف وبصورة أساسية مرتين في اليوم - صباحاً ومساءً.
لا تتجاوز/ي المقادير الموصى بها.

إذا لم يطرأ تحسن على حالتك الصحية خلال أسبوع أو إذا تفاقم الوضع، يجب مراجعة الطبيب.

إذا حدث ونسيت استعمال هذا الدواء في الوقت المعين، ادهن/ي حال تذكرك، ولكن إذا اقترب موعد الإستعمال القادم، فعليك تقوية المقدار الذي نسيت، وبالتالي العودة إلى الجدول الزمني الاعتيادي.

انتبه/ي!

هذا الدواء ليس للبلع! هذا الدواء مخصص للإستعمال الخارجي فقط.

يجب الامتناع عن تماس الدواء بالعينين.

يجب عدم تضميد المنطقة المصابة المعالجة بالكريم أو لبس ثياب مسدودة، إلا بموجب تعليمات من الطبيب. (عند الإستعمال في منطقة المغبن [منطقة الحالبين]، يجب لبس الثياب الفضفاضة).

كيف تستطيع/ين أن تساهم/ي في نجاح العلاج؟

يجب أكمال العلاج الموصى به من قبل الطبيب.

لا تتوقف/ي عن استعمال هذا الدواء بدون تعليمات من الطبيب حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.

يجب اتباع العادات الصحية التي ينصحون بها وهي كالتالي:

يجب تجفيف منطقة الجلد المصاب جيداً بعد غسله، الإمتناع عن تعريضه قدر الإمكان للحرارة والرطوبة. يجب الإمتناع من لبس الصوف، الأقمشة الإصطناعية أو المشدودة في منطقة الجلد المصاب (من المستحسن لبس الثياب القطنية، الفضفاضة، المهواة والنظيفة). يجب إستعمال مسحوق التالك أو مسحوق مضاد للفطريات بكثرة على منطقة الجلد المصاب مرة أو مرتين في اليوم بعد دهن هذا الدواء وإمتصاصه إلى داخل الجلد.

تجنب/ي التسمم!

يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي أضرارهم بالتسمم.

إذا أفرطت في إستعمال المقادير الدوائية أو إذا بلغ الطفل/ة خطأ من هذا الدواء، عليك التوجه إلى المستشفى حالاً مصطحباً/ة عبوة الدواء.

لا تسبب/ي التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب!

هذا الدواء وصف لعلاج مرضك، وقد يسبب الضرر لمريض آخر.

لا تعط/ي من الدواء إلى أقاربك، جيرانك أو معارفك.

لا تتناول/ي الدواء في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقادير الدوائية في كل مرة تتناول/ين فيها دواء.

ضع/ي النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

التخزين: دون ٢٥ درجة مئوية.

تبقى الأدوية صالحة لفترات محدودة فقط، حتى ولو ظلت في عبوتها الاصلية وتم حفظها بموجب تعليمات الخزن. الرجاء ملاحظة تاريخ انتهاء صلاحية المستحضر المدونة على العبوة. في حالة الشك! عليك استشارة الصيدلي الذي صرف لك هذا الدواء. لا يجوز تخزين أدوية مختلفة في نفس العبوة.

رقم سجل الدواء: ٣٠٤٧٠ - ١٢٦١١

المنتج:

تارو للصناعة الدوائية م.ض.، ص.ب. / ١٠٣٤٧ خليج حيفا ٢٦١١٠