

תופעות לוואי המחייבות התיעחסות מיוחדת:
פריחה או דלקת מקומית (שלא היו קיימים לפני השימוש), הופעת
שלפוחיות על העור (נדיר): הפסיק/ את הטיפול ונסה/ לרופא.
בכל מקרה שבו הינך מרגיש/ה תופעות לוואי שלא צוין בעולן זה,
או אם חל שינוי בהרגשות הכלליות עלייך להתייעץ עם הרופא מיד.

מינון מוגבר בעדרו הוראה אחרת מרופא:
מוגרים – מרחבי/ שכבה דקה על איזור העור הנגע וסיבתו
הקרובה בעדינות וביסודות פעמיים ביום - בוקר וערב.
אין לעבור על המנה המומלצת.
אם לא חל שיפור במצבך תוך שבועיים או אם חלה החמרה יש
לפנות לרופא.
אם שחתה להשתמש בתרופה זו בזמן המicode, מרחבי/ מיד כשמכורת,
אך אם קרוב הזמן לשימוש הבא, דרגי/ על המנה ששכחת וחזר/
ללא זמני המין הרגיל.

שים לב:

לא לבלועו תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.
יש להימנע מגע עם העיניים.
אין לחbus את האיזור הנגע טיפול בקрем או ללבוש בגדי אוטם,
אלא בהתאם להוראות הרופא. (בשימוש באיזור המפשעה, יש ללבוש
בגד רפואי).

איך תחול/י לשיע להצלחת הטיפול?

עליך להשלים את הטיפול שהומלץ על-ידי הרופא.
גם אם חל שיפור במצב בריאותך אין להפסיק את הטיפול בתרופה
לא התיעיצות עם רפואי.
יש למלא אחר הרגיל הבריאות המומלצים שלhalten: יש ללבש היבט
את איזור העור הנגע לאחר רחצה, להימנע מחשיפתו, במידת
האפשר, לחום ולחות. יש להימנע מלבוש צמר, סינטטי או הדוק
באיזור העור הנגע (מולמלן ללבוש בגדי כותנה, רפואי, מאורר ונקי).
וש להשתמש באקטת טלק או באבקה אנטיפטריתית בנדיבות על
איזור העור הנגע פעמיים ביום לאחר מריחת תרופה זו
וספיקתה לthur העור.

מניע הרעלת!

תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקומם סגור מחוץ להישג
ידם של ילדים / או תינוקות ועל-ידיך תמנע הרעלת.
אם נטلت מנת יתר או אם בטעות בעלך מן התרופה, פנה/ מיד
לחדר מיען של בית-חולמים, והבא/י אריזת התרופה אותה.
אין לגרום להתקאה ללא הוראה מפורשת רפואי.
תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתן, בחולה אחר/ת היא עלולה
להזיק, אל תנתן/ תרופה זו לקרובין, שכנים או מכירך.
אין ליטול תרופות בחושך/ יש לבדוק את התווית והמנה בכל פעם
שהניך נתן/ת תרופה. יש להרכיב משקפיים אם הינך ذוקק/ה להם.

אחסנה: מתחת -25°C .

גם לפאי תנאי הארזה/אחסנה המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה
מוגבלת בלבד. נא לשים לב לתאריך התגובה של התכשירו בכל
מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה.
אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

מס' רישום התרופה: 12611.30470

יצרן: תרו ותעשייה רוקחית בע"מ, תד. 10347 מפרץ חיפה 26110

70078.0812

**עלון לצריך לפי תקנות הרוקחים
(תקירים) התשמ"ג – 1986**

תרופה זו חיבת במרשם רפואי

קראי/ בעין את העולן עד סופו בטרם תשמש/ בתרופה

פורמט עלון זה נקבע ע"י

משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר

קלוטריזו™

קרם

הרכב:

Clotrimazole 1.00%
Betamethasone dipropionate 0.05%

חוורם בלחי פעילים:
White petrolatum, propylene glycol, cetostearyl alcohol, mineral oil, ceteareth-30, benzyl alcohol, sodium phosphate monobasic, phosphoric acid, purified water

פעילות ופואית:

טיפול מקומי בזיהומים פטריטיים של העור כגון: קרדיידים,
tinea corporis, tinea cruris, tinea pedis

מתי אין להשתמש בתכשיר?

אין להשתמש אם ידועה לך רגישות לאחד ממרכיבי התרופה או
לקורטיקוסטרואידים או אימידוזולים אחרים.
אין להשתמש בתרופה בילדים מתחת לגיל 17.

**אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת
 הטיפול:**

אם הינך בהריון או מניקה.

اذירות:

אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או תקופה ממושכת בעלי
להיוועץ ברופא.

אם הינך גוש/ה לזמן כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע
על-כך לרופא לפני נטילת התרופה.

אין להשתמש בתרופה זו על שטחי עור נרחבים או על פצעים
פתוחים.

אין לחתול לתכשיר לבוא מגע עם העיניים. במקרה של מגע יש
לשטוף מיד עם מים.

אין להשתמש בתכשיר למטרה שונה מזו שלשמה רשם.

תגובה בין-תרופתיות:

אם הינך נתול/ת תרופה נוספת, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי
תזונה, או אם גמרת זה עתה טיפול בתרופה אחרת, עליך לדוח
לרופא המתפל כדי למנוע סיכונים או אי-יעילות הנובעים מתגובה
בין-תרופתיות.

תופעות לוואי:

בנוסף לפעולות הרצויה של התרופה, בזמן השימוש בה עלולות
להופיע תופעות לוואי, כגון: אדמומיות, יובש וקלוף בעור, הרגשת
חום מקומי ועייצוץ. תופעות אלו חולפות בדרך כלל תוך זמן קצר
לאחר תקופת ההסתגלות לתכשיר, אולם אם התופעות הנ"ל
משיכלות ו/או מטרידות יש לפנות לרופא.