

أوكساكاتين شراب

التركيب: كل ٥ ملل تحتوي:

Oxomemazine	1.65 mg
Potassium guaiacolsulphonate	33.30 mg
Sodium benzoate	33.30 mg

كما تحتوي كل ٥ ملل نحو ٣ غرام من السكر.

المواد غير الفعالة:

Sugar, sorbitol, propylene glycol, sodium citrate, caramel flavour, citric acid, caramel color liquid, purified water.

الفصيلة العلاجية:

Oxomemazine - مثبط للسعال من فصيلة الفينوتيازين.

Potassium guaiacolsulphonate - مقشع.

تأثيرات الدواء الطبية:

شراب مضاد للسعال، مقشع (لإخراج البلغم).

متى لا يجوز لك إستعمال المستحضر؟

لا تستعملي الدواء عندما تكونين في فترة الحمل أسبوعين قبل موعد الولادة و/أو في فترة الرضاعة. لا تستعمل/ي الدواء إذا كنت تتناول/ين جرعة عالية من مثبطات الجهاز العصبي المركزي. لا يجوز الإستعمال إذا وجدت لديك حساسية لأحد مركبات الدواء.

لا يجوز لك إستعمال هذا الدواء قبل مراجعة الطبيب مقدماً:

عندما تكونين في فترة الحمل. إذا كنت تعاني/ن أو إذا عانيت في الماضي من ظاهرة ربي، باركينسون، تشبب نخاع العظام، خلل في وظيفة: الجهاز التنفسي، العينين (كالجلوكوما)، القلب و/أو الأوعية الدموية، الكبد، الكلى/المسالك البولية، الجهاز الهضمي (كالقرحة)، جهاز الدم، غدة البروستات.

كيف سيؤثر هذا الدواء على سير أمورك اليومية؟

إن إستعمال هذا الدواء قد يضعف من يقظتك، لذا يجب إتخاذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات، تشغيل ماكينات خطيرة وممارسة أي نشاطات أخرى تتطلب اليقظة. يجب تحذير الطفل/ة من ركوب الدراجات، اللعب بمقربة من حركة المرور وما شابه.

لا يجوز شرب النبيذ أو المشروبات الروحية الأخرى أثناء فترة تناول هذا الدواء. قد يسبب هذا الدواء حساسية خاصة عند تعرضك للشمس، لذا تجنب/ي التعرض لها واحترس/ي منها وذلك بإتخاذ وسائل الحماية الكافية (كاللبسة الطويلة، قبعة، مراهم واقية، إلخ).

تحذيرات: قد يسبب هذا الدواء تشوشاً في الرؤية.

إن الإستعمال المتواصل لهذا الدواء قد يضر بصحة الأسنان نتيجة جفاف الفم.

قد يسبب الدواء لدى المرضى المسنين الإرتباك، الدوار والغثاس.

يجب إبلاغ الطبيب عن أي حساسية لديك لطعام أو عقاقير قبل إستعمالك للدواء.

التفاعلات بين الأدوية: إذا كنت تتعاطى/ن دواءً إضافياً أو إذا أنهيت العلاج الآن بدواء آخر، فيجب إعلام الطبيب المعالج، وذلك لتفادي الأخطار أو عدم النجاعة الناتجة عن التفاعلات بين العقاقير، خاصةً الأدوية التي تنتمي إلى المجموعات التالية: الأدوية التي تؤثر على الجهاز العصبي المركزي (كالأدوية المهدئة، المنومة، أدوية باركينسون، أدوية الصرع، العقاقير المخدرة المستعملة في العمليات

الجراحية ومسكنات الألم من فصيلة المخدرات). أدوية مضادة لإفراز الكولين أو ذات التأثير المضاد لإفراز الكولين (كمضادات الإكتئاب النفسي من فصيلة ثلاثية الدورة أو معيقات مونوأمين أوكسيداز)، مخفضات ضغط الدم وأدوية القلب، أدوية للغدة الدرقية، إيبينفرين، عقاقير تحتوي الكحول، مثبطات الشهية للطعام، أدوية قد تصيب وظائف الكبد (خاصةً لدى أشخاص ذوي سابقة لمرض في الكبد أو نتيجة إستعمال الدواء لفترة طويلة)، مضادات الحموضة الزائدة أو مضادات الإسهال المتمتصة.

الأعراض الجانبية:

إضافة إلى التأثيرات الطبية المرغوبة للدواء، فقد تظهر أثناء فترة إستعماله بعض الأعراض الجانبية كجفاف الفم، الأنف أو الحنجرة، إمساك، صداع، غثيان وفقدان الشهية للطعام، غثاس، الإحساس بالسخونة، إحتقان الأنف.

الأعراض الجانبية التي تقتضي إهتماماً خاصاً: تهيج في الجلد، دوخة، فقدان التوازن، صعوبة أو ألم أثناء التبول، ضعف غير إعتيادي، فرط التعرق، إرتباك، حساسية الجلد للشمس (انظر/ي أعلاه)، إضطرابات في الرؤية، عدم الإرتياح، حركات لا إرادية (نادراً): توقف/ي عن العلاج وراجع/ي الطبيب.

أما إذا ظهرت لديك أعراض جانبية لم تذكر في هذه النشرة، أو إذا طرأ أي تغيير على شعورك العام، عليك عندئذ مراجعة الطبيب حالاً.

الأعراض الجانبية والتفاعلات بين الأدوية عند الأطفال والرضع:

على الوالدين إبلاغ الطبيب المعالج عن كل تأثير جانبي يبدو لدى الطفل/ة وعن أي دواء آخر يتم تناوله. راجع/ي الفقرات المتعلقة بالأعراض الجانبية والتفاعلات الخاصة بين الأدوية المذكورة أعلاه.

الجرعة الدوائية:

يستعمل الدواء حسب تعليمات الطبيب فقط. لا تتجاوز/ي الجرعة الموصى بها.

لا يجوز إستعمال الدواء دون عمر سنة.

لا يوصى بإستعمال هذا الدواء عادة للأطفال دون سنتين من العمر، للأطفال المرضى بصورة حادة (كجدرى الماء، الحصبة، ثلوثات الجهاز العصبي المركزي، التهاب المعدة والأمعاء) أو لأطفال في حالة جفاف.

يجب إستعمال هذا الدواء في أوقات محددة حسب تعليمات الطبيب المعالج.

إذا حدث ونسيت تناول الجرعة في الوقت المعين ثم تذكرت بذلك، فيجب تناولها حالاً ولكن لا يجوز تناول جرعتين معاً في أي حال من الأحوال.

إرشادات الإستعمال: يبلغ الدواء مع القليل من الماء. يجب تناول هذا الدواء مع الطعام أو مع الحليب. لا يجوز ترك الدواء في الفم زمناً أكثر مما يلزم لإبتلاعه.

أ كيف تستطيع/ين أن تساهم/ي في نجاح العلاج ؟

يجب إكمال العلاج الموصى به من قبل الطبيب. لا تتوقف/ي عن إستعمال هذا الدواء بدون تعليمات من الطبيب حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.

تجنب/ي التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم.

إذا أقرطت في تناول الجرعة الدوائية أو إذا بلغ الطفل/ة خطأ من هذا الدواء، عليك التوجه إلى المستشفى حالاً مصطحباً/ة عبوة الدواء.

لا تسبب/ي التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

هذا الدواء وصف لعلاج مرضك، وقد يسبب الضرر لمرضى آخر.

لا تعط/ي من الدواء إلى أقاربك، جيرانك أو معارفك.

لا تتناول/ي الدواء في العتمة: يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول/ين فيها دواء. ضع/ي النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

التخزين: في درجة حرارة تقل عن ٢٥ درجة مئوية.

تبقى الأدوية صالحة لفترات محدودة فقط، حتى ولو ظلت في عبوتها الأصلية وتم حفظها بموجب تعليمات التخزين. الرجاء ملاحظة تاريخ إنتهاء صلاحية المستحضر المدونة على العبوة. في حالة الشك! عليك إستشارة الصيدلي الذي صرف لك هذا الدواء. لا يجوز تخزين أدوية مختلفة في نفس العبوة.

رقم سجل الدواء: ٢١٩٥٩ - ٣٠٥٤

المنتج: تارو للصناعة الدوائية م.ض.ب. / ص.ب. / ١٠٣٤٧ خليج حيفا ٢٦١١٠