

نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة

(مستحضرات) ١٩٨٦

هذا الدواء ملزم بوصفة طبيب

اقرأ/ي النشرة بامعان حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء

أقرت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحتواها

فُحص ورُخص من قبلها

## ميركاپتيزول

### أقراص

التركيب: كل قرص يحتوي على: Methimazole 20 mg

المواد غير الفعالة:

Lactose monohydrate, calcium phosphate dibasic anhydrous, corn starch, sugar, talc, FD&C yellow #6 lake

كما يحتوي كل قرص على:

لكتوز مونوهيدرات ٤٥ ملغ، سكر ١٨ ملغ.

الفصيلة العلاجية: دواء من مشتقات الإيميدازول الذي يحتوي على السولفور.

تأثيرات الدواء الطبية:

هذا الدواء مخصص لمعالجة فرط نشاط الغدة الدرقية.

متى لا يجوز لك إستعمال المستحضر؟

لا تستعملي هذا الدواء عندما تكونين في فترة الرضاعة.  
لا يجوز الإستعمال إذا وجدت لديك حساسية لأحد مركبات الدواء.

لا يجوز لك إستعمال هذا الدواء قبل مراجعة الطبيب مقدماً:

عندما تكونين في فترة الحمل.

إذا كنت تعاني/ن أو إذا عانيت في الماضي من خلل في وظيفة الكبد.

تحذيرات:

يجب إجراء الفحوص الطبية أثناء فترة تناول هذا الدواء للدم، لمعرفة زمن التخثر وإجراء الفحوص الوظيفية للغدة الدرقية.

يجب إبلاغ الطبيب عن أي حساسية لديك لطعام أو عقاقير قبل إستعمالك للدواء.

انتبه/ي: تبدأ فعالية هذا الدواء بعد مرور عدة أيام/أسابيع فقط.

يجب إبلاغ الطبيب عن تناولك لهذا الدواء إذا كنت مقدماتاً على إجراء أي عملية جراحية (بما في ذلك جراحة الأسنان) أو معالجة مستعجلة. أثناء فترة العلاج بهذا الدواء وبعد التوقف عنه، لا تتناول/ي أي مستحضر للتطعيم بدون إذن من الطبيب.

التفاعلات بين الأدوية:

إذا كنت تتعاطى/ن دواءً إضافياً أو إذا أنهيت العلاج الآن بدواء آخر، فيجب إعلام الطبيب المعالج، وذلك لتفادي الأخطار أو عدم النجاعة الناتجة عن التفاعلات بين العقاقير، خاصةً الأدوية التي تنتمي إلى المجموعات التالية: مضادات تخثر الدم، أو كستريفيولين، أمينوفيلين، أميودارون، تيوثيفيلين وأدوية أخرى تحتوي اليود، چليكوزيدات الديدجيتال.

الأعراض الجانبية:

إضافة إلى التأثيرات الطبية المرغوبة للدواء، فقد تظهر أثناء فترة إستعماله بعض الأعراض الجانبية، مثل: آلام بطن، غثيان أو تقيؤ، دوار، فقدان المذاق. في الحالات التي تستمر فيها هذه الأعراض فترة طويلة أو إذا كانت مزعجة جداً، يجب مراجعة الطبيب.

الأعراض الجانبية التي تقتضي إهتماماً خاصاً:

قلة الكريات البيض - ويتجلى ذلك بالتهاب الحنجرة، سخونة عالية، سعال، آلام في الفم (نادراً): توقف/ي عن العلاج وراجع/ي الطبيب.

طفح أو تهيج جلدي: راجع/ي الطبيب حالاً!

إصفرار الجلد أو العينين (نادراً): راجع/ي الطبيب حالاً!

أما إذا ظهرت لديك أعراض جانبية لم تذكر في هذه النشرة، أو إذا طرأ أي تغيير على شعورك العام، عليك عندئذ مراجعة الطبيب حالاً.

الأعراض الجانبية والتفاعلات بين الأدوية عند الأطفال:

على الوالدين إبلاغ الطبيب المعالج عن كل تأثير جانبي يبدو لدى الطفل/ة وعن أي دواء آخر يتم تناوله. راجع/ي الفقرات المتعلقة بالأعراض الجانبية والتفاعلات الخاصة بين الأدوية المذكورة أعلاه.

الجرعة الدوائية:

يستعمل الدواء حسب تعليمات الطبيب فقط. لا تتجاوز/ي الجرعة الموصى بها.

يجب إستعمال هذا الدواء في أوقات محددة حسب تعليمات الطبيب المعالج.

إذا نسيت تناول الجرعة في الوقت المعين، فيجب تناولها حال تذكرك! أما إذا كان موعد تناول الدواء قريباً من موعد الجرعة القادمة عليك تناول الجرعتين معاً ومن ثم العودة إلى الجدول الزمني الإعتيادي. إذا نسيت تناول جرعتين أو أكثر من الدواء، عليك إستشارة الطبيب.

إرشادات الإستعمال:

بالإمكان شطر القرص إلى نصفين أو سحقه.

لا يجوز المضغ! يجب بلع الدواء مع القليل من الماء.

لا يجوز ترك الدواء في الفم زمناً أكثر مما يلزم لإبتلاعه.

كيف تستطيع/ين أن تساهم/ي في نجاح العلاج؟

يجب إكمال العلاج الموصى به من قبل الطبيب.

لا تتوقف/ي عن إستعمال هذا الدواء بدون تعليمات من الطبيب حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.

تجنب/ي التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم.

إذا أفرطت في تناول الجرعة الدوائية أو إذا بلع الطفل/ة خطأً من هذا الدواء، عليك التوجه إلى المستشفى حالاً مصطحباً/ة عبوة الدواء.

لا تسبب/ي التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب!

هذا الدواء وصف لعلاج مرضك، وقد يسبب الضرر لمريض آخر.

لا تعط/ي من الدواء إلى أقاربك، جيرائك أو معارفك.

لا تتناول/ي الدواء في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول/ين فيها دواء.

ضع/ي النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

التخزين: في مكان بارد ومظلم، دون ٢٥ درجة مئوية.

لا يجوز التخزين في الحمام، في المطبخ أو في مناطق أخرى ذات درجة عالية من الرطوبة. تبقى الأدوية صالحة لفترات محدودة فقط، حتى ولو ظلت في عبوتها الأصلية وتم حفظها بموجب تعليمات الخزن. الرجاء ملاحظة تاريخ إنتهاء صلاحية المستحضر المدونة على العبوة. في حالة الشك! عليك إستشارة الصيدلي الذي صرف لك هذا الدواء. لا يجوز تخزين أدوية مختلفة في نفس العبوة.

رقم سجل الدواء: ٢٤٤٥٣-١٤٨٩

المنتج: تارو للصناعة الدوائية م.ض.

/ص.ب./ ١٠٣٤٧ خليج حيفا ٢٦١١٠