

יש לפנות לרופא במקרים שבהם תופעות אלו נמשכות זמן רב או מאוד מטרידות.

**תופעות לוואי המחייבות התייחסות מיוחדת:**  
לאוקספניה - מתבטאת בדלקות גרון, חום גבוה, שיעול, כאבים בפה (נדיר): הפסיק את הטיפול ופנה לרופא.

פריחה או גירוי בעור: פנה לרופא מיד!  
עור או עניינים צחובות (נדיר): כל מקרה שבו הניך מרגיש/ה תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה, או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית עליך להתייעץ עם הרופא מיד.

**תופעות לוואי ותגובה בין-תרופיות ילדים:**  
על ההורים לדוחו לרופא המתפל על כל תופעת לוואי וכן על כל תרופה נוספת הניתנת הילד/ה!  
ראה/י לעיל תופעות לוואי ותגובה בין-תרופיות מיוחדות שיפורטו.

**מינון:**  
מינון לפי הוראות הרופא בלבד. אין לעבור על המנה המומלצת.  
יש לשמש בתרופה זו בזמןים קצובים כפי שנקבע על-ידי הרופא המתפל.  
אם שכחתי ליטול תרופה זו בזמן קצוב, יש ליטול מנה מיד כשנזכרת; אם הזמן הקרוב למועד נטילת המנה הבאה קח/י את שתי המנות יחד וחזרי ללווח הזמןים הרגילים. אם שכחתי ליטול שתי מנות או יותר, עליך להתייעץ עם הרופא.

#### אוף השימוש:

ניתן לחצוץ או לכתוש את הטבילה.  
אין לעזובו! שבלוע את התרופה עם מעט מים.  
אין להחזיק את התרופה בפה מעבר לזמן הדורש לבלייתה.

**כיצד תוכל/י לסייע להצלחת הטיפול?**  
עליך להשלים את הטיפול שהומלץ על-ידי הרופא.  
גם אם חל שיפור במצב בריאותך אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התיעיצות עם רופא.

**מנע/י הרעללה!** תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקום סגור מחוץ להישג ידים של ילדים/או תינוקות ועל-ידי קר תמנע/ הרעללה.  
אם נטלה מנת יתר או אם בטעות בעליל מין תרופה, פנה/י מיד לחדר מיוון של בית-חוילים, והבא/י אריזת התרופה אותה.

אין לגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא!  
תרופה זו ונرشמה לטיפול במחלות, בחולה אחר/ת היא עלולה להזיק. אל תתני/י תרופה זו לקרוביך, שכןך או מכירך.  
אין ליטול תרופות בחושך! יש לבדוק את התווית והמנה בכל פעם שהין נוטל/ת תרופה. יש להרכיב משקפיים אם הין זקוק/ה להם.

**אחסנה:** במקום קרייר וחשוך, מתחת ל- 25°.

אין לאחסן באместיה, במטבח או באזוריים אחרים בעלי לחות גבוהה. גם לפי תנאי הארייה/האחסנה המומלצות, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. נא לשים לב לתאריך התפוגה של ה\_ticksiori בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברופך שיספיק לך את התרופה.  
אין לאחסן תרופות שונות באותה ארייה.

**מס' רישום התרופה:** 01489.24453

**ץ'ן:** תרו תעשייה רוקחית בע"מ, ת.ד. 10347 מרכז חיפה 26110.  
74217-0911

**עלון לצריכה לפי תקנות הרוקחים  
(תק Shirim) התשמ"ו – 1986**

תרופה זו חיבת מרשם רפואי

קראי/י ביעו את העalon עד סוףו בטרם תשמש/י בתרופה

פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות  
ותוכנו נבדק ואושר על ידי

## מרכז רפואי

טלפון:

כל טבילה מכילה: Methimazole 20 mg

חומרים בLATI פעילים:

Lactose monohydrate, calcium phosphate dibasic anhydrous, corn starch,  
sugar, talc, FD&C yellow #6 lake

כמו כן כל טבילה מכילה:

לקטוז מונוהידרט 45.00 מ"ג, סוכר 18.00 מ"ג.

**קובוצה תרופית:** נגזרת אימידול המכיל סולפורה.

**פניות רפואי:** התרופה מיועדת לטיפול בהיפרтиירואידיוז (פניות מוגברת של בלוטת התיריס).

#### מתי אין לשמש בתכשיר?

אל תשמש בתרופה כאשר הין מינקה.

אין לשמש אם יודהה לך רגשות לאחד ממרכיבי התרופה.

#### אין לשמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני הначלה הטיפול:

אם הין בהריון.

אם הין סובל/ת או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד הכלבי.

**ażhorot:**

בתักษת הטיפול בתרופה זו יש לעורק בדיקות דם לבדיקת זמן פרוטרומבי ותפקוד בלוטת התיריס.

אם הין רגש/ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהו, עליך להודיע על-כך לרופא לפני נטילת התרופה.

שים/י לב תרופה זו מתחילה לפעול רק לאחר מספר ימים/שבועות. אם עלייך לעבור ניתוח מכל סוג שהוא (כולל ניתוח שניים) או טיפול דוחה, עליך להודיע לרופא שהין נוטל/ת תרופה זו.

בזמן הטיפול בתרופה זו ולאחר הפסקת הטיפול אל תקח/י כל תכשיר חיסוני ללא אישור הרופא.

#### תגובה בין-תרופיות:

אם הין נוטל/ת תרופה נוספת, או אם גמרת זה עתה טיפול בתרופה אחרת, עליך להזוז לרופא המתפל כדי למנוע סיכונים או אי-יעילות הנובעים מתגובה בין-תרופיות, במיוחד לגבי תרופות מהקבוצות הבאות: תרופות נגד קריישת דם, אוקסיטריפילן, אמינופילין, אמידורון, תיאופילין ותרופות אחרות המכילות יוד, גליקוזידים של דיגיטאליס.

#### תופעות לוואי:

בנוסף לפעולות הרציה של התרופה, בזמן השימוש בה עלולות להופיע תופעות לוואי, כגון: כאבי בטן, בחילה או הקאה, סחרורת, איבוד השעם.