

چليکورزيدات الديجيتال)، أدوية تحتوي على كالسيوم، مغنيزيوم أو مقادير عالية من فيتامين D أو A، تتراسيكلينات، إيتيدرونات، سللوز صوديوم فوسفات، فينيبيتوئين وكيتوكونازول (دواء مضاد للفطريات).

#### الأعراض الجانبية:

إضافة إلى التأثيرات الطبية المرغوبة للدواء، فقد تظهر أثناء فترة إستعماله بعض الأعراض الجانبية، مثل: شعور بطعم الجير في الفم.

#### الأعراض الجانبية التي تقضي اهتماماً خاصاً:

إمساك، جفاف الفم، عطش، قلة الشهية للطعام، صعوبة في التبول، صداع، غثيان أو تقيؤات، تغيرات في الحالة النفسية، عصبية وضعف عام، ألم في العضلات، تنفس بطيء، وطعم غير مستحب (نادرًا): توقف /ي عن العلاج وراجعاً /ي الطبيب. أما إذا ظهرت لديك أعراض جانبية لم تذكر في هذه النشرة، أو إذا طرأ أي تغيير على شعورك العام، عليك عندئذ مراجعة الطبيب حالاً.

الأعراض الجانبية والتفاعلات بين الأدوية عند الأطفال: على الوالدين إبلاغ الطبيب المعالج عن كل تأثير جانبي يبدو لدى الطفل /ة وعن أي دواء آخر يتم تناوله! راجعاً /ي القرارات المتعلقة بالأعراض الجانبية والتفاعلات الخاصة بين الأدوية المذكورة أعلاه.

#### الجرعة الدوائية الإعتيادية في حالة عدم وجود تعليمات أخرى من الطبيب:

مضاد للحموضة في المعدة: ١ - ٢ أقراص حسب اللزوم.

إضافة للكالسيوم: قرصان، ١ - ٣ مرات في اليوم ساعة - ساعة ونصف بعدوجبة الطعام.

لا تتجاوز /ي الجرعة الموصى بها.

هذا الدواء غير موصى به عادة لدى الأطفال دون عمر ٦ سنين إلا بتعليمات من الطبيب.

المعالجة الحموضة الزائدة، إذا لم يطرأ تحسن على حالتك خلال ١٤ يوماً يجب مراجعة الطبيب.

إذا حدث ونسخت تناول الجرعة في الوقت المعين، فيجب تناولها حال تذكرك؛ ولكن لا يجوز تناول جرعتين معاً في أي حال من الأحوال!

#### إنقيه /ي:

يجب الانتظار ساعة أو ساعتين على الأقل بين تناول الطعام الذي يحتوي على الألياف مثل: نخالة، خبز كامل وبعض من أنواع الحبوب و/أو تناول أدوية أخرى متناولة عن طريق الفم وبين تناول هذا الدواء.

#### إرشادات الإستعمال:

امضغ /ي الدواء جيداً قبل إبتلاعه وشرب /ي كأساً مليئاً بالماء.

#### تجنب /ي التسمم!

يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتقاضي إصابتهم بالتسوس.

إذا أفرطت في تناول الجرعة الدوائية أو إذا بلع الطفل /ة خطأ من هذا الدواء، عليك التوجه إلى المستشفى حالاً مصطحبها /ة عبوة الدواء.

لا تسبب /ي التقى بدون تعليمات صريحة من الطبيب!

لا تتناول /ي الدواء في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول /ين فيها دواء.

ضع /ي التذكرة الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

التخزين: دون ٢٥ درجة مئوية.

تبقي الأدوية صالحة لفترات محددة فقط، حتى ولو ظلت في علبتها الأصلية وتم حفظها بموجب تعليمات الخزن. الرجاء ملاحظة تاريخ إنتهاء صلاحية المستحضر المدونة على العبوة. في حالة الشك! عليك إستشارة الصيدلي الذي صرف لك هذا الدواء. لا يجوز تخزين أدوية مختلفة في نفس العبوة.

رقم سجل الدواء: ٢٤٧٣١ - ١٥٩٥ .

المنتاج: تارو للصناعة الدوائية م.ض.، /ص.ب. /١٠٣٤٧ - خليج حيفا ٢٦١١٠

نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) ١٩٨٦

إنرا /ي النشرة بإمعان حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء

اقررت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحتها فحص ورخص من قبلها

## السيمور®

### أقراص

التركيب:

كل قرص يحتوي على:

كماتحتوي على:

Calcium Carbonate 600 mg

Mannitol, Sucrose, Pregelatinized Starch, Talc, Magnesium Stearate, Spearmint Flavour, Peppermint Flavour, Sodium Saccharin.

ملاحظة:

كل قرص يحتوي ٩٨ ملغ سكر.

كل قرص يحتوي على ٠٢٧ ملغ صوديوم.

كل قرص يعدل ١١ ملي مكافئ من الحمض.

تأثيرات الدواء الطبية:

يستعمل الدواء كمضاد للحموضة في حالات الحموضة الزائدة في المعدة والحرقان، كما يستعمل كإضافة ل المادة الكالسيوم في حالات نقص الكالسيوم أو كإضافة غذائية.

متى لا يجوز لك إستعمال المستحضر؟

لا تستعمل هذا الدواء إذا كنت تعاني /ن من زيادة الكالسيوم أو من اللحمانية "Sarcoidosis" /و/أو إذا وجدت حساسية لأحد مركبات الدواء.

لا يجوز لك إستعمال هذا الدواء قبل مراجعة الطبيب مقدماً:

عندما تكونين في فترة الحمل أو في فترة الرضاعة.

إذا كنت تعاني /ن أو إذا عانيت في الماضي من: قلة نشاط الغدة نظيرة الدرقية، الجفاف أو نقص في توازن الشوارد الكهربائية في الدم، إمساك أو بواسير، خلل في وظيفة الكبد (مثل: تشحيم الكبد)، الكلى /المسالك البولية، الجهاز الهضمي (مثل: إنسداد الأمعاء).

كيف سيؤثر هذا الدواء على سير أمورك اليومية؟

لا يجوز شرب أو أكل كميات كبيرة من الحليب أو منتجاته أثناء فترة العلاج بهذا الدواء. إمتنع /ي عن الإفراط في إستعمال التبن، المشروبات الكحولية أو المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

تحذيرات:

لا يجوز لك إستعمال هذا الدواء في فترات متقاربة أو لفترة تزيد عن أسبوعين بدون استشارة الطبيب. يجب إجراء الفحوص الطبية أثناء فترة تناول هذا الدواء لتركيز الكالسيوم في الدم وذلك إذا إستمر العلاج لفترة طويلة.

يجب إبلاغ الطبيب عن أي حساسية لديك لطعام أو عقاقير خاصة دواء يحتوي على الكالسيوم قبل إستعمالك للدواء. لا يجوز تناول هذا المستحضر في حالات وجود علامات لإلتهاب الزائدة الدودية (مثل: آلام البطن، غثيان وقيءات).

لا يجوز تناول هذا الدواء في الصباح قبل إجراء فحص لإفراز حموضة المعدة.

التفاعلات بين الأدوية:

إذا كنت تتعاطى /ن دواء إضافياً، بما في ذلك أدوية تصرف بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، أو إذا أنهيت العلاج الآن بدواء آخر، فيجب إعلام الطبيب المعالج، وذلك لتقاضي الآثار أو عدم النجاعة الناتجة عن التفاعلات بين العقاقير، خاصة الأدوية التي تتمنى إلى المجموعات التالية: مستحضرات تحتوي على الحديد، أدوية لأمراض القلب (مثل: الأدوية المدرة للبول من فصيلة تيازيدات أو