



## אוריזון וטרינרי - טיפות אוזניים

### Aurizon veterinary - Ear drops

טיפות אוזניים בתרחיף שומני.

לשימוש וטרינרי בלבד!

ר חייב מרשם רופא  
مترجم بوصفة طبيب  
S-0  
P PRESCRIPTION ONLY MEDICINE

הרכב: 1 מ"ל אוריזון מכיל:  
מרכיבים פעילים:

Marbofloxacin 3mg, Clotrimazole 10mg, Dexamethasone 0.9mg

מרכיבים לא פעילים:

Propyl gallate 1mg, Sorbitan oleate 20mg, Silica, colloidal hydrophobic 40mg, Triglycerides, medium chain

קבוצה תרפויטית:

Mabrofloxacina - אנטיביוטיקה ממשפחת הפלואורוקווינולונים

Clotrimazole - אנטי-פטריתי

Dexamethazone - גלוקוקורטיקואידים

פעילות רפואית: בכלבים

Otitis externa - דלקת אוזניים חיצונית, ממקור חיידקי או פטרייתי - לחיידקים

הרגישים ל- Marbofloxacin ופטריית Malassezia Pachydermatis

הרגישים ל- Clotrimazole. יש להשתמש בתכשיר בהסתמך על מבחני רגישות.

התוויות נבד:

- אין להשתמש בכלבים הסובלים מנקב של עור התוף.
- אין להשתמש בכלבים בעלי רגישות ידועה לאחד המרכיבים.
- אין להשתמש בכלבות בהריון או מניקות.


### הכנת אוריזון לשימוש




2 הפרד את הצינורית הנמישה מהמכסה שלה



1 הסר את המכסה מהמיכל



4 המכסה מגן על התכשיר מאוויר לאחר השימוש



3 דחף והכר את הצינורית על גבי המיכל

### הוראות שימוש באוריזון



8 לאחר הלחיצה אוריזון ישתחרר לתוך תעלת האוזן החיצונית

5 נער היטב את הבקבוק לפני מתן התרופה



6 הרם את האוזן ומקם את הצינורית

7 לחץ בעדינות על המיכל



9 עסה בעדינות את בסיס האוזן אחרי מתן אוריזון כדי לכזר באופן שווה את הטיפות

במספר כלבים יש להשתמש בטפסת שונה לכל כלב.

מנת יתר:

שינויים במאפיינים ביוכימיים והמטולוגיים (כמו עליה ב- Lymphopenia, Neutrophilia, eosinopenia, Aminotransferase, Alkaline Phosphatase) יופיעו במתן כמות גדולה פי שלוש מהכמות המומלצת לטיפול. שינויים אלו אינם מסוכנים ויחלמו עם הפסקת הטיפול.

אחסון:

יש לשמור מתחת ל- 25 מעלות צלזיוס. אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה והבקבוק ומתייחס ליום האחרון של אותו חודש או לאחר 8 שבועות ממועד הפתיחה ראשונה, המוקדם מבניהם.

לאחר הפתיחה ניתן להשתמש במשך 8 שבועות.

היצרן:

Vetoquinol, France

בגל הרישום:

אלנור לינכיץ בעימ ת.ד. 2920, אבן יהודה 40500.

מספר הרישום:

082 47 92301

### תופעות לוואי:

תופעות המקושרות לתרופות קורטיקוסטרואידיות עלולות להופיע (שינויים במאפיינים ביוכימיים והמטולוגיים כגון עליה ב- Alkaline Phosphatase ו- Neutrophilia, Aminotransferase, eosinopenia עלולה להופיע באופן מוגבל). שימוש ארוך ואינטנסיבי בקורטיקוסטרואידים מקומיים ידוע כזרז לתופעות שונות כגון דיכוי פעולת בלוטת האדרנל, לדלול שכבת האפידרמיס בעור והאטה בריפוי פצעים. במקרים נדירים, השימוש בתכשיר זה עלול להיות קשור לחירשות, בייחוד בכלבים זקנים, ולרוב באופן חולף.

### אזהרות בשימוש:

שימוש נרחב בסוג אנטיביוטיקה מסוים בלבד עלול לגרום להופעת עמידות בקרב קבוצות חיידקים. על מנת לנהוג בזהירות יש להשתמש בכלואורוקווינולונים לטיפול במצבים קליניים בהם התגובה לטיפול אנטיביוטי אחר או התגובה המצופה לטיפול אנטיביוטי אחר היא חלשה. לפני תחילת הטיפול יש לוודא שלמות של עור התוף. יש להיזהר מזיהום האיזור המסופל במשך תקופת הטיפול.

### אזהרות למספל:

יש לשטוף היטב ידיים לאחר הטיפול. הימנע ממגע עם העיניים. במידה והחומר נכנס לעיניים, יש לשטוף עם הרבה מים. אם ידוע לך על רגישות לאחד ממרכיבי התרופה יש להימנע ממגע עם התרופה.

### הוראות שימוש:

יש לנער היטב לפני השימוש. יש לנקות היטב את תעלת האוזן החיצונית וליבשה לפני הטיפול. יש לטפטף עשר טיפות לתוך האוזן פעם ביום למשך 7 עד 14 יום. לאחר 7 ימי טיפול על הוטרנר להעריך האם יש צורך להאריך את הטיפול למשך שבוע נוסף.

### טיפה אחת מכילה:

Clotrimazole 237mcg, Dexamethasone Acetate 23.7 mcg, Marbofloxacin 71mcg

לאחר הטפסוף לתוך האוזן יש לעסות את בסיסה בעדינות על מנת להחדיר את התרופה לאזורים הפנימיים של תעלת האוזן. כאשר התרופה מיועדת לשימוש