

- كنت تعاني أو عانيت في الماضي من خلل في وظيفة: جهاز التنفس (مثل الربو)، الكبد.
- كنت تعاني من سخونة مرتفعة، صداع متواصل أو دوار.
- كنت حساساً لأي طعام أو لأي دواء.

تحذيرات إضافية:

- لا يجوز الإستعمال في أوقات متقاربة أو لفترة متواصلة من دون استشارة الطبيب.

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخرًا، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو للصيدلي عن ذلك. يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بالأخص إذا كنت تتناول:

- أدوية التي تؤثر على جهاز الأعصاب المركزي (مثل: أدوية للتهاب اللثام، لپاركينسون، للصرع) - يحتمل زيادة تأثيرها على تثبيط جهاز الأعصاب المركزي.

أدوية التي تعيق الإنزيم مونوآمين أوكسيداز (MAOI) - جراء خطورة زائدة لحدوث متلازمة السيروتونين (التي تتجلى من بين سائر الأمور بسخونة مرتفعة، بارتفاع ضغط الدم، بإضطراب بنظم القلب).

الحمل والإرضاع

إذا كنت حاملاً أو مرضعة، يجب استشارة الطبيب قبل إستعمال الدواء.

السيادة وإستعمال الماكنات

لا يعرف بوجود تأثير على القيادة وإستعمال الماكنات.

معلومات هامة عن بعض من مركبات الدواء

تارودكس شراب للأطفال:

يحتوي كل ٥ مل على ١,٦٧ ملг صوديوم.

يحتوي كل ٥ مل على ٧٦ ملг سكارين.

تارودكس شراب للكلبار:

يحتوي كل ٥ مل على ٢,٢٥ ملг صوديوم.

يحتوي كل ٥ مل على ١٩٠ ملг سكارين.

٣) كيفية إستعمال الدواء؟

عليك الاستشارة من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً.
الجرعة المتبعة عادة هي:

للأطفال بأعمار ٦-١١ سنوات يكون الإستعمال حسب وصفة طبيب.

شراب للأطفال:

عمر ٦-٢ سنوات: ٥ مل كل ٨-٦ ساعات. لا يجوز تجاوز ٢٠ مل في غضون ٢٤ ساعة.

عمر ١٢-٦ سنة: ١٠ مل كل ٨-٦ ساعات. لا يجوز تجاوز ٤٠ مل في غضون ٢٤ ساعة.

شراب للكلبار:

٥ مل كل ٤ ساعات أو ١٠ مل كل ٦ ساعات.

تارودكس شراب للأطفال شراب للكلبار

التركيب:

يحتوي كل ٥ مل على:
ديكستروميتورفان
هيدروبروميد ١٥ ملغ
(Dextromethorphan hydrobromide 15 mg)

(Dextromethorphan hydrobromide 7.5 mg)

لائحة المواد غير الفعالة وملادات الحساسية في المستحضر -
أنظر الفقرة ٦ «معلومات إضافية».

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء.
تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك
أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.
الدواء غير مخصص للرضع دون عمر سنة.
لدى الأطفال بأعمار ٦-١١ سنوات يكون الإستعمال حسب وصفة طبيب.
عليك التوجه إلى الطبيب إذا تفاقمت علامات المرض (أعراض) أو أنها
لم تتحسن خلال ٧ أيام.

١) لأي غرض مخصص الدواء؟

الدواء مخصص لخفيف السعال.

الفصيلة العلاجية
من مجموعة الأفيونيات.

٢) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء:

- لدى الرضع دون عمر سنة.
- إذا كنت حساساً (اليرجي) للمادة الفعالة أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء. لائحة المواد غير الفعالة - أنظر الفقرة ٦ «معلومات إضافية».

- في حال سعال متواصل أو سعال مزمن نتيجة للتدخين، الربو أو نفاس أو سعال يرافقه الكثير من البلغم.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

٣) قبل العلاج بـ تارودكس، إحك للطبيب إذا:

- كنت حاملاً أو مرضعة.

٦) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً:
تارودكس شراب للأطفال

Lycasin, Glycerin, Citric acid, Sodium citrate, Sodium benzoate, Saccharin sodium, Cherry flavour, FD&C Red #40, Purified water.

يحتوي كل ٥ مل على ١,٦٧ ملغم صوديوم.

يحتوي كل ٥ مل على ٧٦ ملغم سكارين.

تارودكس شراب للكبار

Lycasin, Glycerin, Saccharin sodium, Vanillin, Citric acid, Sodium benzoate, Raspberry flavour, Sodium citrate, Peppermint flavour, FD&C Red #40, D&C Yellow #10, Purified water.

يحتوي كل ٥ مل على ٢,٢٥ ملغم صوديوم.

يحتوي كل ٥ مل على ١٩٠ ملغم سكارين.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

تارودكس شراب للأطفال - شراب صافي بلون أحمر فاتح له رائحة الكرن، معبأ بقنية بلاستيك ذات غطاء حماية مقاوم للفتح من قبل الأطفال. تحتوي كل قنية على ١٢٠ مل.

تارودكس شراب للكبار - شراب صافي بلون برتقالي - أحمر له رائحة توت العليق - نعنع، معبأ بقنية بلاستيك ذات غطاء حماية مقاوم للفتح من قبل الأطفال. تحتوي كل قنية على ١٢٠ مل أو ٣٠ مل. لا تسوق كافة أحجام العلب.

المنتج وصاحب الامتياز

تارو للصناعة الدوائية م.ض.، شارع هكتور ١٤، / ص.ب. / ١٠٣٤٧
٢٦٢٤٧٦١ خليج حيفا

أقرت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحتوها فُحص ورُخص في تاريخ: تشرين الثاني ٢٠١٣

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

تارودكس شراب للأطفال: ٦٢٠٩-٢٧٨٣١

تارودكس شراب للكبار: ٦٢١٠-٢٧٨٣٠

من أجل سهولة وتهويين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر.
على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

لا يجوز إستعمال الدواء دون عمر سنة.

لا تتجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.

إذا لم يطرأ تحسن على حالة الصحية خلال ٧ أيام يجب التوجه إلى الطبيب.

يجب الحرص على قياس الجرعة بكأس القياس الخاصة المرفقة.

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا بلع الطفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر عليه الدواء معك.

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد، لا يجوز تناول جرعة مضاعفة. تناول الجرعة التالية في الوقت المعتاد واستشر الطبيب.

لدى الأطفال بعمر ٦-١١ سنوات - يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

لا تتناول الأدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتتأكد من المقادير الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

٤) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال تارودكس شراب قد يسبب أعراضًا جانبية عند بعض المستعملين. لا تندesh من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أي منها.

يجب التوقف عن الإستعمال ومراجعة الطبيب حالاً إذا ظهر: دوار، نعاس، غثيان، تقيؤات، آلام بطن (نادر).

أعراض جانبية وتفاعلات بين الأدوية لدى الأطفال والرضع: على الوالدين إبلاغ الطبيب المعالج عن كل عرض جانبي وكذلك عن كل دواء آخر يعطي للطفل!

أنظر أعلاه أعراض جانبية وتفاعلات خاصة بين الأدوية التي فصلت. إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

٥) كيفية تخزين الدواء؟

• تجنب التسمم: يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسوس. لا تسبب التسوس بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

• لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

• بدرجة حرارة أقل من ٢٥ درجة مئوية.

• خزن في العلبة الأصلية.

• يجب الإستعمال خلال ٣ أشهر من بعد الفتح.