

- הנק סובל או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד: מערכת הנשימה (כגון אסתמה), הכבד.
- הנק סובל מחום גבוה, כאב ראש מתמיד או סחרחותר.
- הנק רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי.

ażhorot nosofot:

- אין להשתמש לעיתים קרובות או תקופה ממושכת בלי להיוועץ ברופא.

■ אם אתה לוקח, או אם לךחת לאחרונה, תרופות אחרות כולן תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד יש לידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח:

- תרופות המשפיעות על מערכת העצבים המרכזית (כגון: תרופה להרגעה, לשינה, לפרקינסון, לאפילפסיה) - תיתכן הגברת השפעתן על דיכוי מערכת העצבים המרכזית.
- תרופות המעכבות את האנדים מונואמינ אוקסידאז (MAO) - עקב סיכון מגבר לסינדרום סרוטוני (אשר מתבטא בין היתר בחום גבוה, יותר לחץ דם, בהפרעה בקצב לב).

■ הירין והנקה

אם הנק בהירין או מיניקה, יש להיוועץ ברופא לפני השימוש בתרופה.

■ נהיגה ושימוש במכוניות

לא ידועה השפעה על הנהיגה ושימוש במכוניות.

■ מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

תרודקס סירוף לילדיים:

- כל 5 מ"ל מכילים 1.67 מ"ג נתרן.
- כל 5 מ"ל מכילים 76 מ"ג סקרין.

תרודקס סירוף למוגברים:

- כל 5 מ"ל מכילים 2.25 מ"ג נתרן.
- כל 5 מ"ל מכילים 190 מ"ג סקרין.

3. כיצד תשתחם בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח. המינון המקביל בדרך כלל הוא:

ילדים בגילאי 6-1 שנים השימוש הוא על-פי מרשם רפואי.

סירופ לילדיים:

גיל 6-2 שנים: 5 מ"ל כל 8-6 שעות. אין לעבור על 20 מ"ל ב- 24 שעות.

גיל 12-6 שנים: 10 מ"ל כל 8-6 שעות. אין לעבור על 40 מ"ל ב- 24 שעות.

**עלון לצריך לפי תקנות הרוקחים
(תק Shirim) התשמ"ו – 1986**

התרופה משווקת ללא מרשם רפואי

תרודקס סירופ לילדיים סירופ למוגברים

הרכב:

כל 5 מ"ל מכילים:
דקסטרומטורפאן
הידרובורומיד 15 מ"ג
(Dextromethorphan hydrobromide 15 mg)
הידרובורומיד 7.5 מ"ג
(Dextromethorphan hydrobromide 7.5 mg)

לרשימת החומרים הבלתי פעילים והאלרגניים בתכשיר - ראה סעיף 6 "מידע נוספת".
קרא בעיון את העalon עד סופו בטרם תשתחם בתרופה.

עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
התרופה אינה מיועדת לתינוקות מתחת לגיל שנה.

ילדים בגילאי 6-1 שנים השימוש הוא על-פי מרשם רפואי.
עליך לפנות אל הרופא באם סימני המחלה (סימפטומים חממיים או אינם משתפרים תוך 7 ימים).

1. למה מיועדת התרופה?

התרופה מיועדת להקלת בשיעול.

קבוצה תרפואיתית

מקבוצת האופיטיים.

2. לפני השימוש בתרופה

א אין לשתחם בתרופה:

- בתינוקות מתחת לגיל שנה.
- אם אתה רגש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה. לרשותך החומרים הבלתי פעילים - ראה סעיף 6 "מידע נוספת".
- במקרה של שימוש מתמשך או שימוש כרוני כתוצאה מעישון, אסטמה או אמفيיזמה או בשיעול המלווה בלילה מרובה.

ażhorot miyadot nognutot le-shimush batrufa

■ לפני הטיפול בתרודקס, ספר לרופא אם:

- הנק בהירין או מיניקה.

- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התטוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התטוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- בטמפרטורה הנמוכה מ- 25°C.
- אחסן באזירה המקורית.
- לאחר הפתיחה יש להשתמש תוך 3 חודשים.

6. מידע נוסף

נוסך על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

תרודקס סירופ לילדיים

Lycasin, Glycerin, Citric acid, Sodium citrate, Sodium benzoate, Saccharin sodium, Cherry flavour, FD&C Red #40, Purified water.

כל 5 מ"ל מכילים 1.67 מ"ג נתרן.

כל 5 מ"ל מכילים 76 מ"ג סקרין.

תרודקס סירופ למוגרים

Lycasin, Glycerin, Saccharin sodium, Vanillin, Citric acid, Sodium benzoate, Raspberry flavour, Sodium citrate, Peppermint flavour, FD&C Red #40, D&C Yellow #10, Purified water.

כל 5 מ"ל מכילים 2.25 מ"ג נתרן.

כל 5 מ"ל מכילים 190 מ"ג סקרין.

כיצד נראה התרופה ומה תוכן האזיה:

תרודקס סירופ לילדיים – סירופ צלול בצבע אדום בהיר עם ריח דובדבן, ארוז בבקבוק פלסטיק עם מכסה הגנה בפני פתיחה על ידי ילדים. כל בקבוק מכיל 120 מ"ל.

תרודקס סירופ למוגרים – סירופ צלול בצבע כתום-אדום עם ריח פטל-נענע, ארוז בבקבוק פלסטיק עם מכסה הגנה בפני פתיחה על ידי ילדים. כל בקבוק מכיל 120 מ"ל או 30 מ"ל. לא כל האזיות משוקקות.

היצן ובעל הרישום

תרו תעשייה רוקחית בע"מ, רח' הקיטור 14, ת.ד. 10347
מפרץ חיפה 2624761.

עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך: נובמבר 2013.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

תרודקס סירופ לילדיים: 6209.27831

תרודקס סירופ למוגרים: 6210.27830

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נכתב בלשון זכר.
על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

78930-1213

סירופ למוגרים:

5 מ"ל כל 4 שעות או 10 מ"ל כל 6 שעות.

אין להשתמש בתרופה מתחת לגיל שנה.

אין לעבור על המנה המומלצת.

אם לא חל שיפור במצבך תוך 7 ימים יש לפנות לרופא יש להකפיד על מדידת המנה בכווית המדידה המיוחדת המצוירת.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בעלILD מן התרופה,
פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית החולים ובא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן הדרוש, און ליטול מנה כפולה. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל והיויעץ ברופא. בילדים בגיל 6-1 שנים - יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה **בכל פעם** שהנק נטל תרופה. הרכיב משקפיים אם הנק זקוק להם. אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, הייעוץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בתרודקס סירופ עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלואוי. יתכן ולא תסבול מכך אחת מוהן.

יש להפסיק את השימוש ולפנות מיד לרופא אם מופיעים:

סחרחות, נמנום, בחילה, הקאות, כאבי בטן (נדיר).

תופעות לוואי ותגובה בין-תרופתיות בילדים ובתינוקות:

על ההורים לדוח לרופא המטפל על כל תופעת לוואי וכן על כל תרופה נוספת הניתנת לילד!
ראה לעיל תופעות לוואי ותגובה בין-תרופתיות מיוחדות שפורטו.

אם אחת מתופעות הלואוי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא הזכרה בעלוון, עליך להתריעץ עם הרופא.

5. איך לאחסן את התרופה?

• מנע הרעללה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ואו תינוקות ועל ידי כך תמנع הרעללה. אל תגרום להתקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.