

أقرت وزارة الصحة صيغة هذه الشفرة وتم فحص محتواها و الموافقة عليها من قبل الوزارة.

نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) ١٩٨٢

أقرا/ي النشرة بإمعان حتى نهايتها قبل استعمال الدواء

نوروفين®

كبسولات تحوي سايل ٢٠٠ ملغ

كل كبسولة تحوي على:
Ibuprofen 200mg

المواد غير الفعالة

Polyethylene glycol 600, Vitamin E, Povidone K17, Gelatin, Maltitol liquid, Sorbitol liquid, Purified water, Ponceau 4R, Opacode MS-78-18011 or Opacode S-1-7020, Titanium dioxide, Shellac, dewaxed.

الفصيلة العلاجية من مضادات الالتهاب الستيرويديّة.

تأثيرات الدواء الطويلة

تؤثرufen خصوصاً لتسكين الآلام الخفيفة حتى المتوسطة مثل: الصعاع، ألم الأسنان، آلام الدورة الشهرية، آلام الظهر والمضلات، مضاد للالتهاب في الأمراض الروماتيزية، تخفيف السخونة.

على أن يجوز استعمال المستحضرة؟

لا تستعملي هذا الدواء عندما تكونين في فترة الحمل.
لا يجوز استعمال هذا الدواء إذا وجدت لديك حساسية للدواء أو أحد مكوناته، إذا حدث لديك في الماضي رد فعل تحسسي عند تناول أي مسكن للألام، إذا اجترت في الآونة الأخيرة في ما إن كنت غير شاك أجراً عندي جرعة في الطب.
لا يجوز تناول هذا الدواء بشكل متزامن مع أدوية أخرى من فصيلة مضادات الالتهاب الستيرويديّة.
لا يجوز استعمال هذا الدواء إذا كنت تعاني/ن أو إن عانيت في الماضي من قرحة هضمية.

على أن لا يجوز استعمال هذا الدواء قبل استشارة الطبيب مقدماً

لا يجوز تناولين في فترة الرضاعة، وإن كنت إنشابة في الماضي في مشاكل مع المعدة مثل الحرقان، آلام البطن، مشاكل في تخثر الدم، ارتفاع ضغط الدم، أمراض القلب والكلى، في مثل من وظيفة الجهاز التنفسي (كالدوبو)، الكبد، الدثية، الحمى، أمراض السنج الضمام، إذا كنت تتناولين أدوية مدرّة للبول، إن تجاوزت عمر ٦٠ سنة، إذا سبب تناول دواء من هذه الفصيلة أو كل مسكن آخر للألام في الماضي أعراضاً جانبية خطيرة.

كيف سيؤثر هذا الدواء على سير امورك اليومية؟

لا يسبب هذا الدواء النعاس، الدور أو تشوش الرؤية لدى الأشخاص معينين، فإذا شعرت بهذه الأعراض بعد استعمال المستحضر عليك إتخاذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات لا تشغيل مآكنا خطيرة أو كل نشاط يتطلب اليقظة، والحيطة للأطفال. يجب تحذيرهم من ركوب الدراجات أو اللعب مقربة من حركة المرور وما شابه.

في سبب هذا الدواء حساسية خاصة عند تعرضك للنسيم، لذا تجنب/ي التعرض لها والحرص في حماية مناسبة (الأنبسة الطويلة، قبعة، مستحضرات واقية والخ).

تحذيرات

لا يجوز استعمال هذا الدواء بإيقافات متقاربة أو لفترة طويلة بدون استشارة الطبيب.

يجب اجراء فحص البصم البصري للدم، البول، وظيفة الكبد، الكلية وقصن العينين وذلك إذا استمر العلاج بهذه الأدوية طويلة.

يجب إبلاغ الطبيب عن أي حساسية لديك لعلمام أو عقاقير قبل استعمال الدواء.

يجب مراجعة الطبيب إذا كنت قدماً، أو إجراء عملية جراحية (بما في ذلك جراحة الأسنان) أو إجراء فحص مخبرية، نظراً لأن العلاج قد يؤثّر على نتائج هذه الفحص.

إن تناول هذا المستحضر قد يسبب إثارة في المعدة خاصة إذا:

- تجاوزت عمر ٦٠ سنة.
- كنت تتناولين أدوية أخرى من فصيلة مضادات الالتهاب الستيرويديّة.
- كنت تستهلكين/ين أكثر من ٢ مشروبات كحولية في اليوم.

إن تناول هذا المستحضر بجرعات أعلى من الموصى بها أو لفترة طويلة قد يزيد الخطورة لحودت مسكحة ومضاعفة أو توتية للثوية أو إثارة في المعدة.

هذا الدواء في سبب أعراض تحسسية مثل: طفح، حكة، حوصصات في الجلد، انتفاخ في الوجه، تورم، انخفاض ضغط الدم، صعوبة في التنفس، قادم الربو، صدمة.

من يرقف في عن استعمال رواج/ي الطبيب، إذا استمرت السخونة لأكثر من ٣ أيام أو إذا استمرت الآلام لأكثر من ١٠ أيام.

التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناولين أدوية إضافية أو إذا تعيبت العلاج بدون إجراء، بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية، وإضافات غذائية، فيجب إعلام الطبيب المعالج، وذلك لتفادي الأخطار أو عدم الجاعة الناتجة عن التفاعلات بين الأدوية خاصة الأدوية التي تنتمي إلى المجموعات التالية:

أسبيرين، مسكبات، أو مضادات الالتهاب الأخرى، مضادات تخثر الدم (كالكومارين، كورتيكوستيرويدات، ميتوثريلات، مضخات ضغط الدم (مثل حاجبات بيتا)، كورتيكوستيرويدات، ميتوثريلات (السنتان والهدنة)، أدوية مدرّة للبول مثل الفلوروسينيد والثيلازيدات، البيثيم، بروفينيسيد، زيدون فوردين (اللايدون).

الأعراض الجانبية

إصابة في التفاعل الحمية العزلة للدواء فقد تظهر أثناء فترة استعماله وتأثيرات جانبية مثل: إسهال، غثيان، آلام البطن، دور، حرقان.

الأعراض التي تقتضي اهتماماً خاصاً

وردة في الوجه، انتفاخ اللسان، الصدرة، ضيق في التنفس، تسارع القلب، ضغط دم منخفض، صدمة خطيرة (نادراً)، رواج/ي الطبيب حالاً.

اضطرابات في السمع في الرضوية، ألم في أعلى البطن، طفح، تقشر الجلد، أعراض الالتهاب السحلي، الدوخة، مثل تسلسل العنق، صلص، غثيان، غثيان سخونة، تيبس وآلام في العمود الفقري (نادراً)، رواج/ي الطبيب حالاً.

إذا كنت شعورين، ثقلاً، يدهوي، براز دهوي أو أسود، توقفي/ي عن العلاج وراجعي/ي الطبيب حالاً.

أما إن ظهرت لديك أعراض جانبية لم تذكر في هذه النشرة، أو إن طرا أي تغيير على شعورك العام، عليك عندئذ مراجعة الطبيب حالاً.

الجرعة الأوتية

الكبار والأطفال فوق ١٢ سنة من العمر: ٢-٤ كبسولات، بعد ذلك وحسب الزرزم ٢-١ كبسولات كل ٤-٦ ساعات.

لا تجاوزي الجرعة الموصى بها.

لا يجوز تناول أكثر من ٤ كبسولات خلال ٢٤ ساعة.

لا تستعمل في فترة الحمل، ولا تحققي هدف الاستعمال.
يجب استعمال الجرعة الصغرى التي تحققي هدف الاستعمال.

لا يجوز تناول هذا الدواء مع أو بعد وجبة من الطعام.

لا يشاهدات الاستعمال

لا يجوز مضغ، سحق أو يعد وجبة من الطعام.

تجنب/ي التسليم: يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي تسليطهم بالنسيم.

إن الأقرت في تناول الجرعة الأوتية أو إن بلغ الطول/ة خطاً من هذا الدواء، عليك التوجه إلى المستشفى حالاً صمطحلاً، أو عبوة الدواء.

لا تستعمل في فترة الحمل، ولا تحققي هدف الاستعمال.
لا تتناولين أدوية أخرى في العتمة، يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من الجرعة الأوتية قبل كل مرة تتناولين بين بعضها دواء.

في التفاعلات الحمية أثاراً ألام الأبرام.

التحذيرين

لا يجوز التحذيرين في درجة حرارة تزيد عن ٢٥ درجة مئوية.

تبقى الأدوية صالحة لفترة محدودة فقط، ولو في ذلك في عملتها الأصلية وتم حفظها بموجب تعليمات التحزين، أثاراً بلا ملاحظة تارة، انتهاء صلاحية المستحضر المدونة على العبوة، في حالة العبثا، عليك استشارة الصيدلي الذي صرف لك هذا الدواء.

لا يجوز تحذيرين أدوية مختلفة في نفس العبوة.

رقم سجل الدواء: ١٣٧٥٥٣٠٠٥٤

المنتج: ريكيت بينكيزير هيثا كير إينترناسيونال م.ص.

توزيعها: أكتافرا.

صاحب الإعتياز: ريكيت بينكيزير (إيرستيم) م.ص.

شارع هجانا ٦٠١، حور، هشارون، ص.ب. ١٤٤٠، إسرائيل. ٥٧٤٠