



# ستروكس قطرات للعين

اذا شعرت باعراض جانبية لم تذكر في هذه النشرة، او اذا طرأ تغيير في شعورك العام عليك استشارة الطبيب فوراً.  
**الجرعة:**

احسب تعليمات الطبيب فقط. لا يكفي خاوز الجرعة الموصى بها اذا لم يطرأ خسرين على حالتك الصحية خلال سبعة ايام يجب التوجه للطبيب. يجب استعمال الدواء في الاوقات المقررة من قبل الطبيب المعالج . اذا نسيت تعاطي الدواء في الوقت المحدد عليك تناول الجرعة فوراً بعد تذكرك. ولكن يمنع بتناً تناول جرعتين معاً:-

لا يبلغ هذا الدواء فهو للاستعمال الخارجي فقط.  
**تعليمات الاستعمال:**

اغسل يديك جيداً. امل رأسك الى الوراء او استلقي على السرير وبواسطة اصبعك اخذ الجفن الاسفل قليلاً عن العين. قطر الدواء في الفراغ الذي نبع عن ذلك ثم اغلق عينيك لمدة 1-2 دقائق. امتنع عن الرمش.

اذا كنت تعتقد ان القطرة لم تستوعب قطر مرة اخرى. نشف باقى المحلول حول العين بواسطة منديل من الورق. لمنع تلوث المحلول حافظ ان لا يمس طرف القنبلة اي مسطح كان يشمل ذلك الأصبع او العين ثم اغلق القنبلة جيداً.  
**كيف تساهمن في إيجاد العلاج؟**

عليك استيفاء العلاج الموصى به من قبل الطبيب. لا تتوقف عن العلاج بالدواء حتى ولو طرأ خسرين في حالتك الصحية بدون استشارة الطبيب.  
**امتنع عن التسمم:**

يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول ايدي الاطفال لتفادي اصابتهم بتسوس. اذا تناولت جرعة مفرطة او اذا بلغ ولد من الدواء سهوا عليك التوجه فوراً الى غرفة الطوارئ في المستشفى وخذ معك علبة الدواء. يمنع تسبب التقيؤ دون تعليمات واضحة من الطبيب.

يمنع تناول الدواء في الظلام ! افحص الملصقة وتتأكد من الجرعة في كل مرة تتناول فيها الدواء وضع النظارات اذا اقتضت الحالة لذلك. هذا الدواء وصف لمعالجة مرضك انت فقط وقد يضر مريضاً آخر. يمنع اعطاء الدواء لقاربيك، جيرانك او معارفك. التخزين: في مكان مظلم، حتى 25 درجة مئوية يمنع تخبيده. اغلق القنبلة جيداً لمنع تسرب الهواء والرطوبة. يمنع استعمال هذا الدواء اكثر من شهر واحد بعد فتح القنبلة للمرة الأولى. كذلك حتى عند مراعاة تعليمات التعبئة والتخزين الموصى بها تبقى الأدوية صالحة لمدة محددة فقط. يرجى الانبهار لتاريخ انقضاء صلاحية الدواء. في حالة الشك عليك استشارة الصيدلى الذى زودك بالمستحضر. يمنع تخزين أدوية عديدة في علبة واحدة.

رقم تسجيل: ٥٣٣٥٤٧٠٦  
فيشر مختبرات (١٩٧٥) م.ض. ص.ب. ٣٩٠٧١ تل ابيب ٦١٣٩٠

نشرة للمستهلك حسب انظمة الصيادلة (مستحضرات) لعام ١٩٨١  
هذا الدواء يستلزم وصفة طبية

طالع الكراس بتمعن حتى نهايته قبل استعمال الدواء  
وزارة الصحة حددت شكل هذه النشرة. فحصت محتواها ووافقت عليه

## تركيبة المادة الفعالة وتركيزها:

Dexamethasone Disodium Phosphate 0.1%.

Benzalkonium Chloride, Borax, Disodium EDTA

Purified Water, Sodium Chloride, Sodium Citrate

**الفعالية الطبية:** مستحضر سترويدى لمعالجة التهاب العيون.

**متى يحظر استعمال المستحضر؟**

يحظر الاستعمال اذا كانت لك حساسية لحد من مركبات هذا الدواء. يحظر الاستعمال أيضاً اذا انت قد تعانى من مرض "الهيركس سيميلكس". "كرياتيس". امراض فطرية في العين. امراض فيروسية في العين. مرض السل في العين وكذلك بعد ازالة اي جسم غريب من العين بدون ان تعرض العين لضرر بالغ.

يحظر استعمال هذا الدواء في الحالات الآتية دون استشارة طبيب قبل بدء العلاج:  
بحالة وجود ضغط عال داخل العين (جلوكوما). اصابة في عصب النظر خلل في النظر حالة غشى عدسة العين (كتاراكت). اي تلوث في العين. مرض السكري وإذا كنت حاملاً أو مرضعة.  
**خذيرات:**

لا الاستعمال المطول يمكن ان يسبب التلوث في القرنية نتيجة عن تلوث فطري.  
يحظر استعمال الدواء تكراراً او لفترة مطولة دون استشارة الطبيب. اذا كان العلاج لفترة مطولة فيجب اجراء فحص ضغط داخل العين طيل العلاج هذا المستحضر يحتوى على المادة الواقية بنزلكونيوم كلوريد التي يمكن ان تتصدى للعدسات اللاصقة للعين. يحظر استعمال المستحضر حين استعمالك العدسات اللاصقة. يجب نزع العدسات قبل استعمال المستحضر ولا يمكن ارجاعها ثانية الا بعد مرور ما لا يقل عن 15 دقيقة من تقطير العين بالدواء.  
**تفاعلات الدواء مع الادوية الأخرى:**

اذا كنت تتناول / بين دواء اضافياً او انتهيت اذن من علاج بدواء آخر عليك ابلاغ الطبيب المعالج بذلك لتفادي الاخطار او عدم خياعه العلاج الناجمة عن تفاعلات الدواء مع الادوية الأخرى.

**اعراض جانبية:**  
اضافة الى الفعالية المرغوبة للدواء قد تظهر اثناء استعماله اعراض جانبية مثل تشويب النظر.

**اعراض تلزم التعامل معها بشكل خاص:**  
في حالات نادرة يمكن ظهور تلوثات مختلفة في العين. آلام عيون تهيجاً واحمرار. واصل العلاج وتوجه للطبيب.