



## סטרודקס® טיפות עיניים סטריליות

עלון לצורך לפי תקנות הרוקחים (תקשיים התשמ"א 1986)  
תרופה זו חיבת מרשם רפואי  
קרו בעין את העalon עד סופו בטרם תשמש בתרופה.  
פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על ידו.

**מינון:** לפי הוראות החופא בלבד. אין לעבור על המנה המומלצת.  
אם לא חל שיפור במצבך תוך 7 ימים יש לפנות לרופא. יש להשתמש בתרופה זו בזמנים קצרים כפי שנקבע ע"י הרופא המטפל.

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן קצוב יש ליטול מנה מיד כשנזכרת אך בשום אופן אין ליטול שתי מנות ביחד!  
**שים לב: לא למלוע!** תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.

**אופן השימוש:** רחץ היבט את ידיך, הטה ראש לאחר או שכב על המיטה. בעזרת האצבע הרוחק מעט את העפעף התחתון מן העין, לתוך המרווה שיוציא טפטף את התרופה ועצום העיניים למשך 1-2 דקות. אל תעפעף. אם הין חשוב שהטיפול לא נקלטה השתמש בעוד טיפה. את שאר התמיסה שמסביב לעין נקה עם מגבען. למניעת זיהום הקפד שקצת הבקבוק לא יבוא במגע עם משטח כלשהו כולל האצבע או העין וסגור את הבקבוק היבט.

**כיצד תוכל/i לסייע להצלחת הטיפול?** עליך להשלים את הטיפול שהומלץ ע"י הרופא. גם אם חל שיפור במצב בריאותך אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התיעיצות עם רפואי.

**מנע הרעללה!** תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקומם סגור מחוץ להישג ידם של ילדים /או תינוקות וע"י קר תמנע הרעללה.

אם נטلت מנת יתר או אם בטעות בעליך מילך מן התרופה, פנה מיד לחדר מיון של בית חולים והבא איתך אריזת התרופה.

**אל תגוזם להקאה ללא הוראה מפורשת של רפואי!**  
**אין ליטול תרופות בחושך!** – בדק/i התווית והמנה בכל פעעם שהינך נוטל/ת תרופה. הרכבי/ משקפיים אם הנר זוקק/ה להם. **תרופה זו רשומה לטיפול במחלתן, בחולה אחר/ת היא עלולה להזיק.** אל תיתן תרופה זו לקרוביך, שכןך און מכיר.

**אחסנה:** במקום חשוך, עד 25°C. לא להקליפה. סגור היבט ומגע חידית אויר ורטיבות. אין להשתמש בתרופה יותר מחודש לאחר פתיחת הבקבוק לראשוונה. גם לפי תנאי האריזה/אחסנה המומלצות, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. נא לשים לב לתאריך התטוגה של התכשיר! בכל מקרה של ספק עליך להזיעץ ברוקח שישפיך לך את התרופה.

אין לאחסן תרופות שונות באותו אריזה.

מספר רישום: 533524706  
פישר מעבות פרמצטטיות (1975) בע"מ ת.ד. 39071, ת"א 03906  
61390

**הרכב:**

**החומר הפעיל ורכיביו:**

Dexamethasone Disodium Phosphate 0.1%

**חומרם בלתי פעילים:** Benzalkonium Chloride, Borax, Disodium Citrate

EDTA, Purified Water, Sodium Chloride, Sodium Citrate

**فعاليות רפואי:** תכשיר סטרואידי לטיפול בדלקות העין.

**מתי אין להשתמש בתכשיר?**

אין להשתמש אם ידועה רגישות לאחד ממרכיבי התרופה. אין להשתמש בתרופה כשהן סובל מהרפס סימפלקס קרטיטיס, מחלות פטריטיות בעין, מחלות וירליות בעין, שחפת של העין ולאחר סילוק גוף זר מהعين שלא גרם לסיבוך יתר.

**אין להשתמש בתרופה זו מבלי להזיעץ רפואי לפני תחילת הטיפול:**

במקרים של לחץ תוך עיני גובה (גלאוקומה) פגעה בעצב ראייה, פגם בראייה, במרקחה של קטרקט, זיהום כלשהו בעין, מחלת הסכרת ואם הין בהרין או מניקה.

**ażhorot:** שימוש ממושך עלול לגרום לziehom בקרניות הנובע מזיהום פטריטי. אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או תקופה ממושכת בלי להזיעץ רפואי. אם הטיפול ממושך יש לערוך בתקופת הטיפול בדיקות לחץ תוך עין. התכשיר מכיל חומר משמר בנזקונים כלורייד, העולול להיספג על ידי עדשות מגע רכות. אין להשתמש בתכשיר זה כאשר אתה מרכיב/ה עדשות מגע רכות. יש להסיר העדשות לפני השימוש בתכשיר, ונitin להחזירן כעבור לא פחות מ-15 דקות מהזלתת התרופה לעין.

**תגובה בין תרופות:** אם הנר נוטל/ת תרופה נוספת או אם גמרת זה עתה טיפול בתרופה אחרת עליך לדוח לרופא המטפל כדי למן עסиков או אי-יעילות הנובעים מתגובה בין תרופות.

**תופעות לוואי:** בנוסף לפיעול הרצואה של התרופה, בזמן השימוש בה, עלולות להופיע השפעות לוואי כגון טישטווש ראייה.

**תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת:** במקרים נדירים עלולים להופיע זיהומים שונים בעין, כאבי עיניים עקצוץ ואדמדומיות, המשר בטיפול ופונה לרופא.

בכל מקרה שבו הין מרגיש/ה תופעות לוואי שלא צוינו בעalon זה, או אם חל שינוי בהרגשת הכללית עליך להתייעץ עם הרופא מיד.