



לייטירס®

טיפול עיניים סטריליות

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו 1986
קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.
פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על ידו.

שים לב - לא לבלוע! תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.
אופן השימוש: רחץ היטב את ידיך, הטה ראשך לאחור או שכב על המיטה ובעזרת האצבע הרחק מעט את העפעף התחתון מן העין. לתוך המרווח שיווצר טפטף את התרופה ועצום את העיניים למשך 1-2 דקות. אל תעפעף.
אם הינך חושב/ת שהטיפול לא נקלטה השתמש/י בעוד טיפה. את שאר התמיסה שמסביב לעין נקה עם מגבון.
למניעת זיהום התמיסה: הקפד שקצה הבקבוק לא יבוא במגע עם משטח כלשהו כולל האצבע או העין וסגור את הבקבוק היטב.

כיצד תוכל/י לסייע להצלחת הטיפול? עליך להשלים את הטיפול שהומלץ ע"י הרופא. גם אם חל שיפור במצב בריאותך אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.
מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות וע"י כך תמנע הרעלה. אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה פנה מיד לחדר מיון של בית-חולים והבא אריזת התרופה איתך.
אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת של רופא!

אין ליטול תרופות בחושך! בדק/י התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל/ת תרופה. הרכב/י משקפיים אם הינך זקוק/ה להם.

אחסנה: עד 25°C. לא להקפיא. סגור היטב ומנע חדירת אויר ורטיבות. אין להשתמש בתרופה יותר מחודש לאחר פתיחת הבקבוק לראשונה. גם לפי תנאי האריזה/אחסנה המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר! בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה. אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

מס' רישום התרופה: 524824159
פישר מעבדות פרמצבטיות (1975) בע"מ ת.ד. 39071, ת"א 61390

הרכב:

החומר הפעיל וריכוזו:
Hydroxyethylcellulose 0.19%

חומרים לא פעילים:

Purified Water, Glycerin, Sodium Chloride, Disodium Phosphate, Potassium Chloride, Disodium EDTA, Benzalkonium Chloride

פעילות רפואית: התכשיר משמש לסיכה במקרים של יובש בעיניים כאשר יצירת הדמעות אינה מספקת.

מתי אין להשתמש בתכשיר?

אין להשתמש אם ידועה רגישות לאחד ממרכיבי התרופה.
אין להשתמש אם התמיסה שינתה את צבעה או שנהיתה עכורה.

אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני תחילת הטיפול אם הינך בהריון שליש ראשון, אחרון או מניקה.

אזהרות:

אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או תקופה ממושכת בלי להיוועץ ברופא. התכשיר מכיל חומר משמר בנזלקוניום כלוריד, העלול להיספג על-ידי עדשות מגע רכות. אין להשתמש בתכשיר זה כאשר את/ה מרכיב/ה עדשות מגע רכות. יש להסיר העדשות לפני השימוש בתכשיר, וניתן להחזירן כעבור לא פחות מ-15 דקות מהזלפת התרופה לעין.

תגובות בין תרופתיות: אם הינך נוטל/ת תרופה נוספת, או אם גמרת זה עתה הטיפול בתרופה אחרת עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי יעילות הנובעים מתגובות בין-תרופתיות.

תופעות לוואי: בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה, בזמן השימוש בה עלולות להופיע השפעות לוואי.

תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת: במקרים נדירים של גירוי, אדמומיות, שינוי בראיה, כאב עיניים, הפסק הטיפול ופנה לרופא מיד. בכל מקרה שבו הינך מרגיש/ה תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה, או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית עליך להתייעץ עם הרופא מיד.

מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מרופא: 1-2 טיפות 3-4 פעמים ביום. אם לא חל שיפור במצבך תוך 3 ימים יש להפסיק הטיפול ולפנות לרופא.