



## افرين® - ١٠ قطرات معقمة للعين

### ظواهر تستلزم التعامل الخاص -

اعراض امتصاص سيستماتي، رجفة، خفقان قلب متتسارع، تشوش في نبض القلب، وجع في العين، تصبب زائد للعرق، حساسية، طفح جلدي او التهاب موضعي. (لم يكن قبل استعمال المستحضر) توقف عن العلاج وتوجه للطبيب. في حالة شعورك باعراض مرافقة لم تذكر في هذه النشرة او طرأ تغير في وضعك العام، عليك مراجعة الطبيب فوراً.

#### الكمية:

كمية الاستعمال حسب تعليمات الطبيب فقط. ويحظر جاوز الكمية الموصى بها. هذا الدواء غير معد عادة للأولاد والاطفال. يجب استعمال الدواء في مواعيد محددة من قبل الطبيب المعالج. اذا نسيت استعمال الدواء في الوقت المحدد، استعمله على الفور ولكن يحظر الاستعمال بكمية مضاعفة. **- انتبه -**

يحظر البالغ! هذا الدواء معد للاستعمال الخارجي فقط.  
**طريقة الاستعمال:**

اغسل يديك جيداً، ارجع رأسك الى المثلك، او استلقي على السرير وبأصبعك ابعد الجفن الاسفل عن العين وفي الفتحة قم بتقطير الدواء واغلق عينيك لمدة ١-٢ دقيقة، لا ترمش، حتى لا تلتوي القطرة احذر ملامسة فوهة القنينة لاي جسم كان بما في ذلك الاصبع او الاعين واغلق القنينة جيداً. يحظر استعمال الدواء اكثر من شهر واحد بعد فتح القنينة لاول مرة. **امنع التسمم:**

هذا الدواء وكل دواء آخر يجب حفظه في مكان مغلق بعيداً عن ايدي الاطفال و/او الصغار وبذلك تمنع التسمم، اذا تناولت وجبة زائدة او قام ولد بالخطأ بابتلاع الدواء. توجه فوراً الى المستشفى ومعك علبة الدواء. لا تؤدي الى التقييد دون تعليمات مفصلة من الطبيب.

**هذا الدواء معك لك: قد يضر مريضاً آخر**  
لا تعطاء الدواء لاقرائك، جيرانك او معارفك.

**لا تستعمل الدواء في الظلام.** افحص الملصقة والوجبة في كل مرة تأخذ فيها الدواء. ضع النظارات اذا كنت تستعملها.

#### الحفظ:

احفظ القنينة مغلقة جيداً حتى 25 درجة مئوية. حتى وفق تعليمات المحفظ الموصى بها. تبقى فعالية الدواء لفترة محددة فقط. يرجو الانتباه لموعد انتهاء مفعول الدواء! في اية حالة من الشك، عليك استشارة الصيدلي الذي قدم لك الدواء.

رقم تسجيل الدواء: ٣٠٦٤٢١٨٤٩

فيشر مختبرات (١٩٧٥) م.ض. ص.ب. ٣٩٠٧١ تل ابيب ٦١٣٩٠

نشرة للمستهلك حسب انظمة الصيادلة (مستحضرات) لعام ١٩٨٦

هذا الدواء يستلزم وصفة طبية

طالع الكراس بتعمق حتى نهايته قبل استعمال الدواء  
وزارة الصحة حددت شكل هذه النشرة، فحصت محتواها ووافقت عليه

### تركيبة المادة الفعالة وتركيزها:

**الفعالية الطبيعية:**

Phenylephrine Hydrochloride 10%

**مواد غير فعالة:**

Benzalkonium Chloride, Boric Acid, Disodium EDTA

Purified Water, Sodium Bisulfite

توسيع البؤبة وتقليل الاوعية الدموية

متى يحظر استعمال المستحضر؟

يحظر الاستعمال اذا كانت لديك حساسية لواحدة من مركبات الدواء.  
يحظر الاستعمال اذا كنت تعاني/ين من الجلاوكوما.

يحظر استعمال الدواء دون استشارة الطبيب قبل العلاج: اذا كنت حاملاً او مريضة، اذا كنت تعاني او عانيت في الماضي من خلل في عمل القلب و/او الاوعية الدموية، العينين، الغدة الدرقية (тирؤيد)، السكري، او ضغط الدم المرتفع. **خذيرات:**

اذا كانت لديك حساسية لاي غذاء او دواء، عليك ابلاغ الطبيب بذلك قبل استعمال الدواء.

هذا المستحضر يحتوي على المادة الواقية بنزلكونيوم كلوريد التي يمكن ان تمتصلها العدسات اللاصقة للعين. يحظر استعمال المستحضر حين استعمالك للعدسات اللاصقة للعين. يجب نزع العدسات قبل استعمال المستحضر ولا يمكن ارجاعها ثانية الا بعد مرور ما لا يقل عن ١٥ دقيقة من تقطير العين بالدواء.

#### التفاعل بين الادوية:

اذا كنت تستعمل/ين دواء اخر او انتهيت لتوك من العلاج بدواء آخر، عليك ابلاغ الطبيب المعالج بذلك حتى تتفادى الخطأ او عدم النجاعة الناجمة من التفاعل بين الادوية. ولا سيما الادوية من المجموعات التالية: ادوية ضد الاكتئاب من مجموعة تسرسيكلينيم ومن مجموعة MAOI وخلال ٢١ يوماً من الانهاء من استعمالها (GUANETHIDINE, METHYLDOPA, RESERPINE ومانع البينا (الضغط الدم المرتفع وللقلب)).

#### اعراض مرافقة:

بالاضافة للفاعلية المرغوبة للدواء قد تظهر خلال استعمال الدواء اعراض مرافقة مثل: وجع الرأس، حساسية في العين للضوء، وقرصات بالعين. اذا استمرت هذه الاعراض و/او ضيقتك يجب التوجه للطبيب.