



® אפרין-10 טיפולים עיניים סטריליות

עלון לצריכן לפי תקנות הרווקחים (תקשיירם) התשמ"ו 1986
תרופה זו חיבת במרשם רופא
קרא בעיון את העalon עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.
פורמת עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על ידי.

בכל מקרה שבו הינך מרוגש/ה תופעתו לואו שלא ציינו בעalon זה,
או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית עליך להתייעץ עם הרופא מיד.
מינון: מינון לפי הוראות הרופא בלבד. אין לעבור על המנה המומלצת.
תרופה זו אינה מיועדת בדרך כלל לילדים ותינוקות. יש להשתמש
בתרופה זו בזמנים קבועים כפי שנקבע על-ידי הרופא המטפל. אם
שכחת ליטול תרופה זו ובזמן הקצוב יש ליטול מנה מיד כשןזכרת,
אך בשום אופן אין ליטול שתי מנות ביחד!
שים לב: לא**לבול!** תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.

אופן השימוש: רחץ היבט את ידיך, הטה ראשך לאחר מכן, או שכב על
מיטה ובעזרת האצבע הרחך מעט את העפער התחתון מן העין.
لتוך המרוכח שיוציא טפטט את התרופה וע Zusim העיניים למשך 1-2
דקות. אל תעפעף. למניעת זיהום התמסה הקפד שפיית הבקבוק
לא תבוא במגע עם משטח כלשהו, כולל האצבע או העין וסוגר הבקבוק
היבט און להשתמש בתרופה יותר מחודש ימים לאחר פתיחת הבקבוק
ראשונה.

מנע הרעליה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקום סגור
מחוץ להישג ידים של ילדים /או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעליה.
אם נטלה מנתה יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה פנה מיד
לחדר רפואי של בית-חולים והבא אויזת התרופה איתך.

אל תגרום להקה לא הוראה מפורשת מרופאי!
תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתן, בחולה אחר(ת) היא עלולה
להזיק. אל תתן תרופה זו לקריבור, שכניר או מכрин.

אין ליטול תרופות בחושרי! בדוק התווית והמנה בכל פעם
נטול תרופה. הרכבי/ משקפיים אם הינך זקוק/ה להם.

אחסנה: עד 25°. סגור היבט ומגע חידרת אויר ורטיבות.
גם לפני האראה/אחסנה המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה
מוגבלת בלבד. נא לשים לב לתאריך התיפה של התכשיר! בכל מקרה
של ספק, עליך להיוועץ ברופך שסיפק לך את התרופה.
אין לאחסן תרופות שונות באותו אראה.

מספר רישום התרופה: 306421849
מספר מעבדות פרמצטניות (1975) בע"מ ת.ד. 39071, ת"א 09061

הרכב:

החומר הפעיל ורכיבו: 10% Phenylephrine Hydrochloride
חומרים בלתי פעילים: Benzalkonium Chloride, Boric Acid, Disodium EDTA, Purified Water, Sodium Bisulfite.

פעילות רפואי: הרחבת האשון והצרת כלי דם.

מתי אין להשתמש בתכשיר?

אין להשתמש אם ידועה ריגשות לאחד ממרכיבי התרופה.
אין להשתמש אם הינך סובל/ת מגלאוקומה.

אין להשתמש בתרופה מבלי להוועץ ברופא לפני התחלה הטיפול:
אם הינך בהריון או מניקה.

אם הינך סובל/ת או סבלת בעבר מליקוי בתיפוק הלב ו/או כלי דם,
עינויים, בלוטת התריס (тирואיד), מסכרת, או מיתר לחץ דם.

אזהרות: אם הינך רגש/ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך
להודיע על כך לרופא לפני ניתוח התרופה. התכשיר מכיל חומר משמר
בנזילקוניאום קלורייד, העולול להיספג על-ידי עדשות מגע רכות. יש
להשתמש בתכשיר זה כאשר אתה מרכיב/ה עדשות מגע רכות. יש
להטייר העדשות לפני השימוש בתכשיר, וניתן להחזיר כעבור לא פחות
מן 15 דקות מהזלתת התרופה לעין.

תגובהות בין-תרופיות: אם הינך נוטל/ת תרופה נוספת, או גמרת זה
עתה הטיפול בתרופה אחרת עליך לדוחה לרופא המטפל כדי למנוע
סיכון או אי-יעילות הנובעים מתגובה בין-תרופיות, במיחaud, לגבי
תרופות מהקבוצות הבאות: תרופות נגד דיכאון מקבוצת טריציקלינים
ומקבוצת MAOI (ובתוך 21 ימים מעתום השימוש בהם) GUANETHIDINE
וMETHYLDOPA, וחוסמי ביטא (ליתר לחץ דם וללב).

תופעות לוואי: בנוסף לפעולות הרציה של התרופה, בזמן השימוש
עלולות להופיע השפעות לוואי כגון: כאב ראש, ריגשות העיניים לאור
ועקצוץ בעיניים. אם התופעות הנ"ל מתמשכות או/ו מתרידות יש
לפנות לרופא.

תופעות המחייבות התיחסות מיוחדת: סימנים של ספיגה סיסטמי-
רע, דפיקות לב מואצות, הפרעות בקצב הלב, כאב עיניים, הזעת
יתר, גירוי, פריחה או דלקת מקומיים (שלא היו קיימים לפני השימוש
בתכשיר) הפסיק הטיפול ונפה לרופא.