



اتروسبان قطرات معقمة للعين

اعراض جانبية:

اضافة الى فعالية الدواء المرغوب بها فقد تظهر اثناء استعمال الدواء اعراض جانبية مثل: تشويش الرؤية او حساسية العين للضوء(راجع فقرة "خذيرات" المذكورة آنفأ). اذا استمرت هذه الاعراض اكثر من 14 يوم بعد الانتهاء من العلاج فعليك مراجعة الطبيب.

ظواهر تلزم تصريفاً خاصاً:

في حالة الحساسية او التهاب في العين توقف عن الدواء وتوجه للطبيب. اعراض تتبع من كمية زائدة وتشهد على تشرب الجسم: جفاف في الفم والبشرة. حساسية في الجلد. عطش زائد. ضعف زائد في الجسم. بطء منتفخ لدى الاطفال. احمرار الوجه. توقف عن تناول الدواء وتوجه فوراً للطبيب. في كل حالة تشعر فيها باعراض لم تذكر في الكراستة او تغير شعورك العام. عليك استشارة الطبيب فوراً.

الجرعة: حسب تعليمات الطبيب فقط. يحظرتجاوز الجرعة الموصى بها. اذا استعملت كمية اكبر يجب غسل العينين جيداً بالماء والتوجه للطبيب. انتبه - لا للبلع! هذا الدواء يستعمل خارجياً فقط.

طريقة الاستعمال:

اغسل يديك جيداً احن رأسك الى الخلف او استلقي على الفراش وبواسطة اصبعك ابعد الجفن الاسفل عن العين قليلاً وفي الفراغ الذي نتج انقطع الدواء واغمض عينيك خلال دقيقة الى دقيقتين. لا ترمي. لمنع تلوث المحلول احرص ان لا تلامس فتحة القنينة اي جسم آخر بما في ذلك الاصبع والعين. اغلق القنينة جيداً. لا تستعمل هذا الدواء اكثر من شهر بعد فتح القنينة للمرة الاولى.

امتنع التسمم: هذا الدواء وكل دواء آخر يجب حفظه في مكان مغلق بعيداً عن متناول الاطفال و/او الرضع لمنع التسمم. اذا استعملت كمية زائدة او بالخطأ بلع طفل كمية من الدواء توجه لغرفة الطوارئ في المستشفى واحضر معك علبة الدواء.

لا تسبب التقيؤ دون تعليمات واضحة من الطبيب.

هذا الدواء يعالج مرضك. قد يضر مريضاً آخر لا تعطي هذا الدواء لقاربك، جيرانك او اصدقائك. يحظر تناول الدواء في الظلام! راجع الملصقة والوجبة في كل مرة تستعمل فيها الدواء. ضع/ي نظارتك اذا كنت بحاجة لذلك.

المحفظ: حتى 25 درجة مئوية.

حتى وفق شروط التعبئة/الحفظ الموصى بها. تحفظ الادوية لفترة محددة فقط. يرجى الانتباه لموعد صلاحية المستحضر في كل حالة من الشك. عليك استشارة الصيدلي الذي قدم لك الدواء. يحظر حفظ عدة ادوية في تعبئة واحدة.

رقم التسجيل في وزارة الصحة: ١٠٦٤٠٢٣٥٢٠

فيشر مختبرات (١٩٧٥) م.ض. ص.ب. ٣٩٠٧١ تل ابيب ٦١٣٩٠

نشرة للمستهلك حسب انظمة الصيادلة (مستحضرات) لعام ١٩٨٦

هذا الدواء يستلزم وصفة طبية

طالع الكراس بتعمق حتى نهايته قبل استعمال الدواء

وزارة الصحة حددت شكل هذه النشرة. فحصت محتواها ووافقت عليه

تركيبة المادة الفعالة:

مواد غير فعالة:

الفعالية الطبية:

توسيع انسان العين

متى يحظر استعمال المستحضر؟

يحظر استعمال الدواء اذا كانت هناك حساسية لواحدة من مركبات الدواء.

يحظر استعمال الدواء اذا كنت تعاني/ن من الجلاوكوما.

يحظر استعمال الدواء دون استشارة الطبيب قبل بداية العلاج اذا كنت حاملاً او مريضة.

كيف يؤثر الدواء على حياتك اليومية؟

استعمال هذا الدواء قد يؤدي الى عدم وضوح الرؤية ولذلك يتوجب الحذر عند السياقة في السيارة. عند تشغيل ماكنات خطيرة وفي كل عمل يستلزم النظر السليم. بالنسبة للأولاد يجب خذيرهم من قيادة الدرجات الهوائية او اللعب بقرب الشارع وغير ذلك.

خذيرات:

اذا كنت تعاني/ن من حساسية لنوع من الاغذية عليك ابلاغ الطبيب بذلك قبل استعمال الدواء.

هذا المستحضر يحتوي على المادة الواقية بنزلكونيوم كلوريد التي يمكن ان تتصدأ العدسات اللاصقة اللينة. يحظر استعمال المستحضر حين استعمال للعدسات اللاصقة اللينة. يجب نزع العدسات قبل استعمال المستحضر ولا يمكن ارجاعها ثانية الا بعد مرور ما لا يقل عن ١٥ دقيقة من تنظير العين بالدواء يجب حماية العين من التعرض للضوء القوى ما دام الانسان متوضعاً. الاولاد الصغار ذوي الشعر الاسمر او العيون الزرقاء، اولاد يعانون من اصابة في الدماغ او شلل سبستي. مرض مع اعراض داون وكمبار السن . جميعهم اكثر حساسية للدواء ولذلك يجب الحرص على عدم تجاوز كمية الوصفة المسجلة لهذه المجموعات وتعقب الاعراض الجانبية الممكنة والمفصلة كالتالي. في الادوية التي توسيع الانسان يجب الحذر في حالات يكون الضغط داخل العين غير معروف. في عمليات قطع قوسية وفي اعين مع ميل لتضييق الزاوية بين القرنية والقوسية.

تفاعلات بين الادوية: اذا كنت تتناول/ين دواء اخر، او انتهيت لتوك من علاج بدوات آخر عليك ابلاغ الطبيب المعالج من اجل منع المخاطر او عدم فعالية تمنع من تفاعلات بين الادوية.