

اقرأ/ي النشرة بامان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء  
اقررت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحتهاها لشخص ورخص من قبلها

## النازه®

### قطرة وبخاخ للأنف

التركيب:

Phenylephrine HCl 0.25%  
Naphazoline HCl 0.05%  
Mepyramine Maleate 0.50%

كما يحتوي:

Sodium phosphate monobasic, sodium phosphate dibasic, sodium chloride, hydroxy propyl methyl cellulose, phosphoric acid, sodium metabisulphite, disodium edetate, methyl paraben, propyl paraben, benzalkonium chloride, purified water.

تأثيرات الدواء الطبية:

يقلص الأوعية الدموية في الأنف وبذلك يخفف من احتقان الأنف.

الاستطباب: للتخفيف من الإحتقان في الأنف الناتج عن الزكام، الرشح، التهاب الجيوب الأنفية، حمى العلف وأعراض اليرجية أخرى للمجاري التنفسية العلوية.

متى لا يجوز لك استعمال المستحضر؟

لا يجوز لك استعمال هذا المستحضر إذا وجدت لديك حساسية لأحد مركباته أو لمستحضرات مشابهة مستعملة لنفس الهدف.

لا يجوز لك استعمال هذا الدواء قبل مراجعة الطبيب مقدماً:

عندما تكونين في الثلث الأول/الأخير من الحمل أو في فترة الرضاعة.  
إذا كنت تعاني/ن أو إذا عانيت في الماضي من خلل في وظيفة العينين (كالجلوكوما)، القلب و/أو الأوعية الدموية - ضغط الدم العالي، فرط نشاط الغدة الدرقية، تضخم غدة الپروستات، السكري.

كيف سيؤثر هذا الدواء على سير أمورك اليومية؟

يحتوي المستحضر على مادة مضادة للأيرجيا، ذات تأثير قد يسبب التهاب، لذا اذا شعر المريض بنعاس، عليه الامتناع عن قيادة المركبات.

تحذيرات:

لا يجوز لك استعمال هذا الدواء في فترات متقاربة أو لفترة طويلة بدون استشارة الطبيب. إن الاستعمال المتكرر والطويل الأمد قد يسبب التضرر المخاطي الأنفي. يجب ابلاغ الطبيب عن أي حساسية لديك ل الطعام أو عقاقير قبل استعمالك للدواء.

التفاعلات بين الأدوية:

إذا كنت تتعاطي/ن دواءً أضافياً أو إذا أنهيت العلاج الآن بدواء آخر، فيجب إعلام الطبيب المعالج، وذلك لتقدير الأخطار أو عدم التجاوز الناتجة عن التفاعلات بين العقاقير، خاصة الأدوية التي تنتهي إلى المجموعات التالية: مضادات الاكتئاب النفسية (من فصيلة الثلاثية الدورة أو مثبطات مونوآمينو أوكسيداز)، مخفضات ضغط الدم (كالبيتيل دوبا، چوانينيدين، غونادرين).

الأعراض الجانبية:

إضافة إلى التأثيرات الطبية المرغوبة للدواء، فقد تظهر أثناء فترة استعماله بعض الأعراض الجانبية كالحرقة، جفاف، تهيج أو وخذ في داخل الأنف، عطاس. تتحقق هذه الأعراض عادة خلال فترة قصيرة بعد أن يعتاد الجسم على الدواء أما إذا استمرت أو إذا كانت مزعجة بشكل خاص، يجب مراجعة الطبيب.

الأعراض الجانبية التي تقتضي اهتماماً خاصاً:  
تكرر الإحتقان مجدداً.

اشارات تدل على امتصاص الدواء الى داخل الجسم: خفقان قلب سريعة وغير منتظمة، صداع أو دوران، عصبية، ارتجاف، اضطرابات في النوم (نادرًا): توقف/ي عن العلاج وراجع/ي الطبيب.

أما اذا ظهرت لديك اعراض جانبية لم تذكر في هذه النشرة، أو اذا طرأ اي تغير على شعورك العام، عليك عندئذ مراجعة الطبيب حالاً.

المقادير الدوائية الاعتيادية في حالة عدم وجود تعليمات أخرى من الطبيب:

بغ/ي أو نقط/ي من الدواء مرتين في كل منخر كل ٦-٢ ساعات (أنظر/ي إلى فقرة تعليمات الاستعمال).

لا تتجاوز/ي المقادير الموصى بها.  
هذا الدواء غير موصى به بدون تعليمات من الطبيب لدى الرضع والأطفال دون ٢ سنة من العمر. يجب التوقف عن العلاج بالدواء ومراجعة الطبيب اذا لم يطرأ تحسن على حالتك الصحية خلال ٣ أيام.

لا يجوز استعمال المستحضر لفترة تزيد عن ٣-٥ أيام بشكل متواصل.

انتبه/ي!  
هذا الدواء ليس للبلع! هذا الدواء مخصوص للاستعمال الخارجي فقط.

ارشادات الاستعمال:  
قطرة للأنف: نظف/ي القسم الداخلي من الأنف بلفظ. ميل/ي رأسك الى الوراء أو استلق/ي على فراش. نقط/ي من الدواء في كل منخر مع الاستمرار بإحكام الرأس خلال عدة دقائق وذلك لتأمين انتشار الدواء في تجويف الأنف.

قبل أن تغطس/ي القطارة ثانية في محلول نظف/ي القطارة جيداً بالماء الساخن ونشف/ي بمنشفة ورقية نظيفة. إغلق/ي القنية بإحكام.

بخاخ للأنف: نظف/ي القسم الداخلي من الأنف بلفظ. بخ/ي من الدواء في كل منخر بالتناوب وراسك متتصباً (مع سد المنخر الثاني بالأصبع) وذلك على الشكل التالي: استنشق/ي على شكل شمات قصيرة من خلال إجراء كبستين سريعين وقوتين على مكبس القنية. انتظر/ي ٣-٥ دقائق.

نظف/ي الأنف بلفظ ثانية وكرر/ي العمل إذا لزم الأمر.

بيانهاء الاستعمال: نشف/ي فوهة القنية بمساحة رطبة وجفف/ي بواسطة منديل من الورق النظيف. إغلق/ي القنية بإحكام.

منع انتشار التلوث - لا تستعمل/ي ذات القنية لأكثر من شخص واحد.

تجنب/ي التسمم: يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتقادري اصابتهم بالتسمم. اذا افترطت في استعمال المقادير الدوائية او اذا بلع الطفل/ة خطأ من هذا الدواء، عليك التوجه الى المستشفى حالاً مصطحبًاه بعينه.

لا تسبب/ي التقيؤ بدون تعليمات صريحه من الطبيب!

لا تتناول/ي الدواء في العتمة: يجب تشخيص طابع الدواء والتاكيد من المقادير الدوائية في كل مرة تتناول/ين فيها دواء.

ضرع/ي النظارات الطبية اذا لزم الأمر ذلك.

التخزين: في مكان بارد دون ٢٥ درجة مئوية.

تبقي الأدوية صالحة لفترات محدودة فقط، حتى ولو ظلت في علبتها الأصلية وتم حفظها بموجب تعليمات الخزن. الرجاء ملاحظة تاريخ انتهاء صلاحية المستحضر المدونة على العبوة. في حالة الشك! عليك استشارة الصيدلي الذي صرف لك هذا الدواء. لا يجوز تخزين ادوية مختلفة في نفس العبوة.

رقم سجل الدواء: ٢١٢١٢ - ٢٢٢٨ - ٢٢٢٩ - ٢١٧٨٣ - ٢٢٢٩.

المنتج: تارو للصناعة الدوائية م.ض.. / ص.ب. / ١٠٣٤٧ / خليج حيفا ٢٦١١٠