

ازولين® قطرات للعينين

ظواهر تلزم تصرفاً خاصاً:

إذا حدث تغيير في الرؤية، أو إذا عانيت آلام في العين، احمرار، تهيج في العينين أو في حالات نادرة شعرت بالحم في الرأس فعليك إيقاف العلاج والتوجه فوراً إلى الطبيب. في كل حالة تشعر فيها بأعراض جانبية لم تذكر في النشرة أو إذا حدث تغيير في شعورك العام، استشر الطبيب فوراً.

الوجبات:

كمية الوجبات المقبولة في حالة عدم وجود تعليمات من طبيب: ١ - ٢ نقطة ثلاث مرات يومياً. كمية الجرعة للأطفال - بالنسبة للاستعمال للأطفال تحت سن السادسة يجب استشارة الطبيب. إذا لم يحدث تغيير خلال ٣ أيام يجب إيقاف العلاج والتوجه إلى الطبيب.

انتبه:

لا تبلع! هذا الدواء معد للاستعمال الخارجي فقط.
طريقة الاستعمال:

اغسل يديك جيداً إحد رأسك إلى الخلف أو استلق على الفراش وبواسطة اصبعك ابعده الجفن الأسفل عن العين قليلاً وفي الفراغ الذي نتج انقط الدواء واغمض عينيك خلال دقيقة إلى دقيقتين. لا ترمش. إذا اعتقدت بأن النقطة لم تستوعب استعمال نقطة أخرى. نظف باقي السائل الموجود على جانب العين بواسطة قطعة قماش لمنع تلوث المحلول: احرص ان لا تلامس فتحة القنينة أي جسم آخر بما في ذلك الأصبع والعين. اغلق القنينة جيداً. بعد فتح القنينة للمرة الأولى.

كيف تستطيع/ين المساعدة لأجّاح العلاج:

عليك اكمال العلاج الموصى به من قبل الطبيب. حتى لو حدث تحسن في وضعك الصحي لا تنقطع عن استعمال الدواء دون استشارة الطبيب. **امنع التسمم!**

يجب حفظ هذا الدواء واي دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول ايدي الاولاد و/او الاطفال وبهذا تمنع خطر التسمم.

إذا تناولت وجبة زائدة أو بلع احد الاولاد من الدواء توجه رأساً إلى غرفة الاستقبال في المستشفى وخذ علبة الدواء معك... لا تحاول التقيؤ دون تعليمات واضحة من الطبيب.

لا تناول هذا الدواء في الظلام، افحص اللصقة والجرعة في كل مرة تستعمل الدواء. ضع النظارات إذا كنت بحاجة لذلك.

الحفظ:

حتى 25 درجة مئوية. لا جمدتها. اغلق جيداً وامنع تسرب الهواء والرطوبة. لا تستعمل الدواء لمدة اكثر من شهر بعد فتح القنينة لأول مرة. وحتى حسب ظروف الرزم/التخزين الموصى بها فان الادوية تحفظ لمدة محدودة فقط. انتبه لتاريخ صلاحية الدواء. في حالات الشك عليك استشارة الصيدلي الذي زدك بالدواء. لا تحفظ ادوية مختلفة في نفس العلبة.

رقم التسجيل في وزارة الصحة: ١٠٦٩٨٢٣٨٩٢

فيشر مختبرات (١٩٧٥) م.ض. ص.ب. ٣٩٠٧١ تل ابيب ٦١٣٩٠

نشرة للمستهلك حسب انظمة الصيادلة (مستحضرات) لعام ١٩٨٦
اقرأ النشرة بتمعن حتى آخرها قبل استعمال الدواء
وزارة الصحة حددت شكل هذه النشرة، فحصت محتواها ووافقت عليه

تركيبة المادة الفعالة وتركيزها:

Tetrahydrozoline HCL 0,05%

مركبات غير فعالة:

Purified Water, Povidone, Boric Acid, Sodium Chloride, Disodium EDTA, Benzalkonium Chloride, Borax

الفعالية الطبية: تخفيف تهيجات خفيفة في العينين التي تسببها مواد مختلفة مثل: الدخان، الغبار، النباتات وما شابه.
لا يستخدم هذا المستحضر لعلاج التهاب تلوث العينين
متى يحظر استعمال المستحضر؟

لا يستعمل حال وجود حساسية لاحد مركبات الدواء. لا تستعمل هذا الدواء اذا تغير لون المحلول او اذا تعكر.

لا تستعمل/ي هذا الدواء دون استشارة الطبيب قبل البدء بالعلاج اذا كنت حاملاً في الثلث الاول/ الاخير او مرضعاً. اذا كنت تعاني/ن او عانيت في الماضي من خلل في عمل القلب و/ او ارتفاع في ضغط الدم و/او جلوكوما.
تحذيرات:

يجب عدم استعمال هذا الدواء في اوقات متقاربة او لفترة طويلة دون استشارة الطبيب.

هذا المستحضر يحتوي على المادة الواقية بنزلكونيوم كلوريد التي يمكن أن تمتصها العدسات اللاصقة اللينة.

يحظر استعمال المستحضر حين استعمال العدسات اللينة. يجب نزع العدسات قبل استعمال المستحضر ولا يمكن إرجاعها ثانية الا بعد مرور ما لا يقل عن ١٥ دقيقة من تطهير العين بالدواء.

تفاعلات بين الادوية:

إذا كنت تتناول/ين دواء آخر او انتهيت الان من العلاج بدواء اخر عليك ابلاغ الطبيب المعالج وذلك لتفادي الاخطار او عدم النجاعة الناتجة عن تفاعلات بين الادوية.

اعراض جانبية:

بالاضافة الى الفعالية المرغوبة عند استعمال الدواء، قد تظهر اعراض جانبية.