



אזולין®

טיפול עיניים סטריליות

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו 1986
קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.
פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על ידו.

מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מרופא: 1-2 טיפות 3 פעמים ביום. מינון לילדים - בשימוש בילדים מתחת לגיל 6 יש להיוועץ ברופא. אם לא חל שיפור במצבך תוך 3 ימים יש להפסיק הטיפול ולפנות לרופא.

שים לב - לא לבלוע! תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד. **אופן השימוש:** רחץ היטב ידך, הטה ראשך לאחור או שכב על המיטה. בעזרת האצבע הרחק מעט את העפעף התחתון מן העין. לתוך המרווח שיווצר טפטף את התרופה ועצום העיניים למשך 1-2 דקות. אל תעפעף. אם הינך חושב(ת) שהטיפה לא נקלטה השתמש(י) בעוד טיפה. את שאר התמיסה שמסביב לעין נקה עם מגבון. למניעת זיהום התמיסה הקפד שקצה הבקבוק לא יבוא במגע עם משטח כלשהו כולל האצבע או העין וסגור את הבקבוק היטב.

כיצד תוכלי לסייע להצלחת הטיפול? עליך להשלים את הטיפול שהומלץ ע"י הרופא. גם אם חל שיפור במצב בריאותך אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התיעצות עם רופא.

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות וע"י כך תמנע הרעלה. אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אל תגרום להקאה - ללא הוראה מפורשת של רופא!
אין ליטול תרופות בחושך! בדק(י) התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל(ת) תרופה. הרכב(י) משקפיים אם הנך זקוק(ה) להם.

אחסנה: עד 25°C. לא להקפיא. סגור היטב ומנע חדירת אויר ורטיבות. אין להשתמש בתרופה יותר מחודש לאחר פתיחת הבקבוק לראשונה. גם לפי תנאי אריזה/אחסנה המומלצים תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר. בכל מקרה של ספק עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה. אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

מס. רישום: 1069823892
פישר מעבדות פרמצבטיות (1975) בע"מ ת.ד. 39071, ת"א 61390

הרכב:

החומר הפעיל וריכוזו: Tetrahydrozoline HCL 0.05%.
מרכיבים בלתי פעילים: Purified Water, Povidone, Boric Acid, Sodium Chloride, Disodium EDTA, Benzalkonium Chloride, Borax

פעילות רפואית: הקלה בגירויים קלים של העיניים הנגרמים מחומרים שונים כגון: עשן, אבק, צמחים וכד'.
התכשיר אינו משמש לטיפול בדלקת זיהומית של העין.

מתי אין להשתמש בתכשיר?

אין להשתמש אם ידועה רגישות לאחד ממרכיבי התרופה. אין להשתמש אם התמיסה שינתה את צבעה או נהייתה עכורה.

אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני תחילת הטיפול, אם הינך בהריון שליש ראשון/אחרון או מניקה. אם הינך סובל/ת או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד הלב ו/או יתר לחץ דם ו/או גלאוקומה.

אזהרות: אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או תקופה ממושכת בלי להיוועץ ברופא. התכשיר מכיל חומר משמר בנזלקוניום כלוריד, העלול להיספג על-ידי עדשות מגע רכות. אין להשתמש בתכשיר זה כאשר את/ה מרכיב/ה עדשות מגע רכות. יש להסיר העדשות לפני השימוש בתכשיר, וניתן להחזירן כעבור לא פחות מ-15 דקות מהזלפת התרופה לעין.

תגובות בין תרופתיות: אם הנך נוטל(ת) תרופה נוספת או אם גמרת זה עתה טיפול בתרופה אחרת עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי יעילות הנובעים מתגובות בין תרופתיות.

תופעות לוואי: בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה בזמן השימוש בה עלולות להופיע השפעות לוואי.

תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת: אם חל שינוי בראיה, או אם הינך סובל/ת מכאבים בעין, אדמומיות, גירוי עיניים או במקרים נדירים כאבי ראש, הפסק את הטיפול ופנה לרופא מיד. בכל מקרה שבו הינך מרגיש(ה) תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה, או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית עליך להתיעץ עם הרופא מיד.