



קלורקטם® וטרינרי

Clorketam® Veterinary

תמיסה להזרקה - הרדמה כללית

הרכב:

Ketamine (as Hydrochloride) 10%

כל מיל מכיל 100 מ"ג קטאמין.
לשימוש בכלבים, חתולים וחיות מעבדה להזרקה תוך שרירית או תוך ורידית.

התוויות:

ריסון-סדציה (טשטוש).

הרדמה כללית במקרים הבאים:

- ניתוחים קלים וקצרים
- ניתוחי חירום - גם בנקבות הרות
- בניתוחי מילדות, לאחר כר-מדיקציה

מינון:

אין הכרח בצום, אבל אם מתוכנן ניתוח יש להפסיק מתן מזון 6 שעות קודם להזרקה התכשיר. התנובה הספציפית לתרופה תלויה במנה שניתנה, בגיל החיה ובמצבה הבריאותי.

בכלבים וחתולים:

0.5 ml - 0.8 ml - 10 ק"ג משקל גוף (5-8 מ"מ/ק"ג) בהזרקה תוך ורידית
1 ml - 2 ml - 10 ק"ג משקל גוף (10-20 מ"מ/ק"ג) בהזרקה תוך שרירית

בחיות מעבדה:

בממוצע 10 מ"ג (0.1 מ"ל/ק"ג משקל גוף) בהזרקה תוך ורידית
100-200 מ"ג (1-2 מ"ל/ק"ג משקל גוף) בהזרקה תוך שרירית
תרופות שניתנות מראש לפני השימוש בקלורקטם יכולות להיות:
5-7 דקות בהזרקה IM ופחות מדקה אחת בהזרקה IV. ניתן לדלל את קלורקטם בסרום עם 5% גלקוז ולתת בטפטוף מתמשך במהלך ניתוחים ארוכים

התוויות נגד:

- רגישות לאחד ממרכיבי התרופה.
- לחץ דם נמוך.
- כשל לבני או נשימת, ליקויים במערכת הנשימה והלב.
- כשל כבדי או כליתי.
- בניתוחי עיניים
- לא להשתמש בחיות המטופלות כחומרים המכילים זרחן אורגני (אם החיה לבשת קולר נגד פרעושים אין צורך להיזהר בשימוש).

שימוש בזמן הריון והנקה:

אין נתונים, לכן השימוש אינו מומלץ.

תגובות בין תרופתיות:

ניתן להשתמש בקלורקטם בשילוב עם חומרי הרדמה אחרים כגון ברכיסורטים ומרדמים נדיפים. במקרה זה יש לנהוג במשנה זהירות במשך הזמן עד להתאוששות מההרדמה

מנת יתר:

במקרה של דיכוי הנשימה, מומלץ על הנשמה מתאימה, עם חמצן או אויר בטמפרטורת החדר.

אזהרות:

- קושי בשליטה בדימום עלול להופיע עקב לחץ דם גבוה המופיע בזמן השימוש בתרופה. על החיה להחלים באזור שקט אין לחר את התאוששות החיה ובמגע או בקולו אך יש לדבוק סימנים חיוניים.
- עווית (Clonus) ואקטיסציה אפשריים במהלך ההתאוששות.
- מומלץ שילוב של קטאמין עם תרופות משככות כאב אחרות בעלות זמן השפעה לכחות כמו של קטאמין
- בשילוב עם תרופות הניתנות לפני האלחוש או תרופות מאלחשות אחרות יש להעריך סיכונים פוטנציאליים מול תועלת ולקחת בחשבון את הרכב התרופות והמנות שלהן, וכן את סוג הטיפול ואת קבוצת ASA אליה משתייכת החיה. המנה המומלצת עלולה להשתנות בהתאם לתרופות המאלחשות בהן משתמשים בשילוב.
- לפני מתן תרופה אנטיכולרגית כגון אטרופין לשליטה על תופעות לוואי ובייחוד על הפרשת רוק מוגברת יש לשקול את הסיכון האפשרי מול יעילות הטיפול.
- ירידה בחום הגוף עלולה להופיע בשימוש משולב עם הלסן (Halothane).
- יש להגן על עיני החיה המטופלת במשך זמן ההרדמה.

תופעות לוואי:

בחיות מורדמות, בעיקר לפני ואחרי שלב ההתאוששות, הפרעות לבביות נשימתיות (דום לב, לחץ דם נמוך, דום נשימה, נשימה איטית, בצקת ריאתית) עם או בלי הפרעות ניירולוגיות (כגון: התכווצויות, רעד) והפרעות סיסטמיות (הפרשת רוק מוגברת, כעיה באישונים) נצפו במקרים נדירים.

אין להשתמש בחיות המיועדות למאכל או לשימוש כמוצריהן ע"י בני אדם.

אחסון:

- מתחת ל- 25 מעלות צלזיוס.
- הרחק מהישג ידם של ילדים.
- השתמש באמצעי זהירות על מנת לא להיחשף לתרופה.

היצרן:

Vétoquinol, Lure, France

בעל הרישום:

אליעזר לינביץ בע"מ ת.ד. 2920, אבן יהודה.

מספר הרישום:

08243922000

אריות:

בקבוק 10 מ"ל

פרנחס עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות
(וחוננו בדפוס ואושר על ידי ב- 10.2012)

LE01250

לשימוש וטרינרי בלבד!

ר חייב מרשם רופא
P PRESCRIPTION ONLY MEDICINE
T-U

434711 0313 A