

دكسفرين[®] قطرات معقمة للعيون

تفاعلات مع ادوية اخرى: اذا كنت تتناول دواء اخر او انتهيت لتوك من اخذ دواء اخر يجب اعلام الطبيب بذلك من اجل منع المخاطر او عدم تجاعة الدواء بسبب ردود فعل ما بين الادوية.

عوارض جانبية: بالاضافة للفعالية المطلوبة من الدواء قد تظهر خلال استعمال الدواء عوارض جانبية مثل تشويش في الرؤية وفي حالات نادرة مثل تلوث في العين والم في العيم واحمرار. يجب الاستمرار في العلاج والتوجه للطبيب. في حالات شعورك بعوارض جانبية لم تذكر هنا او تغير شعورك العام. اجل مراجعة الطبيب فوراً. **الجرعة:** يحظر اخذ اكثر من الكمية المذكورة وهي قطرتان اربع مرات يومياً او حسب تعليمات الطبيب.

اذا لم يطرأ تحسن على وضعك خلال سبعة ايام توجه للطبيب. يجب استعمال الدواء في اوقات محددة كما يحددها الطبيب المعالج. اذا نسيت اخذ الدواء في الوقت المحدد. خذه عندما تتذكر وذلك ولكن اخذ جرعتين معاً. **انتبه - يحظر البلع!** هذا الدواء معد للاستعمال الخارجي فقط. **طريقة الاستعمال:** قطرة - اغسل يدك جيداً. ارجع رأسك الى الوراء او استلق على السرير. وباصبعك ابعده بلطف الجفن السفلي عن العين. وقم بتقطير الدواء داخل البعد بين الجفن والعين واغمض عينيك لمدة 1-2 دقيقة ولا ترمش. اذا شعرت ان القطرة لم تدخل العين استعمال قطرة اخرى. وقم بتجفيف ما يسيل على جانبي العين بمنشفة. من اجل منع التوت لا تجعل فوهة الانبوبة تلامس اي جسم بما في ذلك الاصبع او العين واغلق القنينة جيداً.

بعد الاستعمال قم بتجفيف طرف الانبوبة بنشافة ورق نظيفة واغلق الانبوبة جيداً. **امنع التسمم:** يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء اخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول ايدي الاطفال او الاولاد/او الاطفال وبذلك تمنع خطر التسمم. اذا تناولت جرعة زائدة من الدواء او قام ولد بابتلاع الدواء عن طريق الخطأ توجه للمستشفى ومعك علبة الدواء.

لا تؤد الى التقيؤ دون تعليمات واضحة من الطبيب. لا تتناول الدواء في الظلام! افحص اللصقة والجرعة في كل مرة تأخذ فيها الدواء. ضع نظارتك اذن كنت بحاجة لذلك.

هذا الدواء مسجل كعلاج لمرضك: قد يضر مريضاً اخرًا. لا تعط هذا الدواء لاقاربك او جيرانك او معارفك.

الحفظ: احفظ الدواء في مكان بارد ومظلم. يحظر تجميده. اغلقه جيداً وامنع تسلل الهواء او الرطوبة. يحظر استعمال الدواء بعد اكثر من شهر من فتح القنينة او مرة. وفقاً لتعليمات والحفظ الموصى بها يتم حفظ الدواء لفترات محددة فقط. يجب الانتباه لموعده انتهاء مفعول المادة. في كل حالة عدم تأكد قم باستشارة الصيدلي الذي زدك بالدواء. يحظر حفظ ادوية مختلفة في نفس العلبة.

رقم تسجيل الدواء: ٥١٢٠٢٤١٦٥ قطرات

فيشر مختبرات (١٩٧٥) م.ض. ص.ب. ٣٩٠٧١ تل ابيب ٦١٣٩٠

نشرة للمستهلك حسب انظمة الصيدالة (مستحضرات) ١٩٨١

هذا الدواء يستلزم وصفة طبية

اقرأ النشرة بامعان حتى اخرها قبل استعمال الدواء

وزارة الصحة حددت شكل هذه النشرة. فحصت محتواها ووافقت عليه

تركيبة المواد الفعالة والمركزة:

Dexamethasone Sodium Phosphate 0.1%, Neomycin Sulfate 0.5%
Phenylephrine HCl 0.12%

مواد غير فعالة:

Benzalkonium Chloride, Boric acid, Disodium Edetate, Povidone,
Purified Water, Sodium Citrate

الفعالية الطبية:

لعلاج التهاب العين عند احتمال اصابها بتلوث بكتيريا ثانوي.

متى يحظر استعمال المستحضر؟

يحظر استعمال الدواء اذا كانت هنالك حساسية لاحدى مركبات الدواء. عندما تكون مصاب بالهيريس سيمبلكس كربتيتس. امراض فطريات في العين. امراض فيروس في العين او اصابة السل في العين وبعد ازالة جسم غريب من العين دون ان يؤدي الى مضاعفات زائدة.

يجب استشارة الطبيب قبل بدء العلاج في حالات ضغط عال داخل العين

(جلاوكما) اصابة في عصب العين. اصابة في البصر او في بعض حالات

كاتراكت او اي تلوث اخر في العين وكذلك في حالات السكري او اذا ما كنت

حاملاً او مرضعة.

تحذيرات:

الاستعمال المتواصل قد يؤدي الى تلوث في الكرنية من جراء تلوث بالفطريات.

يحظر استعمال الدواء لفترات متقاربة او لفترة متواصلة دون استشارة

الطبيب. اذا كان العلاج متواصلاً يجب اجراء فحوصات للضغط الداخلي في

العين خلال فترة العلاج.

هذا المستحضر يحتوي على المادة الواقية بنزلكونيوم كلوريد التي يمكن ان

تمتصها العدسات اللاصقة اللينة. يحظر استعمال المستحضر حين

استعمالك للعدسات اللاصقة اللينة. يجب نزع العدسات قبل استعمال

المستحضر ولا يمكن ارجاعها ثانية الا بعد مرور ما لا يقل عن ١٥ دقيقة من

تقطير العين بالدواء.

في حالة استمرار العلاج يجب اعلام الطبيب اذا ما كان المريض يعاني او عانى

في الماضي من ضرر في السمع او عمل الكليتين.