



דקסאפרין® טיפול עיניים סטריליות

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו 1986
תרופה זו חייבת במרשם רופא
קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.
פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על ידו.

בטיפול ופנה לרופא. בכל מקרה שבו הינך מרגיש/ה תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה, או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית עליך להתייעץ עם הרופא מיד.

מינון: אין לעבור על המנה המומלצת - 2 טיפות 4 פעמים ביום או לפי הוראות הרופא.
אם לא חל שיפור במצבך תוך 7 ימים יש לפנות לרופא. יש להשתמש בתרופה זו בזמנים קצובים כפי שנקבע ע"י הרופא המטפל.
אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן קצוב יש ליטול מנה מיד כשנזכרת אך בשום אופן אין ליטול שתי מנות ביחד!

שים לב - לא לבלוע! תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.
אופן השימוש: רחץ היטב את ידיך, הטה ראשך לאחור או שכב על המיטה ובעזרת האצבע הרחק מעט את העפעף התחתון מן העין. לתוך המרווח שיווצר טפטף את התרופה, עצום העיניים למשך 1-2 דקות. אל תעפעף. אם הנך חושב שהטיפול לא נקלטה, השתמש בעוד טיפה. את שאר התמיסה שמסביב לעין נקה עם מגבון. למניעת זיהום התמיסה הקפד שקצה הבקבוק לא יבוא במגע עם משטח כלשהו כולל האצבע או העין וסגור את הבקבוק היטב.

מנע הרעלה! - תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה פנה מיד לחדר מיון של בית-חולים והבא איתך את אריזת התרופה.
אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא!

אין ליטול תרופות בחושך! בדק/י התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל/ת תרופה. הרכב/י משקפיים אם הינך זקוק/ה להם.
תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך, בחולה אחר/ת היא עלולה להזיק. אל תיתן תרופה זו לקרוביך, שכניך או מכריך.

אחסנה: במקרה לא להקפיא. סגור היטב ומנע חדירת אויר ורטיבות. אין להשתמש בתרופה זו יותר מחודש לאחר פתיחת הבקבוק לראשונה. גם לפי תנאי האריזה/אחסנה המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר! בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה. אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

מספר רישום התרופה: 512024165
פישר מעבדות פרמצבטיות (1975) בע"מ ת.ד. 39071, ת"א 61390

הרכב:

חומרים פעילים וריכוזם:

Dexamethasone Sodium Phosphate 0.1%, Neomycin Sulfate 0.5%, Phenylephrine HCl 0.12%.

חומרים לא פעילים:

Benzalkonium Chloride, Boric acid, Disodium Edetate, Povidone, Purified Water, Sodium Citrate.

פעילות רפואית: לטיפול בדלקות העין המלוות בזיהום בקטריאלי משני.

מתי אין להשתמש בתכשיר?

אין להשתמש אם ידועה רגישות לאחד ממרכיבי התרופה. כאשר הנך סובל מהרפס סימפלקס קרטיסיס, מחלות פיטריטיות בעין, מחלות וירליות בעין, שחפת של העין ולאחר סילוק גוף זר מהעין שלא גרם לסיבוב יתר.

יש להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול במקרים של לחץ תוך עיני גבוה (גלאוקומה), פגיעה בעצב ראייה, פגם בראייה ובמקרים של קטרקט או זיהום כלשהו בעין וכן במקרים של סכרת או אם הנך בהריון או מניקה.

אזהרות: שימוש ממושך עלול לגרום לזיהום בקרנית הנובע מזיהום פטריתי. אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או תקופה ממושכת בלי להיוועץ ברופא. אם הטיפול ממושך יש לערוך בתקופת הטיפול בדיקות לחץ תוך עיני. התכשיר מכיל חומר משמר בנזלקוניום כלוריד, העלול להיספג על-ידי עדשות מגע רכות. אין להשתמש בתכשיר זה כאשר את/ה מרכיב/ה עדשות מגע רכות. יש להסיר העדשות לפני השימוש בתכשיר, וניתן להחזירן כעבור לא פחות מ-15 דקות מהזלפת התרופה לעין. במקרה והטיפול ממושך יש להודיע לרופא אם החולה סובל/ת או סבל/ה מליקוי שמיעה או מליקוי בתפקוד כליות.

תגובות בין תרופתיות: אם הינך נוטל/ת תרופה נוספת, או גמרת זה עתה הטיפול בתרופה אחרת עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי-יעילות הנובעים מתגובות בין תרופתיות.

תופעות לוואי: בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה, בזמן השימוש עלולות להופיע השפעות לוואי כגון: טשטוש ראייה. במקרים נדירים של זיהומים שונים בעין, כאבי עיניים, עקצוץ ואדמומיות המשך