

كلاريتون[®] قطرة/محلول معقم لغسل العين

الجرعة المستعملة:

الكمية المعتادة إذا لم يكن هناك تعليمات أخرى من الطبيب.
1-2 قطرة 3 مرات في اليوم. يحظر تجاوز الكمية الموصى بها. لاستعمالات أخرى لهذا الدواء اقرأ عنها تحت عنوان "طريقة الإستعمال".
انتبه! ليس للبلع! هذا الدواء معد للاستعمال الخارجي فقط.
طريقة الاستعمال:

قطرة للعين: اغسل يديك جيداً. ميل رأسك الى الخلف أو استلق على الفراش وبواسطة إصبعك أبعده الجفن الأسفل عن العين قليلاً وفي الفراغ الذي نتج أنقط الدواء وأغمض عينيك لمدة 1-2 دقيقة. لا ترمش.

إذا اعتقدت أن القطرة لم تستوعبها العين اقطري قطرة إضافية وإمسح المحلول الزائد حول العين بمنديل من الورق.

ضمادة للعين: قم بترطيب قطعتين من الشاش المعقم (الخاصة للعيون) بمحلول الكلاريتون واستلق على الظهر وضعي على كل عين قطعة من الشاش المشبع بالكلاريتون لمدة 5 دقائق.
غسل العين: قطر ببطء بعض القطرات لإزالة أي جسم غريب في العين. نشف المحلول الزائد بمنديل من الورق.

لستعملى العدسات اللينة: إستعملى محلول الكلاريتون كل مساء بعد إزالة العدسات من العين.
ملاحظة: للمحافظة على المحلول بوضعه المعقم إحرص ان لا تلمس فتحة القنينة او غطاءها أي جسم أخرجها في ذلك الاصبع أو العين. أغلق القنينة جيداً بعد الإستعمال.

لا تستعمل الدواء اكثر من شهر بعد فتح القنينة للمرة الاولى.

امنع التسمم!

يجب حفظ هذا الدواء واي دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول ايدي الاطفال وبهذا تمنع خطر التسمم.

إذا بلع احد الاطفال من الدواء بالخطأ توجه رأساً الى غرفة الاستقبال في المستشفى وخذ علبة الدواء معك. لا تحاول التقيؤ دون تعليمات واضحة من الطبيب.

لا تتناول هذا الدواء في الظلام. افحص المصفاة والجرعة في كل مرة تستعمل الدواء. ضع النظارات اذا كنت بحاجة لذلك.

التخزين:

حتى 25 درجة مئوية.

الأدوية تستعمل لفترة محدودة فقط حتى ولو إتبعنا شروط التغليف/الخنز الموصى بها. انتبه لتاريخ نهاية صلاحية الدواء. في حالة الشك عليك استشارة الصيدلى الذى زدك الدواء. لا تحفظ أدوية مختلفة في نفس العلبة.

رقم تسجيل الدواء: 00-22082-20-33

فيشر مختبرات (1975) م.ض. ص.ب. 39071 تل ابيب 61390

نشرة للمستهلك حسب انظمة الصيدالة (مستحضرات) لعام 1986
إقرأ/ى بإمعان النشرة حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء
وزارة الصحة حددت شكل هذه النشرة. فحصت محتواها ووافقت عليه

المادة الفعالة وتركيزها:

Benzalkonium Chloride 0.01%

المواد غير الفعالة:

Purified Water, Glycerin, Boric Acid, Borax, PVP, Disodium EDTA, Igepal 630, Igepal CA 897.

هذا الدواء معد:

لغسل وتهذنة العين من الحساسية الخفيفة التي تسبب من عوامل مختلفة مثل الغبار. الشمس. الدخان. النباتات والى آخره. وكذلك للاستعاف الأولي لإخراج أي جسم غريب من العين. بعد غسل العين المصابة يجب التوجه للطبيب. الدواء لا يستعمل لعلاج الإلتهاب التلوثي للعين.

متى يحظر استعمال المستحضر؟

يحظر استعمال المستحضر إذا كانت هنالك حساسية لواحد من مركبات الدواء.

تحذيرات:

إذا كانت لديك حساسية لغذاء او لدواء معين عليك إبلاغ الطبيب قبل تناول الدواء.
هذا المستحضر يحتوي على المادة الواقية بنزلكونيوم كلوريد التي يمكن أن تمتصها العدسات اللاصقة اللينة.

يحظر استعمال المستحضر حين استعمال العدسات اللينة. يجب نزع العدسات قبل استعمال المستحضر ولا يمكن إرجاعها ثانية الا بعد مرور ما لا يقل عن 15 دقيقة من تقطير العين بالدواء.

تفاعلات بين الادوية:

إذا كنت تتناول دواء آخر او انتهيت مؤخراً من تناول دواء آخر فعليك إبلاغ الطبيب المعالج بذلك لتفادي المخاطر أو فقدان النجاعة النابع من التفاعلات بين الأدوية.

اعراض مرافقة:

بالاضافة للفعالية المرغوب بها للدواء خلال الإستعمال قد تظهر أعراض جانبية.

ظواهر تلزم تصرفاً خاصاً:

إذا طرأ تغيير في رؤيتك أو كنت تعاني من الألم في العين. إحمرا. حساسية في العين أو وجع في الرأس (في حالات نادرة). توقف عن إستعمال الدواء وتوجه فوراً للطبيب. في اية حالة تشعر فيها بأعراض جانبية لم تذكر في هذه النشرة أو طرأ تغيير على شعورك العام عليك استشارة الطبيب فوراً.