



# קלריטון®

## טיפות/שטיפת עיניים סטרילית

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו 1986  
קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.  
פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על ידו.

### אופן השימוש:

**טיפות עיניים:** רחץ היטב את ידך, הטה ראשך לאחור או שכב על המיטה. בעזרת האצבע הרחק מעט את העפעף התחתון מן העין. לתוך המרווח שיווצר טפטף את התרופה ועצום העיניים למשך 1-2 דקות. אל תעפעף.

אם הינך חושב(ת) שהטיפה לא נקלטה השתמש(י) בעוד טיפה, את שאר התמיסה שמסביב לעין נקה עם המגבון.

**רטיה לעיניים:** הרטב/י גזה סטרילית (פדים לעיניים) בתמיסת קלריטון, שכב/י על הגב והנח/י על כל עין גזה ספוגה בקלריטון כ-5 דקות.

**שטיפה לעיניים:** שטוף את העין בטפטוף איטי של מספר טיפות כדי להוציא גוף זר מהעין. את התמיסה שמסביב העין נקה עם מגבון.

**לבעלי עדשות מגע:** השתמש/י בתמיסת קלריטון בכל ערב לאחר הוצאת העדשות מהעין.

**הערה:** לשמירת סטריליות התמיסה הימנע מנגע פתח הבקבוק או הפקק באצבע או בעצם כלשהו. סגור את הבקבוק היטב לאחר השימוש. אין להשתמש בתרופה יותר מחודש ימים לאחר פתיחת הבקבוק לראשונה.

### מנע הרעלה!

תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי כך תמנע הרעלה. אם בטעות בלע ילד מן התרופה פנה מיד לחדר מיון של בית החולים והבא אריזת התרופה איתך. **אל תגרום להקאה** ללא הוראה מפורשת מהרופא!

**אין ליטול תרופות בחושך!** בדק/י התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל/ת תרופה. הרכב/י משקפיים אם הינך זקוק/ה להם!  
**אחסנה:** עד 25°C. סגור היטב.

גם לפי תנאי האריזה/אחסנה המומלצים תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. נא לשים לב לתאריך התפוגה של תכשיר! בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה.

אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

**מס' רישום: 332022082**

**פישר מעבדות פרמצבטיות (1975) בע"מ ת.ד. 39071, ת"א 61390**

### הרכב:

**החומר הפעיל וריכוזו:** Benzalkonium Chloride 0.01%  
**חומרים לא פעילים:** Purified Water, Glycerin, Boric Acid, Borax, PVP, Disodium EDTA, Igepal 630, Igepal CA 897

**התרופה מיועדת:** לשטיפה והרגעת העיניים מגרויים קלים הנגרמים מגורמים שונים כגון אבק, שמש, עשן, צמחים וכדומה. לעזרה ראשונה בהוצאת גוף זר מהעין. לאחר שטיפת העין הפגועה, יש לפנות לרופא. התכשיר אינו משמש לטיפול בדלקת זיהומית של העין.

### מתי אין להשתמש בתכשיר?

אין להשתמש אם ידועה רגישות לאחד ממרכיבי התרופה.

**אזהרות:** אם הינך רגיש/ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה. התכשיר מכיל חומר משמר בנזלקוניום כלוריד, העלול להיספג על-ידי עדשות מגע רכות. אין להשתמש בתכשיר זה כאשר את/ה מרכיב/ה עדשות מגע רכות. יש להסיר העדשות לפני השימוש בתכשיר, וניתן להחזירן כעבור לא פחות מ-15 דקות מהזלפת התרופה לעין.

**תגובות בין תרופתיות:** אם הינך נוטל/ת תרופה נוספת, או אם גמרת זה עתה הטיפול בתרופה אחרת עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי-יעילות הנובעים מתגובות בין תרופתיות.

**תופעות לוואי:** בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה, בזמן השימוש עלולות להופיע השפעות לוואי.

**תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת:** אם חל שינוי בראיה או אם הינך סובל/ת מכאבים בעין, אדמומיות, גירוי עיניים או במקרים נדירים כאבי ראש, הפסק/י את הטיפול ופנה/י לרופא מיד. בכל מקרה שבו הינך מרגיש/ה תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה, או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית עליך להתייעץ עם הרופא מיד.

**מינון:** מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מהרופא: 1-2 טיפות 3 פעמים ביום. אין לעבור על המנה המומלצת. שימושים נוספים ראה ב"אופן השימוש".

**שים לב: לא לבלוע!** תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.