

بأن سادة الإغلاق غير مكمورة الدواء مخصص للتناول عن طريق الفم فقط، يجب الحضي جدًا قبل الاستعمال.

الجرع الاعيادية هي:

لا عملة الجرعة تشكل دساق بشكل دقيق يجب استعمال أداة القياس الملائمة المرفقة بالعبوة.

التحيز والأولى فوق جبل ١٢ سنة: ٢٠١٠-٢٠١٠ ملل بعد الأكل وقبل النوم، حتى ٤ مرات في اليوم.

الأولاد بعول ١٢-٤٦ سنة: ١٠٥٥ ملل بعد الأكل وقبل النوم، حتى ٤ مرات في اليوم.

هذا الدواء غير مخصص عادة للأولاد دون جبل ٦ سنوات.

عليك استعمال ملعقة قياس مخصصة لقياس الكمية الصحيحة من الدواء، في حال لم يتم ارفاق ملعقة إستيشر الصيدية، لا يجوز استعمال ملعقة من المنزل لغرض قياس كمية الدواء. الملاحق المنزلية تختلف بالحجم وقد لا تحصل على كمية الدواء الصحيحة.

إذا لم يطرأ تحسن على حالتك بعد ٧ أيام يجب التوجه إلى الطبيب.

إذا **أفرطت بالخطأ في تناول الجرعة** قد يظهر شعور بالانتفاخ، من غير المرجح أن يسبب ذلك ضرراً لك، لكن يجب أن تفحص مع الطبيب أو الصيدلي.

إذا أفرطت في تناول الجرعة أو إذا بلغ طفلك من الدواء عن طريق الخطأ، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى مصطحباً عبوة الدواء معك.

لا يجوز **تخطي الجرعة الموعدى بها**، إذا شعيت تناول هذا الدواء في الوقت المطلوب، لا يجوز تناول جرعة مضاعفة،خذ الجرعة التالية في الوقت المعتاد واستشر الطبيب.

٤ . الأعراض الجانبية:

كلل أي دواء، قد يسبب استعمال جاقفيسكون سائل نعاخ أعراضاً جانبية لدى جزء من المستخدمين، لا تفرح من قراءة قائمة الأعراض الجانبية، من الممكن أن لا تصاب بأي واحدة منها.

يجب إيقاف استعمال الدواء والتوجه إلى الطبيب فوراً في حال حصل رد فعل تحسسي مثل:
• طفح جلدي، صعوبات في التنفس، تورأ أو انتفاخ الوجه، الشفتين، اللسان والحنق.
• تظهر هذه الأعراض في أوقات نادرة جداً.

إذا ظهر عرض جانبي أو إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي، لم يُذكر في هذه النشرة، عليك استشارة الطبيب.

٥ . كيفية تخزين المستحضر؟

• تحتل استعمار يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال والأولاد، والرجوع بذلك لمنع التسمم. لا تصيد النقط دون تعليمات صريحة من الطبيب.

• لا تتناول أدوية في الطلاد تحقق من الماسبق والجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء، ضع النطاظر الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

• لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp, date) الذي يظهر على القنبية. تاريخ انتهاء الصلاحية يرجع إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

• **ظروف التخزين:** لايجوز التخزين بدرجة حرارة تملو عن ٣٠ درجة مئوية. لايجوز التخزين في الثلاجة أو التجميد.
حزن في العبوة الأصلية.
يمكن استعمال المستحضر لمدة ٦ أشهر بعد فتح القنبية لأول مرة.

٦ . معلومات إضافية

• إضافة إلى المواد الفعالة يحتوي الدواء أيضاً على-

Carbomer, Methyl parahydroxybenzoate, Propyl parahydroxybenzoate, Saccharin sodium, Peppermint oil, Sodium hydroxide, Water.

تحتوي كل ملعقة صغيرة (٥ ملل) من المستحضر ٧٠,٥ ملغ صوديوم. لا يحتوي الدواء على سكر أو جلوتين.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

مستعلق بمذاق وزاحة المذاخ بلون ابيض حليبي غير شفاف، يسوق في قنبية ٣٠٠ ملل.

المنتج: ريكيت بكتيز هيلثكير. (ببر إيست) مرض. هنغار ٦، فود شارون ٤٥٧٧٠٤

المستورد: ريكيت بكتيز (ببر إيست) مرض. هنغار ٦، فود شارون ٤٥٧٧٠٤
رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: ١٤١٠٦٧٠٣١٧٥٢٠٠

أُحضنت هذه النشرة وتم المصافحة عليها من قبل وزارة الصحة في تاريخ ٢٠١٤/٠٨
للتبسيط وتسهيل القراءة تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المترك. لكن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلية (مستحضرات) - ١٩٨٦

يُباع الدواء بدون وصفة طبيب

جاقفيسكون سائل نعاخ

تركيب المواد الفعالة وكميتها بوحدات الجرعة:

صوديوم الجينات ٥٠ ملغ/ملل

بيكربونات الصوديوم ٢٢,٧ ملغ/ملل

كربونات الكالسيوم ١٦ ملغ/ملل

Sodium Alginate 60 mg/ml
Sodium Bicarbonate 26.7 mg/ml
Calcium Carbonate 16 mg/ml

١٥ المواد غير الفعالة والمورجات في المستحضر – أنظر بند ٦ في النشرة

اقرأ النشرة بامعان **حتى نهايتها** قبل أن تستعمل الدواء، تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة

عن الدواء. إذا كنت لديك أسئلة إضافية، توجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.

يغطي هذا الدواء من دون الحاجة لوصفة طبيب، يجب استعمال الدواء بالطريقة الصحيحة. قم باستشارة

أما دون هذا الجبل يجب التوجه للطبيب. يجب استعمال الدواء بالطريقة الصحيحة. قم باستشارة

الصيدلي إذا كنت بحاجة لمعلومات إضافية.

عليك التوجه للطبيب إذا تفاقت علامات المرض (الأعراض) أو لم يطرأ عليها تحسن بعد ٧ أيام.

١. لأي عرض مخصص الدواء؟

المعالج أعراض الجزر (رجوع الطعام) المعدي، جرقة، غزات تعلق بالجزر (رجوع الطعام) المعدي،

المرقة خلال العمل، في تلك سائفة (الزجاج) في أعلى البطن أو خلف عظم الضفر، جضما يكون السبب الرئيسي لذلك، هو جزر (رجوع طعام) معدي.

الفصيلة العلاجية:

• مثلمات الجزر (رجوع الطعام)، مضاد الحموضة.

٢. قبل استعمال الدواء:

لا يجوز استعمال المستحضر إذا كنت حساساً (ديك حساسية) للمواد الفعالة أو لأي من المركبات

الإضافية الموجودة في الدواء (أنظر بند ٦ في النشرة)، حيث أنه قد تم توثيق حالات نادرة لسمويات

3008079

في التنفس وطفح جلدي.

تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء:

يحتوي كل ٥ ملل نحو ٥٧٠ ملغ صوديوم، في حال يوجد عليك أن تفيد كمية الصوديوم في حميتك، إستشر الطبيب قبل استعمال الدواء.

يحتوي الدواء على مثيلجار-هيدروكسي بنزوات (E218) وبيروبييل-بارا- هيدروكسي بنزوات (E216) التي يمكن أن تسبب رد فعل اليرجي (يتمثل رد فعل اليرجي متأخر).

إذا كنت تتناول أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات تغذية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.

يجب أن تتناول فترة زمنية من ساعتين على الأقل بين تناول هذا الدواء وتناول أدوية أخرى عن طريق الفم وخاصة إذا كنت تتناول الأدوية التالية حيث أن الدواء قد يفض عمل هذه الأدوية:

- مضادات الهيستامين

- مضادات حيوية (بكترياسيكليينات وكوينولينات، مثل: فلوكلوكساسين)

- مستحضرات الحديد

- أدوية ضد الفطر مثل كيتوكونازول

- دجوكسين ومحصرات بيتا (لمعالج مشاكل القلب)

- بييسيدامين (لمعالج التهاب المفاصل الريماتويدي)

- جازوكوتيكويدات (لمعالج أمراض التهابية ومضاعة ذاتية)

- مضادات الألم (لمعالج أمراض نفسية)

- هرمونات الدرقية

- كلوروكوين (لمعالج الملاريا)

- إستر مومستين (لمعالج سرطان البروستات)

- بيسيفوسفات (لمعالج تحلل العظام)

الحمل والإرضاع:

يمكن استعمال هذا الدواء إذا كنت حامل أو مرضعة.

٣. كيف تستعمل الدواء؟

عليك التأكد من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا، قبل استعمال المستحضر لأول مرة. يجب التأكد