

چافيسكون أقراص نعناع

المادة الفعالة وكيفيتها:

Sodium alginate 250 mg

Sodium bicarbonate 133.5 mg

Calcium carbonate 80 mg

صوديوم الجينات ٢٥٠ ملغم

بيكربونات الصوديوم ١٣٣.٥ ملغم

كربونات الكالسيوم ٨٠ ملغم

* الماء غير المقطرة والمورجات في المستحضر - انظر بند ٦ في النشرة.

اقرأ النشرة بإيعاز حتى نهايتها قبل أن تستعمل الدواء. غنوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا كانت لديك أسلحة إضافية، توجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.

يغطي هذا الدواء من دون الحاجة لوصفة طبيب، الدواء مخصص للأطفال والأولاد فوق جيل ١٢ سنة. ما دون هذا الجيل يجب التوجيه للطبيب. يجب استعمال بالطريقة الصحيحة. قم باستشارة الصيدلي إذا كنت بحاجة لمعلومات إضافية. عليك التوجيه للطبيب إذا تفاوت علامات المرض (الأعراض) أو لم يطرأ عليها خمس بعد ٧ أيام.

١. لأي غرض مخصص الدواء؟

لعلاج أعراض الجزء (رجوع الطعام) المعدي - الريني، مثل رجوع عصارات المعدة الخامضية، حرقة ومشاكل في الهضم (التي تتعلق بالجزء)، على سبيل المثال، بعد الوجبات أو خلال العمل، أو لدى مرضى لديهم أعراض تتعلق بالجزء (رجوع الطعام) الريني.

الفصيلة العلاجية: مثباتات الجزء (رجوع الطعام).

٢. قبل استعمال الدواء:

لا يجوز استعمال المستحضر إذا كنت حاملاً (الدبة حساسة) للمادة الفعالة أو لأي من المركبات الإضافية الموجودة في الدواء (انظر بند ٦ في النشرة)، حيث أنه قد تم توليف حالات نادرة لصعوبات في التنفس وطفح جلدي.

تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء:

يحتوي كل قرص على ما يقارب ٢٦١ ملغم صوديوم وما يقارب ٨٠ ملغم كالسيوم. في حال يتوجب عليك أن تزيد كمية الصوديوم أو الكالسيوم في حبيباتك، استشر الطبيب قبل استعمال الدواء.

يحتوي الدواء على أسيترات، وهو مصدر للفينيل الألين، وهي مادة يحظر على المرضى الصائمين بيبة الفينيل كيتونتناولها.

إذا كنت تتناول أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات تغذية، أخرين الطبيب أو الصيدلي بذلك. يجب أن تنتظر فترة زمنية من ساعتين على الأقل بين تناول هذا الدواء وتناول أدوية أخرى عن طريق الفم حيث أن الدواء قد يتشوش عمل الأدوية الأخرى.

٣. كيف تستعمل الدواء؟

عليك التأكد من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكون متاكداً، الدواء مخصص للتناول عن طريق الفم فقط. يجب مضغه جيداً قبل البلع.

الجرع الاعتيادية هي:

الكبار والأولاد فوق جيل ١٢ سنة: ٢-٤ أقراص للمضغ بعد الوجبة وقبل النوم.

هذا الدواء غير مخصص عادة للأولاد دون جيل ١٢ سنة.

إذا لم يطرأ خمس على حاليك بعد ٧ أيام يجب التوجيه إلى الطبيب.

إذا أفرطت بالخطأ في تناول الجرعة قد يظهر شعور بالانتفاخ. من غير المرجح أن يسبب ذلك ضرراً لك، لكن يجب أن تشخص مع الطبيب أو الصيدلي.

إذا أفرطت في تناول الجرعة أو إذا بلع طفل من الدواء عن طريق الخطأ، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى مصطحبًا عبوة الدواء معك.

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المطلوب، لا يجوز تناول جرعة مضاعفة.خذ الجرعة التالية في الوقت العادي واستشر الطبيب.

٤. معلومات إضافية

إضافة إلى المادة الفعالة يحتوي الدواء أيضاً على:-

Mannitol, Macrogol 20,000, Copovidone, Peppermint flavour,

Magnesium stearate, Acesulfame potassium, Aspartame.

يحتوي كل قرص على ٢٧٥ ملغم أسيترات، ما يقارب ٦١.٥ ملغم صوديوم ونحو ٨٠ ملغم كالسيوم.

لا يحتوي الدواء على سكر أو جلوتين.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

أقراص بلون الحليب، مقطعة فليلاً، تحتوي العبوة على ٢٦،٦٦، أو ٤٨ قرص للمضغ.

ليست كل العلب مسورة.

صاحب التسجيل: ركيت بتكيرز (نروي إستاد) م.ض، هنجر ٦، هود هشارون، ٤٥٢٤.

المنتج: ركيت بتكيرز هيلتك (إخلاء)، داسوم لين، هال، إخلاء.

فحصت هذه النشرة وتم المصادقة عليها من قبل وزارة الصحة في تاريخ ٢٠١٤/٠٨/٠٣.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

٢١٧٥٧-٤١-٥٨-١٤١.

للتبسيط وتيسير القراءة، ثبت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر، لكن الدواء مخصص لكلا الجنسين.