

**המינון המקובל הוא:**

למשך זמן בטיחה של 15 דקות בלבד מותרים כלי מדידה מתאים המצוידים לאריזה.

**במגרים וילדים מעל גיל 12 שנים:** 20–10 מ"ל אחרי האוכל לפני השינה, עד 4 פעמים ביום.

**ילדים מגיל 6–12 שנים:** 10–5 מ"ל אחרי האוכל לפני השינה, עד 4 פעמים ביום.

עלול להשתמש בכפית מדידה המיועדת למדידת המנת המנוגה של התרופה. באם לא צורפה כפית היוענע בדקוקה אין להשתמש בכפית בתחת לצורך מדידת כמות התרופה. הכפית הבינעית שניתנת בדרךלן זמינה שלא חקבל את כמות התרופה הנכונה.

אם לא חל שיפור במצבך לאחר 7 ימים של לפנות להפא.

**אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר עלולה** להופיע תחושת פניחות. לא כביר כי זה יבדוד לך לודק, אך יש בדודק עם הרופא או הדוקח.

אם נטלת מנת יתר או אם נטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריות התרופה איתך.

**אין לעבר על המנה המומלצת.**

**אם שכחת לטויל תרופה זו** בזמן הרושח, אין לטויל מנה כפולה. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל והיוענע בדוקא.

**4. תופעות לוואי**

כמו בכל תרופה, השימוש בביוסקוון מול מנסה עלול לגרום לתופעות לוואי: בחלק מהמשתמשים, אל תיבהל למקרא שיחמת תופעות הלוואי. ייתכן ואל תסבול סתף אחת מהן.

**יש להפסיק את השימונו ולפנות מיד לרופא** במקרה של הנבנה אלרגית כגון פריחה עורית, קשיי נשימה, חוצרתורא או הנבחות של הפנים, שפתיים, לשון ונבון. תופעות אלה מופיעות לעיתים בדורות סמוך.

אם הופיעה תופעת לוואי או אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא הוזכרה בעלון, עלך להתייעץ עם הרופא.

**5. איך לאחסן את התרופה?**

- עמם העולה תרופה זו עלה תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישע יום של ילדים ו/או חיותקת

על-ידי כך תיועו הרעלה, אל תרחם להקפא. לא תרחם להקפא. לא תרחם להקפאת מופרזים.

- אין לטויל התופעת מחמישה בנבון:התופעות הנבונה לכל פעם:שכנון בעול חובקה, הרגב שיקפיים אם היך זיקוק ליהם
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התסבנה (exp. date) המופיע על גבי אריות הבקבוק. תאריך התפוגה מחייבים ליום האחרון של אותו רושח.
- תמא איחסון:** אין לאחסן בטמפרטורה העולה על 30˚C. אין לאחסן במקרר או להקפא. אסונו באריזה המקורית ויתן להשתמש בתכשיר 6 חודשים לאחר פתיחת הבקבוק להאשנע.

#### 6. מידע נוסף

- נוסחי על החומרים הפעילים התרופה מכילה גם –

*Carbomer, Methyl parahydroxybenzoate, Propyl parahydroxybenzoate, Saccharin sodium, Peppermint oil, Sodium hydroxide, Water.*

כל כפית (5 מ"ל) של התכשיר מכילה 70.5 מ"ג בתוך. התרופה אינה מכילה סוכר או גלוקס.

**כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:**

הדודק ננטעם ובניחות מנסה בצבע חלבך שמיים שקוף. שבקבוק של 300 מ"ל.

**יצרן:** רקוס בנקייר הולד'ק'ר בע"מ, דנסום ליי, הל, אנגליה.

**יבואן:** רקוס בנקייר (ג'יר איסט) בע"מ, הג'ר, 6. הוד השינון 42527704

**מספר רישום התרופה בבנקסם התרופות הממלתי במשרד הבריאות:** 00-31756-67-141

עלון זה בדוק ואשער י"ג משוד הבריאות בתאריך 2014/08.

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה ננסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

**עלול לערובן לפי תקנות התרופות ותכשירים) התשנ"ו-1986**

התכשיר נמכר ללא מרשם רופא

## גביוסקוון נוזל מנסה

**הרכב החומרים הפעילים וכמותם ביחידות מינון:**

סודיום אלגינאט 50 מ"ג/מ"ל

סודיום ביקרבונאט 26.7 מ"ג/מ"ל

לקליום קרבונאט 16 מ"ג/מ"ל

Sodium Alginate 50 mg/ml

Sodium Bicarbonate 26.7 mg/ml

Calcium Carbonate 16 mg/ml

\*חומריו בוליו פעילים ואלרגניים בתכשיר – ראה סעיף 6 בעלון.

**קרא בעיון את העלון עד סופו בטרום שתמשש בתרופה.** עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם

יש לך שאלות נוספות, פנה אל ההפא או אל הדוקח.

התרופה זו ניתנת ללא צורך במרשם רופא. התרופה מיועדת למבוגרים וילדים מעל גיל 6 שנים. ממתח ליל זה יש לפנות לרופא. עלך לבדול אותה בצורה נכונה. השוער בדוקה אם נבון קודק למועד נכון.

עלול לפנסה אל הרופא נגם פנימי המחלה (סימפטומום) מחמירים או אינם משתפרים לאחר 7 ימים.

#### 1. למה מיועדת התרופה?

לטויל סימפטומום של דפלוקס (העלאת מונון) קיבתי. צרבת, נביום הקשורים לדפלוקס (העלאת מונון) לקיבתי. צרבת של הריון, בכל המקרים של ספוקה רום ביטנית או של אחריו עצם החזה, כשהפניה הבסיטית היא דפלוקס (העלאת מונון) קיבתי.

**קבוצה תרופוטיית:** מדאנ ריפלוקס (העלאת מונון), סותרד חומצה.

#### 2. לפני שימוש בתרופה

אין להשתמש בתכשיר אם אתה רביש (אלודגי) לחמורים הפעילים או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מנילה התרופה (ראה סעיף 6 בעלון). חיות ותועזו מקרים נדירים של קשיים בנשימה ופריחה עורית.

**3008079**

**אזהרות מיוחדות הנוגעות בשימוש בתרופה:**

כל 5 מ"ל מכילים 3–70.5 מ"ג סוכר. אם עלול להגביל את כמות הסוכר בתזונתך, התייעץ עם רופא לפני השימוש בתרופה.

התכשיר מכיל ממילפנהדרוקסיבזונאט (E218) ופרופילפרהדרוקסיבזונאט (E216) אשר עלולים לגרום להנבנה אלרגית (חיתכן הנבנה אלרגית מאוחרת).

**אם אתה על לוקח תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי מזון, ספר על כך לרופא או לדוקח.**

יש להכות פרק זמן של שעתיים לפחות בין נטילה תרופה זו לבין נטילה תרופות אחרות דרך הפה ובשיחוד אם אתה נטיל את התרופות הבאות ביחד והתרופה יכולה לסתור את פעולת תרופות אלו:

- אנטיוסטטטים

- אנטיוסיטיקה (סטרואידקליים וקוויטלוים, כגון מורפלוקסצין)

- תכשירי בדול

- תרופות נגד סטריות כגון קטומבול

- דוקוקוון וחוספי סבא (לטוילר בצבעות לב)

- פפזילאצין (לטוילר בדוקת מפרקים שגורות)

- גלוקוקוויקאריום (לטוילר במחלת דלקושות אוטואימונית)

- תרופות מורלגטיים (לטוילר במחלות נפשיות)

- תרופות תרופתי

- בלדוקוין (לטוילר במלריה)

- אסטרוסטטט (לטוילר בסוכרן הערמונית)

- ביספוסטטט (לטוילר באוסטאופורוזיס)

**הריון והקנה:**

ניתן להשתמש בתרופה אם את בהריון או מניקה.

#### 3. כיצד שתמשש בתרופה?

עלך בדוקק עם הרופא או הדוקח אם איך כמות. יש לוחא כי המנסה האוסס אינו שכוד לפני שימוש ואשוני בתכשיר. התרופה מיועדת לנטילה דרך הפה בלבד. יש לנער היטב לפני השימוש.