



מידראميد

טיפול עיניים סטריליות

עלון לצריך לפי תקנות הרוקחים (תקשיים) התשמ"ז 1986

תרופה זו חיבת במרשם רופא.

קרא בעיון את העalon עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.

פורמת עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על ידו.

תופעות המחייבות התיחסות מיוחדת: גירוי או דלקת בעין; (נדיר)
הפסיק הטיפול ונפה לרופא.

תופעות הנובעות ממינון יתר והמעמידות על ספיגה לגוף: נובש בפה ובעור, גירוי בעור, שינויים בהתחגויות במיוחד ילדים, צמא מוגבר, חולשה כללית מוגברת, בתן נפוחה בתינוקות, האדמת פנים: הפסיק הטיפול ונפה לרופא מיד. בכל מקרה שבו הין מרוגש/ה תופעות לוואי שלאי צוינו לעלון זה, או אם חל שינוי בהרגשות הכלילי עלי' להтиיעץ עם הרופא מיד.

מינון: מינון לפי הוראות הרופא בלבד. אין לעבור על המנה המומלצת. אם שמת בטופע מנת יתר יש לשטוף את העיניים היטב במים ולפנות לרופא.

שים לב: לא לבלוע! תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד. אופן השימוש: רוץ היטב את ידיים הטה ראש לאחר או שכב על המיטה ובאזור האכבע הרחק מעת את העפעף התחתון מן העין. לתוך המרווה שיזוצר טפסט את התהופה, ולאחר עט האכבע על שקיית הדמעות למשך 3-4 דקות. לминעת זיהום התמיסה הקפד שפיית הבקבוק לא תבוא במגע עם משטח כלשהו, כולל האכבע או העין וסוגר הבקבוק היטב.

אין לשתמש בתרופה יותר מחודש ימים לאחר פתיחת הבקבוק לראשונה.

מנע הרעלת! – תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקומות סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי קר תמן הרעלת. אם נטלה מנת יתר או אם בטופע בעלILD מין התרופה פנה מיד לחדר מין של בית-חולים ובאה אריזת התרופה איתך. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא.

תרופה זו נושמה לטיפול במלתן, בחולה אחר/ת היא עלולה להזיק אל תיתן תרופה זו לקרוביך, שכןיך או מカリיך.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התוויות והמנה בכל פעם שהין נוטל תרופה. הרכיב/י משקיפים אם הין זוקק להם.

אחסנה: עד 25°C. סגור היטב ומונע חדירת אויר ורטיבות. גם לפני תנאי האזוזה/אחסנה המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. נא שים לב לתאריך התופה של התכשיר! בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברופח שספק לך את התרופה. אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

מספר רישום התרופה: 1083720498
מספר מעקבות פרמצטניות (75) בע"מ ת.ד. 39071, ת"א 61390

הרכב:

החומר הפעיל ורכזו: 0.5% Tropicamide

חומרים בלתי פעילים: Benzalkonium Chloride, Boric Acid, Disodium EDTA, Purified Water.

פעלות רפואיות: הרחבת האישון לצורך.Diagnose.

מתי אין לשתמש בתכשיר?

אין לשתמש אם ידועה ריגשות לאחד ממרכיבי התרופה.

אין לשתמש אם הין סובל/ת מגלאוקומה.

אין לשתמש בתרופה מבלתי להוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול אם הין בהריון או מניקה.

איך תשפיע התרופה על חי היום יומם שלך? השימוש בתרופה זו עלול לגרום לתשטווש הראה ועל כן מחייב זיהירות בהנאה ברכב, בהפעלת מכונות מסוכנות ובכל פעילות המחייבת ראייה תקינה. באשר לילדים, יש להזהיר מרכיבה על אופניים או ממשקפים בקרבת הכביש וכדומה.

ażhorot: אם הין רגישה להודיע על כך לרופא לפני ניתילת התרופה. התכשיר מכיל חומר משמר בנזלקונים קלורייד, העולול להיספג על-ידי עדשות מגע רכות. אין להסיר העדשות לפני השימוש בתכשיר, מרכיביה עדשות מגע רכות. יש להסיר העדשות לפני המשלחת התרופה לעין. יש וגינתן להחזירן כubbo לא פחות מ-15 דקות מהזהמת התרופה לעין. ילדים להגון על העיניים מחשיפה לאור בהיר כל עוד האשונים מורחבים. ילדים קטנים, ילדים בעלי שיער בלונדי או עיניים כחולות, ילדים עם פגעה מוחית או שיתוק ספסטי, ילדים עם תסמנות דאון וקשישים ורשיים יותר לתרופה ועל כן יש להקפיד במניעת בקבצות האלה לא לעבור את המין הנרשם ולעקוב אחריו תופעות לוואי האפשריות המפורחות להלן. בתרופות מריחיבות אישון יש לנகוט זיהירות במקרים של חלחץ התוך-עין אינו ידוע. בניתוחים של כריתת הקשתית וב uninums עם נתיה להצרת הזית בין הקרטינית לקשתית.

תגובהות בין תרופתיות: אם הין נוטל/ת תרופה נוספת, או אם גמרת זה עתה הטיפול בתרופה אחרת עליך לדוח לרופא המתפל כדילמנוע סיכונים או אי-יעילות הנובעים מתגובהות בין תרופתיות.

תופעות לוואי: בנוסך לפעולות הרצiosa של התרופה, בזמן השימוש עלולות להופיע השפעות לוואי כגון: טיטוש ראייה, ריגשות העיניים לאור (ראייה לעיל), אם התופעות הנ"ל מתחמכות מעבר ל-24 שעות אחרי תום הטיפול יש לפנות לרופא.