



# لكريمول قطرات معقمة للعين

انتبه: ليس للبلع! هذا الدواء معد للاستعمال الخارجي فقط.

**طريقة الاستعمال:** اغسل يديك جيداً إحن رأسك الى الخلف او استلق على الفراش وبواسطة اصبعك ابعد الجفن الاسفل عن العين قليلاً وفي الفراغ الذي نتج انقط الدواء واغمض عينيك خلال دقيقة الى دققتين. لا ترمي. اذا كنت تعتقد ان القطرة لم تستوعب اقطر ثانية نطف السائل حول العين بواسطة منشفة صغيرة. لمنع تلوث المحلول حافظ ان لا يمس طرف القنينة اي مسطح كان يشمل ذلك الاصبع او العين. كذلك اغلق القنينة جيداً.

**كيف نساعد على انجاح العلاج؟**

يجب اتمام العلاج الذي اوصى به الطبيب. حتى لو خسنت حالتك الصحية لا يمكن او لا يجوز التوقف عن العلاج بدون استشارة الطبيب.

**امنع التسمم:**

يجب حفظ هذا الدواء واي دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول ايدي الاطفال و/او الاطفال وبهذا تمنع خطر التسمم.

اذا تناولت وجبة زائدة او بلع احد الاطفال من الدواء شيئاً عن طريق الخطأ توجه رأساً الى غرفة الاستقبال في المستشفى وخذ علبة الدواء معك.. لا تُخالِفْ التَّقْوِيَّةَ دون تعليمات واضحة من الطبيب.

لا تتناول هذا الدواء في الظلام. افحص الملصقة والجرعة في كل مرة تستعمل الدواء. ضع النظارات اذا كنت بحاجة لذلك.

**الحفظ:**

حتى 25 درجة مئوية. لا جمدتها. اغلق القنينة جيداً وامنع تسرب الهواء والرطوبة. كذلك لا بجور استعمال الدواء اكثر من شهر واحد بعد فتح القنينة لاول مرة. حتى لو اتباعنا شروط التغليف الموصى بها. انتبه لتاريخ صلاحية الدواء. في حالات الشك عليك استشارة الصيدلي الذي زودك بالدواء. لا حفظ ادوية مختلفة في نفس العلبة.

رقم التسجيل في وزارة الصحة: ٢٦٧٢٢٠٨٣

فيشر مختبرات (١٩٧٥) م.ض. ص.ب. ٣٩٠٧١ تل ابيب ٦١٣٩٠

نشرة للمستهلك حسب انظمة الصيادلة (مستحضرات) لعام ١٩٨٦

اقرأ النشرة بتمعن حتى آخرها قبل استعمال الدواء

وزارة الصحة حددت شكل هذه النشرة. فحصت محتواها ووافقت عليه

**تركيبة المادة الفعالة وتركيزها:**

Povidone 1.6%, Hydroxyethylcellulose 0.31%.

**مواد غير فعالة:**

Purified Water, Boric Acid, Sodium Chloride, Sodium Borate, Disodium Eddate, Benzalkonium Chloride.

**الفعالية الطبية:**

يستعمل هذا الدواء في حالة حدوث جفاف في العيون وعندما يكون سيل الدموع غير كاف.

**متى يحظر استعمال المستحضر؟**

يحظر استعمال الدواء اذا تغير لون المحلول او اصبح عكراً. كذلك يحظر استعمال هذا الدواء اذا كان المريض يعاني من حساسية لأحد مركباته.

**تحذيرات:**

يحظر استعمال الدواء لفترات متقاربة او لفترات متواصلة دون استشارة الطبيب المعالج. هذا المستحضر يحتوي على المادة الواقية بنزلكونيوم كلوريド التي يمكن أن تتصبها العدسات اللاصقة اللينة.

يحظر استعمال المستحضر حين استعمال العدسات اللينة. يجب نزع العدسات قبل استعمال المستحضر ولا يمكن إرجاعها ثانية إلا بعد مرور ما لا يقل عن ١٥ دقيقة من تقطير العين بالدواء.

**تفاعلات بين الأدوية:**

اذا كنت تتناول/ين دواء آخر او انتهيت لتوك من العلاج بدواء اخر عليك ابلاغ الطبيب المعالج وذلك لتفادي الاخطار او عدم النجاعة الناتجة عن تفاعلات بين الادوية.

**مضاعفات تلزم التعامل معها بشكل خاص:**

اذا طرأ تغيير على الرؤيا. اذا شعرت بألم في العيون. تهيج جلدي. احمراراً متواصلاً. توقف عن تناول الدواء وتوجه للطبيب فوراً. وعلى اية حال اذا كنت تشعر بظهور اعراض جانبية اخرى لم تذكر في النشرة او طرأ تغيير على صحتك العامة عليك استشارة الطبيب المعالج.

**الجرعة الدوائية:**

من نقطة الى نقطتين ٣ مرات في اليوم او وفقاً لتعليمات الطبيب. اذا لم تتحسن حالتك الصحية بعد ثلاثة ايام يجب التوجيه للطبيب.