



לקריםול[®]

טיפול עיניים סטריליות

עלון לצריך לפי תקנות הרוקחים (תקשיים) התשמ"א 1986
קרה בעין את העalon עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.
פורמת עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על ידו.

אופן השימוש: רחץ ידך היטב, הטה ראשך או שכב על המיטה
ובعزيز האצבוע הרוחק מעט את העפעף התחתון מן העין.
لتוך המרورو שיווצר טפרט את התרופה ועוצם העיניים למשך
1-2 דקות. אל תעפעף. אם הינך חושב שהטיפה לא נקלטה
השתמש בעוד טיפה. את שאר התמיסה שמסביב לעין נקה
עם מגבון. למניעת זיהום התמיסה הקפֶד שקצתה הבקבוק לא
יבוא במגע עם משטח כלשהו כולל האצבוע או העין וסגור את
הבקבוק היטב.

כיצד תוכל/י לסייע להצלחת הטיפול? עליך להשלים את
הטיפול שהומלץ ע"י הרופא. גם אם חל שיפור במצב בריאותך
אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התיעצות עם רופא.

מנع הרעליה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקומות
סגור מחוץ להישג ידים של ילדים / או תינוקות וע"י קר תמנע
הרעליה. אם נטלה מנת יתר או אם בטועות בעל יד מהתרופה,
פנה מיד לחדר המיןון בבית החולים והבא את אוריית התרופה
איתך.

אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא!

אין ליטול תרופות בחושך! – בדק/י התווית והמנה בכל פעע
שהינך נוטל/ת תרופה. הרכבי משקפיים אם הנר זוקק/ה להם.

אחסנה: עד 25°C. לא להקפיא. סגור היטב ומנع חדירת אויר
ורטיבות. אין להשתמש בתרופה זו יותר מחודש לאחרפתיחה
הבקבוק לראשוונה.
גם לפि תנאי האזינה/אחסנה המומלצים, תרופות נשמרות
لتקופה מוגבלת בלבד. נא לשים לב לתאריך התפוגה של
הטיפול! בכל מקרה של ספק עליך להיוועץ ברוקח שספק
לך את התרופה.
אין לאחסן תרופות שונות באותה אזינה.

מספר רישום: 267222083.
פישר מעבודות פרומצטניות (1975) בע"מ ת.ד. 39071, ת"א 61390

הרכב:

החומרים הפעילים ורכיביהם:
.Povidone 1.6%, Hydroxyethylcellulose 0.31%

מרכיבים לא פעילים: Purified Water, Boric Acid, Sodium Chloride
.Sodium Borate, Disodium Eddate, Benzalkonium Chloride

פעילות רפואי: התכשיר משמש כסיכה במקרים של יובש
בעיניים כאשר יצירת הדמעות אינה מספקת.

מתי אין להשתמש בתכשיר?

אין להשתמש בתכשיר אם התמיסה שנינתה צבעה או נהיתה
עכורה. אין להשתמש בתכשיר אם ידועה רגשות לאחד ממרכיבי
התרופה.

ażhorot: אין להשתמש בתרופה זו לעתים קרובות או תקופת
זמן ממושכת מבלי להתייעץ עם רופא. התכשיר מכיל חומר לשמור
בנצלקוניום קלוריד, העולול להיספג על-ידי עדשות מגע רכות.
אין להשתמש בתכשיר זה כאשר אחת/ה מרכיביה/ה עדשות מגע
רכוכת. יש להסיר העדשות לפני השימוש בתכשיר, ונינתן להחזין
כעבור לא פחות מ-15 דקות מהזלתת התרופה לעין.

תגובהות בין תרופתיות: אם הנר נוטל/ת תרופה נוספת, או אם
גמרת זה עתה הטיפול בתרופה אחרת עליך לדוח לרופא המטפל
כדי למנוע סיכונים או אי-יעילות הנובעים מתגובהות בין תרופתיות.

תופעות לוואי המחייבות התיחסות מיוחדת: אם חל שינוי
בראייה, כאב עיניים, גירוי, אדמדומים שנמשכת, הפסק הטיפול
ופנה לרופא מיד. בכל מקרה שבו הנר מרגיש/ה תופעות לוואי
שלא ציינו בעлон זה או אם חל שינוי בהרגשת הכללית עליך
להתייעץ עם הרופא המטפל מיד.

מינון: 1-2 טיפולים 3 פעמים ביום או בהתאם להוראות הרופא.
אם לא חל שיפור במצבך תוך 3 ימים יש לפנות לרופא.

שים לב: לא לבלוע! תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.