



## لكروميتكين® قطرات معقمة للعيون

### اعراض جانبية:

بالاضافة للفعالية المطلوبة للدواء قد تظهر اثناء استعمال الدواء مضاعفات.  
مضاعفات تلزم التعامل معها بشكل خاص:  
في حالة حدوث حكة او احمرار او تهيج توقف عن العلاج فوراً وتوجه للطبيب.  
**الجرعة الطبية:**

وفقاً لتعليمات الطبيب فقط لا يمكنجاوز الجرعة الموصى بها. اذا لم تتحسن  
حالتك خلال ايام يجب التوجه للطبيب يجب تناول هذا الدواء في اوقات  
منسقة وثابتة. كما اوصى بذلك الطبيب المعالج اذا نسيت تناول هذا الدواء  
في الوقت المحدد له تناول جرعة فوراً عند تذكرك. ولكن لا يمكن تناول جرعتين  
معاً ولا بأي شكل من الاشكال.

### انتبه -

لا تتبع الدواء فهو للاستعمال الخارجي فقط.  
**طريقة الاستعمال:**

قطارات - اغسل يدك جيداً. امل رأسك الى الوراء او استلق على السرير. ابعد  
الجفن قليلاً عن العين وقطر في الفراغ وغلق عينيك لمدة ١-٢ دقائق. لا ترمش.  
اذا كنت تعتقد ان القطرة لم تستوعب استعمل قطرة اضافية نصف المحلول  
او السائل حول العين بواسطة منشفة صغيرة.  
لمنع تلوث المحلول حافظ ان لا يمس طرف القنينة اي مسطح كان. يشمل ذلك  
الاصبع او العين. كذلك اغلق القنينة جيداً.

### كيف تساهم في خفاعة العلاج؟

عليك اتمام العلاج الذي اوصى به الطبيب. حتى لو طرأ خسн على حالتك  
الصحية. كما انه لا يمكن التوقف عن العلاج بهذا الدواء دون استشارة الطبيب.  
**امنع التسمم:**

يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر بعيداً عن متناول ايدي الاطفال والالوان.  
وبذلك يمكنك تفادى حدوث تسمم. اذا تناولت جرعة اضافية او عن طريق الخطأ  
ابتلع طفل شيئاً من الدواء توجه فوراً للمستشفى واحضر معك علبة الدواء.  
**يحظر الاجبار على التقيؤ دون تعليمات واضحة من الطبيب.**  
يمكن تناول الدواء في الظلام! افحص الملصقة في كل مرة تتناول فيها الدواء  
وضع النظارات اذا اقتضت الحاجة. (هذا الدواء اعد لعلاج مرضك اذا اعطيته لقربي  
لك او جلارك او ل احد معارفك يمكن ان تضره).

**الحفظ:** في مكان بارد ومظلم. حتى 25°C. لا يجوز جمبيده. أغلق القنينة جيداً وامنع  
تسرب الرطوبة والهواء. كذلك لا يجوز استعمال الدواء اكثر من شهر واحد  
بعد فتح القنينة للمرة الاولى. كذلك حتى عند مراعاة تعليمات التعبئة  
والتخزين الموصى بها تبقى صالحة لمدة محدودة فقط. الرجاء الانتباه لتاريخ  
انقضاء الصلاحية الدوائية. في حالة عدم التأكد عليك استشارة الصيدلي الذي  
رودك بالمستحضر.

رقم تسجيل الدواء: ٥٠٩٦٤٧٠٧ قطارات

فيشر مختبرات (١٩٧٥) م.ض. ص.ب. ٣٩٠٧١ تل ابيب ٦١٣٩٠

نشرة للمستهلك حسب انظمة الصيادلة (مستحضرات) لعام ١٩٨٦

هذا الدواء يستلزم وصفة طبية!

اقرأ النشرة بتمعن حتى اخرها قبل استعمال الدواء

وزارة الصحة حددت شكل هذه النشرة. فحصت محتواها ووافقت عليه

### تركيبة المادة الفعالة وتركيزها:

Gentamycin Sulfate (Equivalent to 0.3% Gentamycin base).

### مواد غير فعالة:

Benzalkonium Chloride, Povidone, Purified Water, Sodium Chloride,  
Sodium Phosphate Dibasic, Sodium Phosphate Monobasic.

### مجموعة تربوتوكية: مضادات حيوية من مجموعة الجلوکوزات الامينية

#### الفعالية الطبية:

لعلاج تلوثات خارجية للعيون والتي تسببها جراثيم حساسة للدواء.  
متى يحظر استعمال المستحضر؟

يحظر استعمال الدواء اذا كان المريض يعاني من حساسية لاحدى مركباته.

ذلك يحظر استعمال الدواء دون استشارة الطبيب قبل بدء العلاج. يحظر  
استعمال الدواء اذا كنت حاملاً (في الثلث الاول او الاخير من الحمل) او مرضعة.  
او انك تعانين او عانيت مسبقاً من ضعف في السمع او خلل في وظيفة الكلى.  
**خذيرات:**

استعمال متواصل قد يؤدي الى تطور مضادات لا تتغير بها في ذلك. تلوث  
جرثومي او قطري. اذا كنت حساساً لنوع معين من الطعام او الدواء يجب ابلاغ  
الطبيب بذلك قبل تناول الدواء.

هذا المستحضر يحتوي على المادة الواقية بنزلكونيوم كلوريد التي يمكن ان  
تمتصها العدسات اللاصقة اللينة. يحظر استعمال المستحضر حين  
استعمالك للعدسات اللاصقة اللينة. يجب نزع العدسات قبل استعمال  
المستحضر ولا يمكن ارجاعها ثانية الا بعد مرور ما لا يقل عن ١٥ دقيقة من  
تفطير العين بالدواء.

#### تفاعلات بين الادوية:

اذا كنت تتناول/ين دواء اخر او انتهيت لتوك من علاج بدواء اخر. فعليك اعلام  
الطبيب المعالج من اجل منع المخاطر او انعدام النجاعة النابع من تفاعلات بين  
الادوية.