



לקרומיציין® טיפול עיניים סטריליות

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו 1986
תרופה זו חייבת מרשם רופא
קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.
פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על ידו.

שים לב - לא לבלוע! תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.

אופן השימוש: רחץ היטב את ידיך, הטה ראשך לאחור, או שכב על המיטה ובעזרת האצבע הרחק מעט את העפעף התחתון מן העין. לתוך המרווח שיווצר טפטף את התרופה, עצום העיניים למשך 1-2 דקות. אל תעפעף. אם הנך חושב שהטיפול לא נקלט, השתמש בעוד טיפה. את שאר התמיסה שמסביב לעין נקה עם מגבון. למניעת זיהום התמיסה הקפד שקצה הבקבוק לא יבוא במגע עם משטח כלשהו כולל האצבע או העין וסגור את הבקבוק היטב.

כיצד תוכלו לסייע להצלחת הטיפול? עליך להשלים את הטיפול שהומלץ ע"י הרופא. גם אם חל שיפור במצב בריאותך אין להפסיק הטיפול בתרופה זו ללא התייעצות עם רופא.

מנע הרעלה! - תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה פנה מיד לחדר מיון של בית-חולים והבא אריזת התרופה אתך. **אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא!**

אין ליטול תרופות בחושך! בדק/י התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל/ת תרופה. הרכבי/ משקפיים אם הינך זקוק/ה להם. **תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך, בחולה אחר/ת היא עלולה להזיק.** אל תיתן תרופה זו לקרוביך, שכניך או מכריך. **אחסנה:** עד 25°C. לא להקפיא. סגור היטב ומנע חדירת אויר ורטיבות. אין להשתמש בתרופה זו יותר מחודש לאחר פתיחת הבקבוק לראשונה. גם לפי תנאי האריזה/אחסנה המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר! בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה. אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

מספר רישום התרופה: 509624707
פישר מעבדות פרמצבטיות (1975) בע"מ ת.ד. 39071, ת"א 61390

הרכב:

החומר הפעיל וריכוזו:

Gentamycin Sulfate (Equivalent to 0.3% Gentamycin base).

חומרים לא פעילים:

Benzalkonium Chloride, Povidone, Purified Water, Sodium Chloride, Sodium Phosphate Dibasic, Sodium Phosphate Monobasic.

קבוצה תרופוטית: אנטיביוטיקה מקבוצת האמינוגליקוזידים.
פעילות רפואית: לטיפול בזיהומים חיצוניים של העין הנגרמים ע"י חיידקים הרגישים לתרופה.

מתי אין להשתמש בתכשיר?

אין להשתמש אם ידועה רגישות לאחד ממרכיבי התרופה.

אין להשתמש בתרופה מבלי לדווח לרופא לפני התחלת הטיפול: אם הינך בהריון (שליש ראשון/אחרון) או מניקה, אם סבלת או סובלת מליקוי שמיעה או ליקוי בתפקוד הכליות.

אזהרות: שימוש ממושך עלול לגרום להתפתחות זנים עמידים כולל זיהום פטריתי. אם הנך רגיש/ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה. התכשיר מכיל חומר משמר בנזלקוניום כלוריד, העלול להיספג על-ידי עדשות מגע רכות. אין להשתמש בתכשיר זה כאשר את/ה מרכיב/ה עדשות מגע רכות. יש להסיר העדשות לפני השימוש בתכשיר, וניתן להחזירן כעבור לא פחות מ-15 דקות מהזלפת התרופה לעין.

תגובות בין תרופתיות: אם הינך נוטל/ת תרופה נוספת, או גמרת זה עתה הטיפול בתרופה אחרת עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי-יעילות הנובעים מתגובות בין תרופתיות.

תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת: במקרים של עקצוץ, אדמומיות ונפיחות הפסק טיפול ופנה לרופא מיד. בכל מקרה שבו הינך מרגיש/ה תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה, או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית עליך להתייעץ עם הרופא מיד.

מינון: מינון לפי הוראות הרופא בלבד. אין לעבור על המנה המומלצת. אם לא חל שיפור במצבך תוך מספר ימים יש לפנות לרופא. יש להשתמש בתרופה זו בזמנים קצובים כפי שנקבע ע"י הרופא המטפל. אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן קצוב יש ליטול מנה מיד כשנזכרת אך בשום אופן אין ליטול שתי מנות ביחד!