



## دواء فتبييد قطرة للعيون

الموص بهما. هذا الدواء غير معه بتصورة عامة، للأطفال أو الرضع حتى جيل شهرين. إذا لم يحدث تحسن خلال عدة أيام توجه للطبيب ثانية، يجب استعمال هذا الدواء في أوقات ثانية وحسب تحديد الطبيب، إذا نسيت تناول الدواء في الوقت العين خذ الوجبة عندما تذكر ذلك، ولكن وبأي حال لا تتناول وجبتين في آن واحد.

**انتبه:**

هذا الدواء معد للاستعمال الخارجي فقط.  
**طريقة الاستعمال:**

اغسل يديك جيداً إن رأسك إلى الخلف أو استلقي على الفراش وبواسطة اصبعك بعد الجفن الأسفل عن العين قليلاً وفي الفراغ الذي نتج انقطع الدواء وأغمض عينيك خلال دقيقة إلى دقيقتين. لا ترمي. لمنع تلوث المحلول: احرص أن لا تلامس فتحة القنية أي جسم آخر بما في ذلك الأصبع والعين. اغلق القنية جيداً. لا تستعمل هذا الدواء أكثر من أسبوعين بعد فتح القنية للمرة الأولى.  
**كيف تستطيع/ين المساعدة لفاح العلاج:**

عليك إكمال العلاج الموصى به من قبل الطبيب، حتى لو حدث تحسن في وضعك الصحي لا تنتهي عن استعمال الدواء دون استشارة الطبيب.  
**امتنع التسمم!**

يجب حفظ هذا الدواء وإي دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أبدي الأولاد و/أو الأطفال وبهذا تمنع خطر التسمم.

إذا تناولت وجبة زائدة أو بلع أحد الأولاد من الدواء توجه رأساً إلى غرفة الاستقبال في المستشفى وخذ علبة الدواء معك. لا تقاول التقيؤ دون تعليمات واضحة من الطبيب.

سجل هذا الدواء لعلاجك فقط. وقد يضر بمريض آخر لا تعط هذا الدواء لأقربائك، جيرانك أو معارفك. لا تتناول هذا الدواء في الظلام، افحص الملصقة والجرعة في كل مرة تستعمل الدواء. ضع النظارات إذا كنت بحاجة لذلك.

**الحفظ:**

حتى 25 درجة مئوية. لا جمدتها. اغلق جيداً وامنع تسرب الهواء والرطوبة. الدواء يحفظ لمدة محددة فقط حتى لو اتبعتنا شروط التغليف الموصى بها. انتبه لن تاريخ صلاحية الدواء. في حالات الشك عليك استشارة الصيدلي الذي زودك بالدواء. لا حفظ أدوية مختلفة في نفس العلبة.

رقم التسجيل في وزارة الصحة: ١٠٣٩٥٤١٧٦  
فيشر مختبرات (١٩٧٥) م.ض. ص.ب. ٣٩٠٧١ تل أبيب ٦١٣٩٠

نشرة للمستهلك حسب انظمة الصيادلة (مستحضرات) لعام ١٩٨١  
ملزم بـ صفة طبية  
اقرأ النشرة بتمعن حتى آخرها قبل استعمال الدواء  
وزارة الصحة حددت شكل هذه النشرة. فحصت محتواها ووافقت عليه

**تركيبة المادة الفعالة وتركيزها:** SULPHACETAMIDE SODIUM 10%  
**مواد غير فعالة:** Methyl Hydroxybenzoate, Povidone, Propyl Hydroxybenzoate  
.Purified Water, Sodium Thiosulfate

**الفعالية الطبية:**  
الدواء معد لتلوثات العيون الخارجية والتي سببها الجراثيم الحساسة  
**لسافاسيتيميد مثل:** Trachoma, Conjunctivitis  
**متى يحظر استعمال المستحضر؟**

لا تستعمل حال وجود حساسية لأحد مركبات الدواء أو لدوية أخرى من مجموعة سلفاميد. لا تستعمل هذا الدواء إذا تغير لون المحلول أو إذا تغير حالاً أو مرضعة.

**تحذيرات:**

إذا كانت لديك حساسية لاي نوع من الطعام او الدواء عليك ابلاغ الطبيب قبل تناول الدواء.

**تفاعلات بين الأدوية:**  
إذا كنت تتناول/ين دواء آخر او انتهيت الان من العلاج بدواء اخر عليك ابلاغ الطبيب المعالج وذلك لتفادي الاخطار او عدم النجاعة الناتجة عن تفاعلات بين الأدوية وعلى الاخص الأدوية من المجموعات التالية: مستحضرات للعيون خلوياً املاحاً فضية.

**اعراض جانبية:**  
بالاضافة الى الفعالية المرغوبة عند استعمال الدواء. قد تظهر اعراض جانبية. ظواهر تلزم تصرفها خاصاً:  
في حالة الحساسية الزائدة (حكة، احمرار، ورم، او علامات تهيج اخرى لم تظهر من قبل) توقف عن العلاج وتوجه للطبيب. في كل حالة تشعر فيها باعراض جانبية لم تذكر في النشرة او اذا حدث تغيير في شعورك العام . استشر الطبيب فوراً.

**الوجبات:**

حسب تعليمات الطبيب فقط. لا تتناول اكبر من الكمية واطول من المدة