



# סולפציד® טיפולת עיניים סטריליות

עלון לצריכן לפי תקנות הרוקחים (תקנירים) התשמ"א 1986  
תרופה זו חביבת מרשם רופא  
קרה בעיון את העיון עד סוףו בטרם תשתמש בתרופה.  
פורמת עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על ידו.

**שים לב: לא לבלוע!** תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.

**אופן השימוש:** רחץ היטב את ידיך, הטה ואשר לאחר מכן או שכב על מיטה ובעדות האכבע הרחק מעט את העפעף התחתון מן העין. לתוך המרווה שיווצר טפטט את התרופה ועצום העיניים למשך 1-2 דקות. אל תעפעף.

למניעת זיהום התמיישה הקפד שפיית הבקבוק לא תבוא במגע עם משטח כלשהו, כולל האכבע או העין וסגור הבקבוק היטב. אין להשתמש בתרופה יותר משבועיים לאחר פתיחת הבקבוק לראשונה.

**כיצד תוכל/י לסייע להצלחת הטיפול?** עליך להשלים את הטיפול שהומלץ ע"י הרופא. גם אם חל שיפור במצב בריאותך אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התיעצות עם רופא. מנגנון הרעללה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקומות סגור מחוץ להישג ידם של ילדים /או תינוקות וע"י כר תמן הרעללה. אם נטלה מנתה יתר או אם בטעות בעל יلد מן התרופה, פנה מיד לחדר מיון של בית חולים והבא אരיות התרופה אליו. אל תגורם להתקאה ללא הוראה מפורשת מרופא!

**תרופה זו נרשמה לטיפול במחלהך, בחולה אחר/ת היא עלולה להזיקך, אל תיתן תרופה זו לקרוביך, שכןך או מכירך.**  
**אין ליטול תרופות בחושך! – בדק/י התווית והמנה בכל פעם שאתה גונט/ת תרופה. הרכבי/ משקפיים אם הנר זקוק/ה להם.**

**אחסנה:** עד 25°C. לא להקפיא. סגור היטב ומגע חDIRת אויר ורטיבות. גם לפני תנאי האזקה/אחסנה המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. נא לשים לב לתאריך התגובה של התכשיר!  
בכל מקרה של ספק עלייך להזעוץ ברוקח שספיק לך את התרופה. אין לאחסן תרופות שונות באותה אזקה.

מספר רישום: 1063924176.  
פישר מעבדות פרמצטטיות (1975) בע"מ ת.ד. 39071, ת"א 61390

הרכב:

**החומר הפעיל ורכיבו:** Sulphacetamide Sodium 10%

**חומרים בלתי פעילים:** Methyl Hydroxybenzoate, Povidone, Purified Water, Sodium Thiosulfate, Propyl Hydroxybenzoate.

**فعاليות רפואי:** התרופה מיועדת לטיפול בזיהומי עיניים חיצוניים הנגרמים ע"י חיידקים הרגשיים לסולפצטאמיד כגון: Trachoma, Conjunctivitis

**מתי אין להשתמש בתכשיר?**

אין להשתמש אם ידועה ריגשות לאחד ממרכיבי התרופה או לתרופות אחרות מקבוצת הסולפמידיים. אין להשתמש בתרופה זו כשל שניי' בצעב התמיישה או כשהיא הופכת לעכורה.

אין להשתמש בתרופה מבלי להזעוץ ברופא לפני התחלת הטיפול אם הנר בהריון או מניקה.

**ازהירות:** אם הינך רגש/ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי עלייך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה.

**תגובהות בין תרופתיות:** אם הנר נוטל/ת תרופה נוספת או אם גמרת זה עתה הטיפול בתרופה אחרת עלייך לדוחך לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי-יעילות הנובעים מתגובהות בין תרופתיות, במיוחד לגבי תכשירים לעיניים המכילים מלחי כסף.

**תופעות לוואי:** בנוסף לפעולות הרצואה של התרופה, בזמן השימוש עלולות להופיע השפעות לוואי.

**תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת:** במקרה של ריגשות יתר (גרוד, אדמומיות, נפיחות או סימני גירוי אחרים שלא הופיעו לפני כן) הפסק את הטיפול ופונה לרופא. בכל מקרה שבו הינך מרגיש/ה תופעות לוואי שלא ציינו בעלוון זה, או אם חל שינוי בהרגשת הכללית עלייך להתייעץ עם הרופא מיד.

**минון:** לפि הוראות הרופא בלבד. אין לעבור על המונה או על תקופת הטיפול המומלצים. תרופה זו אינה מיועדת בדרך כלל לילדים ותינוקות מתחת לגיל חודשים. אם לא חל שיפור במצבך בתרופה זו בזמן קצובים כפי לפונות לרופא שניית. יש להשתמש לטיפול תרופה זו בזמן קצוב שנקבע ע"י הרופא המטפל. אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן קצוב יש ליטול מנה מיד כשנזכרת אך בשום אופן אין ליטול שתי מנות ביחד!