



بوليدين® فتائل مهبلية

الجريدة: في العلاج الأول يفضل استشارة الطبيب حول الجرعة، في حال عدم وجود تعليمات أخرى من الطبيب فإن الجرعة المقبولة هي فتيلية واحدة في اليوم ولمدة 7 أيام.

طريقة الاستخدام: أزيلي الغلاف عن الفتيلية، واستعملمي قضيب الإدخال. ولكن ان كنت حاملاً فاستوتحضي الأمر مع الطبيب قبل الاستعمال. استنادي على ظهرك ورجلاك مرفوعتان لأن على رأديطي القضيب عيقاً قدر الامكان دون استعمال القوة وحرجي الدواء عبر دفع الانبوب الداخلي. غسلى القضيب بالماء الساخن والصابون، البسي ملابس داخلية قطنية وغيرها في فترات متقاربة. الجوارب الطويلة يجب تغييرها كل يوم. من الممكن أن تنتقل العدوى الى الزوج لذلك يجب الامتناع عن الاتصال الجنسي او يجب استعمال العازل عند الاتصال الجنسي طوال فترة العلاج. من المفضل أيضاً استشارة الطبيب حول حاجة الزوج لعلاج طبي، اذا كانت تستعملين مستحضرات طبية لتنظيم المهببل بين علاج وآخر فاحرصي على أن لا يكون سائل الغسل قويًا وبكمية أكبر من اللازم كي لا يدخل السائل إلى الرحم. الا أن الذي يمكنه ان ينقل التلوث الى هناك، اذا كانت حاملاً فلا تستعملين سائل التنظيف بالمرة. في وقت استعمال الدواء للمهببل يمكن أن تلتقط الملابس الداخلية. كي تمنعني هذا التلطيخ استعملمي هوطاً صحية أو واقي للملابس الداخلية.

يمعن استخدام الدواء في الظلام، قوموا بفحص المقص والجرعة في كل مرة تستخدمن الدواء.

ننوهوا بوضع النظارات اذا ما كنتم بحاجة لها.

4. الأعراض الجانبية:

- مثلاً أي دواء آخر، فإن استخدام بوليدين قد يتسبب بأعراض جانبية لدى بعض المستخدمين مثل الحكة، إذا استمر ذلك توجهي للطبيب. في حالات نادرة وعند ظهور الطفح الجلدي أو الانفاس توقف عن الاستخدام وتوجهي للطبيب. في حالة من الشعور بظهور أعراض جانبية لم تذكر في النشرة عن طرأ تغير في شعورك العام فعليك استشارة الطبيب فوراً.

كيف نخزن الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول يد الأطفال و/أو الأطفال وهكذا يتم تجنب حدوث التسمم. اذا ما قام الولد بابتلاع هذا الدواء عن طريق الخطأ، توجه فوراً الى غرفة الطوارئ الموجودة في أقرب مستشفى وبحوزتك عبوة الدواء. لا تستحب بالتفقيع المتعذر بدون تصريح واضح من قبل الطبيب.
 - يُمنع استخدام الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية الظاهر على العبوة. يتطرق تاريخ انتهاء الصلاحية الى اليوم الأخير من الشهر ذاته.
 - يُمنع تخزينه في درجة حرارة تزيد عن 25°C.
 - يحب تخزينه في غيابه الأصلية.

معلومات إضافية .٦

- بالاضافة إلى المواد الفعالة، يحتوي المنتج على: Polyethylene Glycol
 كيف يبدو هذا الدواء وما هي محتويات العبوة؟ فتائل بلون بني غامق، 12 فتيلة في العبوة
 بالإضافة لقضيب الإدخال..

صاحب التسجيل: فيشر مختبرات أدوية (1975) م.ض.. ص.ب. 39071، تل أبيب 61390.
 اسم المنتج وعنوانه: بن شمعون فلوريش م.ض. المنطقة الصناعية مسغاف، بريد متقل مسغاف 20174
 تم فحص هذه النشرة والمصادقة عليها من قبل وزارة الصحة في تاريخ: 17.9.2014
 رقم تسجيل هذا الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة: 44.36.23414

نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيادلة) مستحضرات - 1986
يُسوق هذا الدواء بدون وصفة الطبيب

تم تحديد صياغة هذه النشرة والمصادقة على محتواها من قبل وزارة الصحة.

.Povidone Iodine 5%: ترکیب‌ها

المواد غير الفعالة ومتبيبة للحساسية في المنتج: نظر البند 6: "معلومات إضافية" اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل استعمال الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء، إذا كانت لديك أيّة أسئلة إضافية توجه إلى الطبيب أو الصيدلي.

عليك استخدام الدواء بالطريقة الصحيحة:

- يُجب علىك مراجعة الطبيب إذا زادت أعراض المرض أو لم تتحسن الحالة الصحية بعد 7 أيام.
 - استشر الصيدلي إذا ما كنت بحاجة لمعلومات إضافية.

ما هدف هذا الدواء؟ .1

هذا الدواء مُخصص لعلاج التهابات المهبل.
المجموعة الطبية: المواد المطهرة (المطهرات).

٢. قبل استخدام الدواء:

يُمنع استخدام هذا الدواء في حالة:

يُمنع استخدام الدواء في حالة وجود حساسية لأحد مركباته أو للليود.

يمعن استخدام المستحضر دون استشارة الطبيب قبل البدء بالعلاج إن كنت تعاني أو عانيت في الماضي من اضطراب في وظائف الغدة الدرقية.

اذا ما كانت لديك حساسية ما لـ احدى المواد الغذائية او لدواء معين، عليك ابلاغ الطبيب بهذا الأمر قبل استخدام الدواء.

تحذيرات خاصة تتعلق باستخدام الدواء:

- في حالة تناولك أو إذا ماتناولت في الفترة الأخيرة، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية يُمكّن الحصول عليها بدون وصفة الطبيب أو الإضافات الغذائية، قم ببيان الطبيب أو الصيدلي بهذا الأمر، وذلك لمنع المخاطر أو عدم فعالية الدواء التي قد تتبع جراء تفاعلات الأدوية.
 - **الحمل والرضاعة:** إذا ما كنت حاملاً أو مرضعاً يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل استخدام الدواء.
 - فتايل بوليدين معدة للاستخدام في المهبل فقط. خلال أيام معدودة يمكن أن تبدأ علامات المرض بالزوال، بالرغم من ذلك يجب الاستمرار بالعلاج واتمامه بحسب التعليمات.
 - يجب متابعة العلاج حتى في فترة الدورة الشهرية إن صادفت في وقت العلاج.

3. كفُّسْتخدم هذا الدواء؟

عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي، إذا لم تكن متأكداً.

انتبه: ليس للبلع! هذا الدواء مُخصص للاستخدام الخارجي فقط.