

בולידין®

محلول / شطف

طريقة الاستخدام:

- يمكن تقطير محلول بوليدين مباشرة على الجلد والجرح وتركه ليجف على الجلد (ستتشكل طبقة حماية)، كذلك يمكن غمس قطعة شاش بالمحلول، ووضعها على الجرح وتغطيته بضمادة.
- للاسعاف الأولي: لعلاج الاصابات - ضع بوليدين 4-2 مرات في اليوم حتى يشفى الجرح. لتلوثات الجلد يجب دهن محلول بوليدين كما ذكر سابقاً حتى الشفاء الكامل أو بحسب تعليمات الطبيب.
- لشطف المهبل - ملعقة واحدة من محلول بوليدين تخلط في ليتر من الماء الفاتر للعلاج مرتان في الاسبوع.
- اذا لم يطرأ تحسن على الحالة خلال اسبوع يجب التوجه إلى الطبيب.
- بوليدين محلول / شطف لا يترك بقعاً على الجلد أو على الأقمشة القطنية.
- يُمنع استخدام الدواء في الظلام. إفحصوا المصق والجرعة في كل مرة تستخدمون الدواء. قوموا بوضع النظارات اذا ما كنتم بحاجة لها.

4. الأعراض الجانبية:

- مثل أي دواء آخر، فإن استخدام بوليدين محلول / شطف قد يتسبب بأعراض جانبية لدى بعض المستخدمين. لا تقلق بعد قراءة قائمة الأعراض الجانبية. فقد لا تصاب بأي منها.
- إضافة الى التأثير المرغوب للمستحضر، خلال استخدامه قد تظهر بعض الأعراض الجانبية مثل الحكة. اذا استمرت الحكة يجب التوجه للطبيب.
- في حالات نادرة قد يظهر طفح جلدي أو انتفاخ - عندها توقف عن استخدام العلاج وتوجه للطبيب.
- عند الاستخدام للأطفال أو الصغار: يجب على الوالدان إبلاغ الطبيب عند ظهور هذه الأعراض لدى الأطفال.
- في حالة من الشعور بظهور أعراض جانبية لم تذكر في النشرة أو طرأ تغير في شعورك العام فعليك استشارة الطبيب فوراً.

5. كيف نخزن الدواء؟

- **تجنب التسمم!** يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول يد الأولاد و/أو الأطفال وهكذا يتم تجنب حدوث التسمم. اذا ما قام الولد بابتلاع هذا الدواء عن طريق الخطأ، توجه فوراً الى غرفة الطوارئ الموجودة في أقرب مستشفى وبحوزتك عبوة الدواء. لا تتسبب بالتقيؤ المتعمد بدون تصريح واضح من قبل الطبيب.
- يمكن استخدام الدواء لمدة 36 شهراً بعد فتح العبوة لأول مرة. يمنع استخدام الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوة. يتطرق تاريخ انتهاء الصلاحية الى اليوم الأخير من الشهر ذاته.
- يُمنع تخزينه في درجة حرارة تزيد عن 25°C.
- يجب تخزينه في عبوته الأصلية.

6. معلومات إضافية

- بالإضافة إلى المادة الفعالة، يحتوي المنتج على: Purified Water, Trisodium Phosphate, Sodium Laureth Sulfate.
- كيف يبدو هذا الدواء وما هي محتويات العبوة؟ محلول صافي بلون بني غامق، المحتوى: محلول 20 مل، 100، 1000 مل، شطف 200 مل.
- صاحب التسجيل: فيشر مختبرات أدوية (1975) م.ض.، ص.ب. 39071، تل أبيب 61390.
- اسم المنتج وعنوانه: بن شمعون فلوريش م.ض. المنطقة الصناعية مسغاف، بريد متنقل مسغاف 20174.
- تم فحص هذه النشرة والمصادقة عليها من قبل وزارة الصحة في تاريخ: 11.2014.
- رقم تسجيل هذا الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة: 131.96.23410.
- من أجل تسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بلغة المذكر. ومع ذلك فالدواء مخصص لكلا الجنسين.

نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالة (مستحضرات) - 1986

يُسوق هذا الدواء بدون وصفة الطبيب
تم تحديد صياغة هذه النشرة والمصادقة على محتواها من قبل وزارة الصحة.

المادة الفعالة وتركيزها: Povidone Iodine 10%

المواد غير الفعالة ومسببة للحساسية في المنتج: نظر البند 6: "معلومات إضافية"
اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل استعمال الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا كانت لديك أية أسئلة إضافية توجه إلى الطبيب أو الصيدلي.

- عليك استخدام الدواء بالطريقة الصحيحة.
- استشر الصيدلي اذا ما كنت بحاجة لمعلومات إضافية.

1. ما هدف هذا الدواء؟

هذا الدواء مُخصص للاسعاف الأولي للجروح، الخدوش والحروق البسيطة، للتطهير في حالات تلوث الجلد الناجم عن البكتيريا أو الفطريات وللشطف الداخلي لمنطقة المهبل ضد التلوثات. المجموعة الطبية: المواد المطهرة (المطهرات).

2. قبل استخدام الدواء:

يُمنع استخدام هذا الدواء في حالة:

يُمنع استخدام الدواء في حالة وجود حساسية لأحد مركباته أو لليود.
اذا ما كانت لديك حساسية ما لإحدى المواد الغذائية أو لدواء معين، عليك إبلاغ الطبيب بهذا الأمر قبل استخدام الدواء.

تحذيرات خاصة تتعلق باستخدام الدواء:

- في حالة تناوله أو اذا ما تناولت في الفترة الأخيرة، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية يُمكن الحصول عليها بدون وصفة الطبيب أو الإضافات الغذائية، قم بإبلاغ الطبيب أو الصيدلي بهذا الأمر، وذلك لمنع المخاطر أو عدم فعالية الدواء التي قد تنبع جراء تفاعلات الأدوية.
- تجنب استخدام المستحضر على مساحات واسعة من الجلد.
- في حالات الجروح العميقة أو الحروق الشديدة وإذا لم يستجب الجرح للعلاج أو ساءت حالته يجب استشارة الطبيب.
- يمنع استخدام المستحضر على فترات متقاربة أو متواصلة دون استشارة الطبيب.
- يمنع استخدام المستحضر دون استشارة الطبيب قبل البدء بالعلاج ان كنت تعاني أو عانيت في الماضي من اضطراب في وظائف الغدة الدرقية.
- الحمل والرضاعة: اذا ما كنت حاملاً أو مرضعاً يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل استخدام الدواء.

3. كيف يُستخدم هذا الدواء؟

عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي اذا لم تكن متأكداً.
انتبه: ليس للبلع! هذا الدواء مُخصص للاستخدام الخارجي فقط.