

# بوليديين®

## مرهم

نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالوية (مستحضرات) - 1986  
يُسوق هذا الدواء بدون وصفة الطبيب  
تم تحديد صياغة هذه النشرة والمصادقة على محتواها من قبل وزارة الصحة.

#### طريقة الاستخدام:

- ادهن المرهم على الجرح أو المنطقة التي يرغب بعلاجها 4-2 مرات في اليوم.
- يمكن كذلك دهن المرهم على شاشة ثم تغطيتها بضمادة.
- اذا لم تتحسن الحالة بعد اسبوع من الاستخدام يجب التوجه للطبيب.
- يمكن تنظيف البقع عن الجلد وعن الملابس القطنية عن طريق الشطف بالماء.
- يُمنع استخدام الدواء في الظلام، إفحصوا المصق والجرعة في كل مرة تستخدمون الدواء. قوموا بوضع النظارات اذا ما كنتم بحاجة لها.

#### 4. الأعراض الجانبية:

- مثل أي دواء آخر، فإن استخدام بوليديين مرهم قد يتسبب بأعراض جانبية لدى بعض المستخدمين. لا تقلق بعد قراءة قائمة الأعراض الجانبية. فقد لا تصاب بأي منها.
- إضافة الى التأثير المرغوب للمستحضر، خلال استخدامه قد تظهر بعض الأعراض الجانبية مثل الحكة.
- في حالات نادرة وعند ظهور الطفح الجلدي أو الانتفاخ توقف عن الاستخدام وتوجهي للطبيب.
- لدى الصغار والأطفال: على الوالدين إبلاغ الطبيب المعالج عن الأعراض الجانبية التي تظهر لدى الطفل.
- في حالة من الشعور بظهور أعراض جانبية لم تذكر في النشرة أو طراً تغير في شعورك العام فعليك استشارة الطبيب فوراً.

#### 5. كيف تُخزن الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول يد الأولاد و/أو الأطفال وهكذا يتم تجنب حدوث التسمم. اذا ما قام الولد بابتلاع هذا الدواء عن طريق الخطأ، توجه فوراً الى غرفة الطوارئ الموجودة في أقرب مستشفى وبحوزتك عبوة الدواء. لا تتسبب بالتقيؤ المتعمد بدون تصريح واضح من قبل الطبيب.
- يمكن استخدام الدواء لمدة 36 شهراً بعد فتح العبوة لأول مرة. يمنع استخدام الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوة. يتطرق تاريخ انتهاء الصلاحية الى اليوم الأخير من الشهر ذاته.
- يُمنع تخزينه في درجة حرارة تزيد عن 25°C.
- يجب تخزينه في عبوته الأصلية.

#### 6. معلومات إضافية

- بالإضافة إلى المادة الفعالة، يحتوي المنتج على: PEG 400, PEG 4000, Purified Water, Trisodium Phosphate.
- كيف يبدو هذا الدواء وما هي محتويات العبوة؟ مرهم بلون بني غامق، رائحته تشبه رائحة اليود، المحتوى: انبوبة 15 و 50 غم، قارورة 250 غم.
- صاحب التسجيل: فيشر مختبرات أدوية (1975) م.ض.، ص.ب. 39071، تل ابيب 61390.
- اسم المنتج وعنوانه: بن شمعون فلوريش م.ض. المنطقة الصناعية مسغاف، بريد متنقل مسغاف 20174.
- تم فحص هذه النشرة والمصادقة عليها من قبل وزارة الصحة في تاريخ: 11.2014.
- رقم تسجيل هذا الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة: 116.74.23415.
- من أجل تسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بلغة المذكر. ومع ذلك فالدواء مخصص لكلا الجنسين.

#### المادة الفعالة وتركيزها: Povidone Iodine 10%

المواد غير الفعالة ومسببة للحساسية في المنتج: نظر البند 6: "معلومات إضافية"  
اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل استعمال الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا كانت لديك أية أسئلة إضافية توجه إلى الطبيب أو الصيدلي.

- عليك استخدام الدواء بالطريقة الصحيحة.
- استشر الصيدلي اذا ما كنت بحاجة لمعلومات إضافية.

#### 1. ما هدف هذا الدواء؟

هذا الدواء مُخصص لعلاج لتطهير الجروح والحروق البسيطة وعلاج ثلوث الجلد.  
المجموعة الطبية: المواد المطهرة (المطهرات).

#### 2. قبل استخدام الدواء:

يُمنع استخدام هذا الدواء في حالة:

يُمنع استخدام الدواء في حالة وجود حساسية لأحد مركباته أو لليود.

اذا ما كانت لديك حساسية ما لإحدى المواد الغذائية أو لدواء مُعين، عليك إبلاغ الطبيب بهذا الأمر قبل استخدام الدواء.

#### تحذيرات خاصة تتعلق باستخدام الدواء:

- في حالة تناولك أو اذا ما تناولت في الفترة الأخيرة، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية يُمكن الحصول عليها بدون وصفة الطبيب أو الإضافات الغذائية، قم بإبلاغ الطبيب أو الصيدلي بهذا الأمر، وذلك لمنع المخاطر أو عدم فعالية الدواء التي قد تتبع جراء تفاعلات الأدوية.
- في حال الجروح العميقة أو الحروق الصعبة وأذا لم يستجب الجرح للعلاج أو ساءت حالته يجب استشارة الطبيب.
- يمنع استخدام العلاج في فترات متقاربة أو لفترات متواصلة دون استشارة الطبيب.
- يمنع استخدام المستحضر دون استشارة الطبيب قبل البدء بالعلاج ان كنت تعاني أو عانيت في الماضي من اضطراب في وظائف الغدة الدرقية.
- الحمل والرضاعة: اذا ما كنتِ حاملاً أو مرضعاً يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل استخدام الدواء.

#### 3. كيف يُستخدم هذا الدواء؟

عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي اذا لم تكن متأكدًا.  
انتبه: ليس للبلع! هذا الدواء مُخصص للاستخدام الخارجي فقط.